

LÊ NHỰT - HUỖNH ĐỊNH TƯỜNG

GIẢI BÀI TẬP

TOÁN

8

TẬP MỘT



PHẦN MỘT
NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

LÊ NHẬT - HUỖNH ĐỊNH TƯỜNG

Giải bài tập
TOÁN 8
Tập một



NHÀ XUẤT BẢN
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Đơn vị liên kết :
Công ty  HOA HỒNG

Lời nói đầu

Quyển sách **GIẢI BÀI TẬP TOÁN 8** tập một này được biên soạn theo chương trình sách giáo khoa hiện hành, nhằm giúp các em có tài liệu tham khảo để ôn tập củng cố kiến thức, đồng thời vận dụng để làm những bài tập có dạng tương tự hoặc nâng cao đạt kết quả tốt!

Quý thầy cô và quý phụ huynh có thể xem quyển sách này như tài liệu tham khảo thêm.

Chúng tôi mong đón nhận ý kiến xây dựng từ quý độc giả.

NHÓM BIÊN SOẠN

PHẦN ĐẠI SỐ

Chương I.

PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC

§1. NHÂN ĐƠN THỨC VỚI ĐA THỨC

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. Quy tắc nhân một số với một tổng: Cho $a, b, c \in \mathbb{R}$, ta có: $a(b + c) = ab + ac$
2. Quy tắc nhân đơn thức với đa thức: Muốn nhân một đơn thức với một đa thức ta nhân đơn thức với từng số hạng của đa thức rồi cộng các tích với nhau.
3. Tổng quát: Cho A, B, C là các đơn thức, ta có: $A(B + C) = AB + AC$
4. Các phép tính về lũy thừa:

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{n \text{ thừa số } a} \quad (n \in \mathbb{N}) \quad \text{Ví dụ: } x^6 = \underbrace{x \cdot x \cdot x \cdot x \cdot x \cdot x}_6$$

$$a^0 = 1 \quad (a \neq 0)$$

$$\text{Ví dụ: } 5^0 = 1$$

$$a^n \cdot a^m = a^{n+m}$$

$$\text{Ví dụ: } x^2 \cdot x^3 = x^{2+3} = x^5$$

$$a^n : a^m = a^{n-m} \quad (n \geq m)$$

$$\text{Ví dụ: } x^5 : x^3 = x^{5-3} = x^2$$

$$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$$

$$\text{Ví dụ: } (x^2)^3 = x^{2 \cdot 3} = x^6$$

II. BÀI TẬP

A. Bài tập mẫu

1. Áp dụng nhân: $3x^2(5x^2 - 2x - 4)$
2. Tìm x , biết: $3x(12x - 4) - 2x(18x + 3) = 36$.

Giải

$$1. 3x^2(12x^2 - 2x - 4) = 3x^2 \cdot 12x^2 - 3x^2 \cdot 2x - 3x^2 \cdot 4 = 12x^4 - 6x^3 - 12x^2$$

$$2. \text{Ta có: } 3x(12x - 4) - 2x(18x + 3) = 36$$

$$36x^2 - 12x - 36x^2 - 6x = 36$$

$$-18x = 36$$

$$x = -2.$$

$$\text{Vậy } x = -2$$

B. Bài tập căn bản

1. Làm tính nhân:

$$a) x^2(5x^3 - x - \frac{1}{2}); \quad b) (3xy - x^2 + y)\frac{2}{3}x^2y; \quad c) (4x^2 - 5xy + 2x)(\frac{1}{2}xy)$$

Giải

$$a) x^2(5x^3 - x - \frac{1}{2}) = 5x^5 - x^3 - \frac{1}{2}x^2$$

$$b) (3xy - x^2 + y)\frac{2}{3}x^2y = 2x^3y^2 - \frac{2}{3}x^4y + \frac{2}{3}x^2y^2$$

$$c) (4x^2 - 5xy + 2x)(\frac{1}{2}xy) = 2x^3y + \frac{5}{2}x^2y^2 - x^2y$$

2. Thực hiện phép nhân, rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức:

$$a) x(x - y) + y(x + y) \text{ tại } x = -6; y = 8$$

$$b) x(x^2 - y) - x^2(x + y) + y(x^2 - x) \text{ tại } x = \frac{1}{2}; y = -100$$

Giải

$$a) x(x - y) + y(x + y) \text{ tại } x = -6; y = 8$$

" Trước hết ta thu gọn đa thức:

$$x(x - y) + y(x + y) = x^2 - xy + xy + y^2 = x^2 + y^2$$

" Thay $x = -6$; $y = 8$ vào đa thức thu gọn, ta được:

$$x^2 + y^2 = (-6)^2 + (8)^2 = 36 + 64 = 100$$

Vậy giá trị của biểu thức đã cho bằng 100.

$$b) x(x^2 - y) - x^2(x + y) + y(x^2 - x) \text{ tại } x = \frac{1}{2}; y = -100$$

$$\text{Ta có: } x(x^2 - y) - x^2(x + y) + y(x^2 - x) = x^3 - xy - x^3 - x^2y + x^2y - xy = -2xy$$

$$\text{Với } x = \frac{1}{2}; y = -100, \text{ ta có } -2xy = -2 \cdot \frac{1}{2} \cdot (-100) = 100$$

Vậy giá trị của biểu thức đã cho bằng 100.

3. Tìm x, biết:

$$a) 3x(12x - 4) - 9x(4x - 3) = 30;$$

$$b) x(5 - 2x) + 2x(x - 1) = 15.$$

Giải

$$a) 3x(12x - 4) - 9x(4x - 3) = 30$$

$$36x^2 - 12x - 36x^2 + 27x = 30$$

$$15x = 30$$

$$x = 2$$

Vậy $x = 2$.

$$b) x(5 - 2x) + 2x(x - 1) = 15$$

$$5x - 2x^2 + 2x^2 - 2x = 15$$

$$3x = 15$$

$$x = \frac{15}{3} = 5$$

Vậy $x = 5$

4. Đo đoạn nước Đâu này lấy tuổi của mình

Lấy tổng thêm 5

Được bao nhiêu đem nhân với 2

Lấy kết quả trên cộng với tuổi

Nhân kết quả vừa tìm được với 5

Được kết quả cuối cùng sau khi đã trừ đi 160

Chỉ số đoạn được tuổi của bạn. Giải thích tại sao?

5. Rút gọn biểu thức

a) $x(x - y) + y(x - y)$.

b) $x^2(x + y) - y(x^{2+1} + y^{2+1})$

6. Đánh dấu - vào ô mà em cho là đáp số đúng

Giá trị của biểu thức $ax(x - y) + y^2(x + y)$ tại $x = -1, y = 1$ (a là hằng số)

a	
a + 2	
2a	
2a	

Giải

3. 4. Học sinh tự làm

3. a) $x(x - y) + y(x - y) = x^2 - xy + xy - y^2 = x^2 - y^2$

b) $x^{2+1}(x + y) - y(x^{2+1} + y^{2+1}) = x^{2+1}x + x^{2+1}y - yx^{2+1} - yy^{2+1} = x^{2+1} - y^{2+1}$

6. Đề đánh dấu - vào ô mà em cho là đáp số đúng trước hết ta đi tính giá trị của biểu thức $ax(x - y) + y^2(x + y)$ với $x = -1, y = 1$ (a là hằng số)

Ta có $ax(x - y) + y^2(x + y) = ax^2 - axy + xy + y^3$

$= a(-1)^2 - a(-1)(1) + (-1)(1) + 1^3 = a + a - 1 + 1 = 2a$

Vậy ta đánh dấu - vào ô có kết quả là 2a.

§2. NHÂN ĐA THỨC VỚI ĐA THỨC

1. KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. **Quy tắc:** Muốn nhân một đa thức với một đa thức ta nhân mỗi hạng tử của đa thức này với từng hạng tử của đa thức kia rồi cộng các tích với nhau.

2. **Tổng quát:** Cho A, B, C, D là các đa thức
Ta có $(A + B).(C + D) = A(C + D) + B(C + D)$
 $= AC + AD + BC + BD$

II. BÀI TẬP

A. Bài tập mẫu

1. Làm tính nhân:

a) $(6x^2 + 5y^4)(2x^2 - 3y^2)$;

b) $(1 - 3x^2 + x)(x^2 - 5 + x)$.

2. Giải phương trình: $6x^2 - (2x + 5)(3x - 2) = 7$.

Giải

1. a) $(6x^2 + 5y^4)(2x^2 - 3y^2) = 6x^2(2x^2 - 3y^2) + 5y^4(2x^2 - 3y^2)$

$$= 12x^4 - 18y^2x^2 + 10y^4x^2 - 15y^6$$

$$= 12x^4 - 8x^2y^2 - 15y^6$$

b) $(1 - 3x^2 + x)(x^2 - 5 + x) = 1(x^2 - 5 + x) - 3x^2(x^2 - 5 + x) + x(x^2 - 5 + x)$

$$= x^2 - 5 + x - 3x^4 + 15x^2 - 3x^3 + x^3 - 5x + x^2$$

$$= -3x^4 - 2x^3 + 17x^2 - 4x - 5$$

2. Ta có: $6x^2 - (2x + 5)(3x - 2) = 7 \Leftrightarrow 6x^2 - (6x^2 - 4x + 15x - 10) = 7$

$$\Leftrightarrow 6x^2 - 6x^2 + 4x - 15x + 10 = 7$$

$$\Leftrightarrow -11x + 10 = 7 \Leftrightarrow -11x = 7 - 10$$

$$\Leftrightarrow -11x = -3 \quad \Leftrightarrow x = \frac{3}{11}$$

Vậy phương trình có một nghiệm $x = \frac{3}{11}$.

B. Bài tập cơ bản

7. Làm tính nhân: a) $(x^2 - 2x + 1)(x - 1)$

b) $(x^3 - 2x^2 + x - 1)(5 - x)$

Từ câu b) hãy suy ra kết quả phép nhân: $(x^3 - 2x^2 + x - 1)(x - 5)$.

Giải

a) $(x^2 - 2x + 1)(x - 1) = x^2(x - 1) - 2x(x - 1) + 1(x - 1)$

$$= x^3 - x^2 - 2x^2 + 2x + x - 1 = x^3 - 3x^2 + 3x - 1$$

b) $(x^3 - 2x^2 + x - 1)(5 - x) = x^3(5 - x) - 2x^2(5 - x) + x(5 - x) - 1(5 - x)$

$$= 5x^3 - x^4 - 10x^2 + 2x^3 + 5x - x^2 - 5 + x$$

$$= -x^4 + 7x^3 - 11x^2 + 6x - 5$$

Suy ra kết quả của phép nhân:

$$(x^3 - 2x^2 + x - 1)(x - 5) = x^4 - 7x^3 + 11x^2 - 6x + 5$$

8. Làm tính nhân:

a) $(x^2y^2 - \frac{1}{2}xy + 2y)(x - 2y)$;

b) $(x^2 - xy + y^2)(x + y)$.

Giải

$$\begin{aligned} \text{a) } (x^2 - y)^2 &= \frac{1}{2}xy + 2y(x - 2y) - 2y^2 = x^2y + 4xy - 4y^2 - 2y^2 \\ &= x^2y^2 - 2y^3 + \frac{1}{2}x^2y + 4y^2 = 2xy^2 - 4y^3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } (x^2 - xy + y^2)(x + y) &= x^3(x + y) - xy^2(x + y) + y^3(x + y) \\ &= x^4 + x^3y - x^2y^2 - xy^3 + xy^3 + y^4 = x^4 + y^4 \end{aligned}$$

9. Điền kết quả tính được vào bảng

Giá trị của x, y	Giá trị của biểu thức: $(x - y)(x^2 + xy + y^2)$
$x = -10; y = 2$	
$x = -1; y = 0$	
$x = 2; y = -1$	
$x = -0,5; y = 1,25$	

(trường hợp này có thể dùng máy tính bỏ túi)

Giải

Ta thực hiện phép nhân đa thức để thu gọn kết quả rồi tính giá trị của biểu thức ứng với từng giá trị của x, y đã cho trong bảng, rồi điền vào bảng.

$$\begin{aligned} \text{Ta có: } (x - y)(x^2 + xy + y^2) &= x(x^2 + xy + y^2) - y(x^2 + xy + y^2) \\ &= x^3 + x^2y + xy^2 - yx^2 - xy^2 - y^3 = x^3 - y^3 \end{aligned}$$

$$\text{• Với } x = -10; y = 2 \text{ thì: } x^3 - y^3 = (-10)^3 - (2)^3 = -1000 - (8) = -1008$$

$$\text{• Với } x = -1; y = 0 \text{ thì: } x^3 - y^3 = (-1)^3 - (0)^3 = -1 - 0 = -1$$

$$\text{• Với } x = 2; y = -1 \text{ thì: } x^3 - y^3 = (2)^3 - (-1)^3 = 8 - (-1) = 9$$

$$\text{• Với } x = -0,5 \text{ và } y = 1,25 \text{ thì:}$$

$$x^3 - y^3 = (-0,5)^3 - (1,25)^3 = -0,125 - 1,953125 = -2,078125.$$

Luyện tập

10. Thực hiện phép tính

$$\text{a) } x^2 - 2x + 3 \left(\frac{1}{2}x - 5 \right),$$

$$\text{b) } (x^2 - 2xy + y^2)(x - y)$$

Giải

$$\begin{aligned} \text{a) } x^2 - 2x + 3 \left(\frac{1}{2}x - 5 \right) &= \frac{1}{2}x(x^2 - 2x + 3) - 5(x^2 - 2x + 3) \\ &= \frac{1}{2}x^3 - x^2 + \frac{3}{2}x - 5x^2 + 10x - 15 \\ &= \frac{1}{2}x^3 - 6x^2 + \frac{23}{2}x - 15 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 b) (x^2 - 2xy + y^2)(x - y) &= x(x^2 - 2xy + y^2) - y(x^2 - 2xy + y^2) \\
 &= x^3 - 2x^2y + xy^2 - x^2y + 2xy^2 - y^3 \\
 &= x^3 - 3x^2y + 3xy^2 - y^3
 \end{aligned}$$

11. Chứng minh rằng giá trị của biểu thức sau không phụ thuộc vào giá trị của biến. $(x - 5)(2x + 3) - 2x(x - 3) + x + 7$.

Giải

Ta thực hiện phép tính, thu gọn xong biểu thức không còn chứa biến.

Thật vậy:

$$(x - 5)(2x + 3) - 2x(x - 3) + x + 7 = 2x^2 + 3x - 10x - 15 - 2x^2 + 6x + x + 7 = x$$

Điều này chứng tỏ biểu thức không phụ thuộc vào giá trị của biến.

12. Tính giá trị biểu thức: $(x^2 - 5)(x + 3) + (x + 4)(x - x^2)$ trong mỗi trường hợp sau:

$$a) x = 0; \quad b) x = 15; \quad c) x = -15; \quad d) x = 0,15$$

Giải

Trước hết ta thu gọn biểu thức, sau đó thay giá trị của x vào biểu thức thu gọn để tính giá trị.

$$\begin{aligned}
 \text{Đặt } A &= (x^2 - 5)(x + 3) + (x + 4)(x - x^2) \\
 &= x^3 + 3x^2 - 5x - 15 + x^2 - x^3 + 4x - 4x^2 = -x - 15 = -(x + 15)
 \end{aligned}$$

$$\text{Với } x = 0: \quad A = -(x + 15) = -(0 + 15) = -15$$

$$\text{Với } x = 15: \quad A = -(x + 15) = -(15 + 15) = -30$$

$$\text{Với } x = -15: \quad A = -(x + 15) = -(-15 + 15) = 0$$

$$\text{Với } x = 0,15: \quad A = -(x + 15) = -(0,15 + 15) = -15,15$$

13. Tìm x , biết: $(12x - 5)(4x - 1) + (3x - 7)(1 - 16x) = 81$.

Giải

$$(12x - 5)(4x - 1) + (3x - 7)(1 - 16x) = 81$$

$$\Leftrightarrow 48x^2 - 12x - 20x + 5 + 3x - 48x^2 - 7 + 112x = 81$$

$$\Leftrightarrow 83x - 2 = 81 \Leftrightarrow 83x = 81 + 2 = 83 \Leftrightarrow x = 1.$$

Vậy $x = 1$.

14. Tìm ba số tự nhiên chẵn liên tiếp, biết tích của 2 số sau lớn hơn tích của hai số đầu là 192.

Giải

Gọi $2x, 2x + 2, 2x + 4$ là ba số tự nhiên chẵn liên tiếp ($x \in \mathbb{N}$).

Theo đề bài, ta có: $(2x + 2)(2x + 4) = 2x(2x + 2) + 192$

$$\Leftrightarrow 4x^2 + 8x + 4x + 8 = 4x^2 + 4x + 192$$

$$\Leftrightarrow 8x = 184 \Leftrightarrow x = 23$$

Vậy ba số đã cho là 46, 48, 50.

15. nhân nhân

$$(x + \frac{1}{2}y)(\frac{1}{2}x + y)$$

$$(x + \frac{1}{2}y)(\frac{1}{2}x + y)$$

Giải

$$= (\frac{1}{2}x + xy + \frac{1}{2}xy + y^2) = \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}xy + xy + \frac{1}{2}xy + y^2$$

$$= (\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}xy + \frac{1}{2}xy + y^2) = \frac{1}{2}x^2 + xy + y^2$$

$$= (\frac{1}{2}x^2 + xy + \frac{1}{2}xy + y^2) = \frac{1}{2}x^2 + xy + y^2$$

$$= \frac{1}{2}x^2 + xy + \frac{1}{2}xy + y^2 = \frac{1}{2}x^2 + xy + y^2$$

§3.4.5. NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC DÁNG NHỎ

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

A. Các hằng đẳng thức đáng nhớ

$$1. (A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$$

$$2. (A - B)^2 = A^2 - 2AB + B^2$$

$$3. (A + B)(A - B) = (A + B)(A - B)$$

$$4. (A + B)^3 = A^3 + 3A^2B + 3AB^2 + B^3$$

$$5. (A - B)^3 = A^3 - 3A^2B + 3AB^2 - B^3$$

$$6. A^3 + B^3 = (A + B)(A^2 - AB + B^2)$$

$$7. A^3 - B^3 = (A - B)(A^2 + AB + B^2)$$

$$8. (A + B + C)^2 = A^2 + B^2 + C^2 + 2AB + 2BC + 2CA$$

$$9. (a + b)^n = (a + b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + \dots + ab^{n-1} + b^n)$$

B. Cần nhớ các phép tính và lũy thừa

$$1. a^m \cdot a^n = a^{m+n} \quad 2. a^m : a^n = a^{m-n} \quad (a \neq 0)$$

n thừa số a

$$3. a^m \cdot a^n = a^{m \cdot n} \quad 4. a^m \cdot a^n = a^{m+n} \quad (m, n \in \mathbb{N}) \quad 5. (a^m)^n = a^{m \cdot n}$$

II. BÀI TẬP

A. Bài tập căn bản

• Bài tập mục §3

16. Viết các biểu thức sau dưới dạng bình phương của một tổng hoặc một hiệu

a) $x^2 + 2x + 1$;

b) $9x^2 + y^2 + 6xy$;

c) $25a^2 + 4b^2 - 20ab$;

d) $x^2 - x + \frac{1}{4}$

Giải

a) $x^2 + 2x + 1 = (x)^2 + 2x.1 + 1^2 = (x + 1)^2$

b) $9x^2 + y^2 + 6xy = (3x)^2 + 2(3x).y + y^2 = (3x + y)^2$

c) $25a^2 + 4b^2 - 20ab = (5a)^2 - 2(5a).(2b) + (2b)^2 = (5a - 2b)^2$

d) $x^2 - x + \frac{1}{4} = x^2 - 2(x).\frac{1}{2} + (\frac{1}{2})^2 = (x - \frac{1}{2})^2$

17. Chứng minh rằng: $(10a + 5)^2 = 100a.(a + 1) + 25$.

Từ đó em hãy nêu cách tính nhẩm bình phương của một số tự nhiên có tận cùng bằng một chữ số 5.

Áp dụng để tính: 25^2 ; 35^2 ; 65^2 ; 75^2 .

Giải

* Cách 1: Chứng minh: $(10a + 5)^2 = 100a.(a + 1) + 25$

Thật vậy: $(10a + 5)^2 = (10a)^2 + 2.10a.5 + 5^2$

$$= 100a^2 + 100a + 25 = 100a.(a + 1) + 25 \text{ (đpcm)}$$

Cách tính nhẩm bình phương của một số có tận cùng bằng chữ số 5 thì bằng 100 lần chữ số hàng chục nhân với số hàng chục cộng 1 rồi lấy kết quả cộng với 25.

Áp dụng: $25^2 = (10.2 + 5)^2 = 100.2(2 + 1) + 25$

$$= 200.3 + 25 = 600 + 25 = 625$$

$$35^2 = (10.3 + 5)^2 = 100.3(3 + 1) + 25 = 1225$$

$$65^2 = (10.6 + 5)^2 = 100.6(6 + 1) + 25 = 4225$$

$$75^2 = (10.7 + 5)^2 = 100.7(7 + 1) + 25 = 5625$$

* Cách 2: Cách tính nhẩm bình phương của một số có tận cùng bằng chữ số 5.

- Lấy số tận cùng bình phương được 25, giữ nguyên.

- Lấy số hàng chục cộng 1 nhân với chính nó, được bao nhiêu ghi liền trước số 25 ta được kết quả:

Ví dụ: $35^2 = 12\ 25$; $45^2 = 20\ 25$

$$55^2 = 30\ 25$$
; $65^2 = 42\ 25$

$$75^2 = 56\ 25$$
; $85^2 = 72\ 25$

18. Hãy tìm cách giúp bạn An khôi phục lại những hằng đẳng thức bị mực làm nhòe đi một số chỗ:

a) $x^2 + 6xy + \dots = (\dots + 3y)^2$.

b) $\dots - 10xy + 25y^2 = (\dots - \dots)^2$.

c) Hãy nêu một đề bài tương tự.

Giải

a) Ta phân tích theo dạng các hằng đẳng thức đáng nhớ như đề tài cách khác được $x^2 + 6xy + 9y^2 = (x + 3y)^2$ hay $(x + 3y)(x + 3y) = (x + 3y)^2$

b) Hãy $+ 25x^2 = (x + 5)^2$

$$(x + 5)^2 = 25x^2 + 20x + 25 \Rightarrow (x + 5)^2 = (x + 5)^2$$

c) Một đề bài tương tự đây $x^2 + 2x + 1 = (x + 1)^2$

19. **Đố vui** Tính diện tích phần hình còn lại mà không cần đo.

Một miếng tôn hình vuông có cạnh bằng $a + b$, bác thợ cắt đi một miếng cũng hình vuông có cạnh bằng $a - b$ (cho $a > b$). Diện tích phần hình còn lại là bao nhiêu? Diện tích phần hình còn lại có phụ thuộc vào vị trí cắt không?

Giải

Theo đề bài ta có diện tích miếng tôn hình vuông có cạnh bằng $a + b$ là:


$$S_1 = (a + b)^2$$

Diện tích miếng tôn hình vuông có cạnh bằng $a - b$ ($a > b$) do bác thợ cắt ra từ hình trên là $S_2 = (a - b)^2$

Phần diện tích còn lại là:

$$\begin{aligned} S &= S_1 - S_2 = (a + b)^2 - (a - b)^2 \\ &= a^2 + 2ab + b^2 - a^2 + 2ab - b^2 = 4ab \end{aligned}$$

Theo đề bài ta có a, b là các số đo trước nên tích $a \cdot b$ có giá trị không đổi. Vậy phần diện tích còn lại $S = 4ab$ có các giá trị không đổi hay nói cách khác hơn diện tích phần hình còn lại không phụ thuộc vào vị trí cắt.



Luyện tập

20. Phân xét sự đúng, sai của kết quả sau: $x^2 + 2xy + 4y^2 = (x + 2y)^2$.

Giải

Hãy coi $x^2 + 2xy + 4y^2 = (x + 2y)^2$ là SAI

$$\begin{aligned} \text{Thật vậy, ta có: } (x + 2y)^2 &= (x)^2 + 2(x \times 2y) + (2y)^2 \\ &= x^2 + 4xy + 4y^2 \neq x^2 + 2xy + 4y^2 \end{aligned}$$

21. Viết các đa thức sau dưới dạng bình phương của một tổng hoặc một hiệu:

a) $9x^2 - 6x + 1$;

b) $(2x + 3y)^2 + 2(2x + 3y) + 1$;

c) Hãy nêu một đề bài tương tự.

Giải

a) $9x^2 - 6x + 1 = (3x)^2 - 2(3x) \cdot 1 + 1^2 = (3x - 1)^2$

$$b) (2x + 3y)^2 = 2(2x + 3y) + 1 = (2x + 3y + 1)^2$$

$$c) \text{ Một đề bài tương tự: } 25x^2y^4 - 10xy^3 + y^2 = (5y)^2 - 2(5y)(1) + 1^2 = (5y - 1)^2$$

22. Tính nhanh: a) 101^2 ;

b) 199^2 ;

c) $47,53^2$

Giải

$$a) 101^2 = (100 + 1)^2 = 100^2 + 2.100.1 + 1^2 = 10201$$

$$b) 199^2 = (200 - 1)^2 = 200^2 - 2.200.1 + 1^2 = 40000 - 400 + 1 = 39601$$

$$c) 47,53 = (50 - 3) \Rightarrow 47,53^2 = 50^2 - 3^2 = 2500 - 9 = 2491$$

23. Chứng minh rằng: $(a + b)^2 = (a - b)^2 + 4ab$

$$(a - b)^2 = (a + b)^2 - 4ab$$

Áp dụng: a) Tính $(a - b)^2$, biết $a + b = 7$ và $a.b = 12$

b) Tính $(a + b)^2$, biết $a - b = 20$ và $a.b = 3$

Giải

Ta biến đổi từ vế phức tạp ra kết quả ở vế đơn giản

$$a) (a + b)^2 = (a - b)^2 + 4ab$$

$$\begin{aligned} \text{Thật vậy, } (a - b)^2 + 4ab &= a^2 - 2ab + b^2 + 4ab \\ &= a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2 \text{ (đpcm)} \end{aligned}$$

$$b) (a - b)^2 = (a + b)^2 - 4ab$$

$$\begin{aligned} \text{Thật vậy, } (a + b)^2 - 4ab &= a^2 + 2ab + b^2 - 4ab \\ &= a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2 \text{ (đpcm)} \end{aligned}$$

Áp dụng:

$$a) \text{ Ta có: } (a - b)^2 = (a + b)^2 - 4ab = 7^2 - 4.12 = 49 - 48 = 1$$

$$b) \text{ Ta có: } (a + b)^2 = (a - b)^2 + 4ab = 20^2 + 4.3 = 400 + 12 = 412.$$

24. Tính giá trị của biểu thức $49x^2 - 70x + 25$ trong mỗi trường hợp sau:

a) $x = 5$;

b) $x = \frac{1}{7}$.

Giải

a) Với $x = 5$,

$$\begin{aligned} \text{Ta có: } 49x^2 - 70x + 25 &= (7x)^2 - 2.7x.5 + 5^2 \\ &= (7x - 5)^2 = (7.5 - 5)^2 = (35 - 5)^2 = 30^2 = 900 \end{aligned}$$

b) Với $x = \frac{1}{7}$

$$\text{Ta có: } 49x^2 - 70x + 25 = (7x - 5)^2 = (7.\frac{1}{7} - 5)^2 = (1 - 5)^2 = (-4)^2 = 16$$

25. Tính:

a) $(a + b + c)^2$;

b) $(a + b - c)^2$;

c) $(a - b - c)^2$

Giải

Theo định lý đẳng thức đẳng thức hai vế của đẳng thức hai vế tính

$$a^2(b+c) + b^2(c+a) + c^2(a+b) = (a+b+c)(ab+bc+ca)$$

$$= a^2b + a^2c + b^2c + b^2a + c^2a + c^2b +$$

$$+ ab^2 + ba^2 + bc^2 + cb^2 + ca^2 + ac^2$$

$$= (a^2b + b^2a) + (a^2c + c^2a) + (b^2c + c^2b) + (ab^2 + ba^2) + (bc^2 + cb^2) + (ca^2 + ac^2)$$

$$= 2ab(a+b) + 2ac(a+c) + 2bc(b+c)$$

$$= 2a^2b + 2ab^2 + 2a^2c + 2ac^2 + 2ab^2 + 2ba^2 + 2bc^2 + 2cb^2$$

$$= 2a^2(b+c) + 2b^2(a+c) + 2c^2(a+b) = 2a^2b + 2a^2c + 2ab^2 + 2ba^2 + 2bc^2 + 2cb^2$$

$$= 2a^2(b+c) + 2b^2(a+c) + 2c^2(a+b)$$

$$= 2a^2(b+c) + 2b^2(a+c) + 2c^2(a+b)$$

• Bài tập mục §4

26. Tính a) $(2x^2 + 3y)^2$.

b) $(\frac{1}{2}x - 3)^2$.

Giải

$$\begin{aligned} \text{a) } (2x^2 + 3y)^2 &= (2x^2)^2 + 2(2x^2)(3y) + (3y)^2 \\ &= 4x^4 + 12x^2y + 9y^2 \end{aligned}$$

$$\text{b) } (\frac{1}{2}x - 3)^2 = (\frac{1}{2}x)^2 - 2(\frac{1}{2}x)(3) + 3^2 = \frac{1}{4}x^2 - 3x + 9$$

27. Viết các biểu thức sau dưới dạng lập phương của một tổng hoặc một hiệu.

a) $x^3 + 3x^2 - 3x + 1$,

b) $8 - 12x + 6x^2 - x^3$

Giải

$$\begin{aligned} \text{a) Ta có: } x^3 + 3x^2 - 3x + 1 &= (x^3 - 3x^2 + 3x - 1) \\ &= -(x^3 - 3x^2 + 3x - 1) = -(x-1)^3 = (1-x)^3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) Ta có: } 8 - 12x + 6x^2 - x^3 &= (8 - 12x + 6x^2 - x^3) \\ &= -(x^3 - 12x^2 + 12x - 8) = -(x-2)^3 = (2-x)^3 \end{aligned}$$

28. Tính giá trị các biểu thức sau: a) $x^3 + 12x^2 + 48x + 64$ tại $x = 6$,

b) $x^3 - 6x^2 + 12x - 8$ tại $x = 22$.

Giải

Ta đưa về các hằng đẳng thức đáng nhớ, rồi tính giá trị của biểu thức:

$$\begin{aligned} \text{a) Với } x = 6 \text{ ta có: } x^3 + 12x^2 + 48x + 64 &= (x+4)^3 + 3(x+4)^2 + 3(x+4) + 4^3 \\ &= (x+4)^3 + 12(x+4)^2 + 12(x+4) + 64 \\ &= (x+4)^3 + 12(x+4)^2 + 12(x+4) + 64 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) Với } x = 22, \text{ ta có: } x^3 - 6x^2 + 12x - 8 &= (x-2)^3 - 3(x-2)^2 + 3(x-2) - 8 \\ &= (x-2)^3 - 3(x-2)^2 + 3(x-2) - 8 \end{aligned}$$

29. Đồ vui: Đọc định dạng quy.

Hãy viết mỗi biểu thức sau dưới dạng bình phương hoặc lập phương của một tổng hoặc một hiệu, rồi điền chỗ trống vào bảng

chờ thích hợp. Sau khi thêm dầu, em sẽ tìm ra một trong những đồ chơi quý báu của con người.

$$\begin{array}{ll} x^3 - 3x^2 + 3x - 1 & N \\ 16 + 8x + x^2 & U \\ 3x^2 + 3x + 1 + x^3 & H \\ 1 - 2y + y^2 & A \end{array}$$

$(x-1)^2$	$(x+1)^2$	$(y-1)^2$	$(x-1)^2$	$(1+x)^2$	$(1-y)^2$	$(x+4)^2$

Giải

Ta có: *

$$x^3 - 3x^2 + 3x - 1 = x^3 - 3x^2.1 + 3x.1^2 - 1^3 = (x-1)^3 = N$$

$$16 + 8x + x^2 = 4^2 + 2.4.x + x^2 = (4+x)^2 = (x+4)^2 = U$$

$$3x^2 + 3x + 1 + x^3 = x^3 + 3x^2 + 3x + 1$$

$$= x^3 + 3x^2.1 + 3x.1^2 + 1 = (x+1)^3 = (1+x)^3 = H$$

$$1 - 2y + y^2 = (1-y)^2 = (y-1)^2 = A$$

Vậy:

$(x-1)^2$	$(x+1)^2$	$(y-1)^2$	$(x-1)^2$	$(1+x)^2$	$(1-y)^2$	$(x+4)^2$
N	H	A	N	H	A	U

• Bài tập mục §5

30. Rút gọn các biểu thức sau:

a) $(x+3)(x^2-3x+9) - (54+x^3)$;
 b) $(2x+y)(4x^2-2xy+y^2) - (2x-y)(4x^2+2xy+y^2)$.

Giải

a) $(x+3)(x^2-3x+9) - (54+x^3) = (x+3)(x^2-3x+3^2) - (54+x^3)$
 $= (x^3+3^3) - (54+x^3) = x^3+3^3-54-x^3$
 $= 3^3-54=27-54=-27$

b) $(2x+y)(4x^2-2xy+y^2) - (2x-y)(4x^2+2xy+y^2)$
 $= (2x+y)(2x)^2-2xy+y^2 - (2x-y)(2x)^2+2xy+y^2$
 $= [(2x)^2+y^2] - [(2x)^2-y^2] = (2x)^2+y^2 - (2x)^2+y^2 = 2y^2$

31. Chứng minh rằng: a) $a^3+b^3 = (a+b)^3 - 3ab(a+b)$

b) $a^3-b^3 = (a-b)^3 + 3ab(a-b)$

Áp dụng: Tính a^3+b^3 biết $a.b=6$; $a+b=-5$

Giải

Ta biến đổi vế trái (VT) ra vế phải (VP)

a) $(a+b)^3 - 3ab(a+b) = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 - 3a^2b - 3ab^2 = a^3 + b^3$ (đpcm)

b) $(a-b)^3 + 3ab(a-b) = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3 + 3a^2b - 3ab^2 = a^3 - b^3$ (đpcm)

Áp dụng, tính: a^3+b^3 với $ab=6$; $a+b=-5$

Ta có: $a^3+b^3 = (a+b)^3 - 3ab(a+b) = (-5)^3 - 3.6.(-5) = 35$

32. Điền vào ô trống các hạng bị thiếu: hợp

a) $(3x + y)(\quad) = \quad = 27x^2 + y$

b) $(2x - \quad)(\quad) = 10x + \quad = 8x^2 - 12x$

Giải

a) $(3x + y)(\quad) = \quad = 27x^2 + y$

hay $(3x + y)(9x - 12x + x) = (3x)^2 + y$

hay $(3x + y)(9x - 12x + x) = 27x^2 + y$

b) $(2x - \quad)(\quad) = 10x + \quad = 8x^2 - 12x$

hay $(2x - 5)(2x^2 + 10x + 5) = (2x)^2 - 5$

hay $(2x - 5)(4x^2 + 10x + 25) = 8x^2 - 125$

Luyện tập

33. Tính a) $(2 + xy)^2$.

b) $(5 - 3xy)^2$.

c) $(5 - x^2)(5 + x^2)$.

d) $(5x - 1)^2$.

e) $(2x - y)(4x^2 + 2xy + y^2)$.

f) $(x + 3)(x^2 - 3x + 9)$

Giải

a) $(2 + xy)^2 = 2^2 + 2 \cdot 2 \cdot xy + (xy)^2 = 4 + 4xy + x^2y^2$

b) $(5 - 3xy)^2 = 5^2 - 2 \cdot 5 \cdot 3x + (3x)^2 = 25 - 30x + 9x^2$

c) $(5 - x^2)(5 + x^2) = 5^2 - (x^2)^2 = 25 - x^4$

d) $(5x - 1)^2 = (5x)^2 - 2 \cdot 5x \cdot 1 + 1^2 = 25x^2 - 10x + 1$

e) $(2x - y)(4x^2 + 2xy + y^2) = (2x - y)2x^2 + 2xy + y^2$

$= (2x)^3 - y^3 = 8x^3 - y^3$

f) $(x + 3)(x^2 - 3x + 9) = x^3 - 3^3 = x^3 - 27$

34. Rút gọn các biểu thức sau: a) $(a + b)^2 - (a - b)^2$;

b) $(a + b)^3 - (a - b)^3 - 2b^3$;

c) $(x + y + z)^2 - 2(x + y + z)(x + y) + (x + y)^2$.

Giải

a) $(a + b)^2 - (a - b)^2 = (a + b + a - b)(a + b - a + b)$

$= (a + b + a - b)a + b \cdot a + b = 2a \cdot 2b = 4ab$

b) $(a + b)^3 - (a - b)^3 - 2b^3 = (a + b)^3 - (a - b)^3 - 2b^3$

$= (a + b) \cdot (a - b)(a + b)^2 + (a + b)a(a - b) + (a - b)^2 - 2b^3$

$= (a + b) \cdot a + b(a^2 + 2ab + b^2 + a^2 - b^2 + a^2 - b^2 - 2ab + b^2) - 2b^3$

$= 2b(3a^2 + b^2) - 2b^3 = 6a^2b + 2b^3 - 2b^3 = 6a^2b$

c) * Cách 1:

$(x + y + z)^2 - 2(x + y + z)(x + y) + (x + y)^2 = x^2 + y^2 + z^2 + 2xy + 2yz$

$+ 2zx - 2x^2 - 2xy - 2yx - 2y^2 - 2xz - 2xy + x^2 + 2xy + y^2 = z^2$

$$\begin{aligned} & \text{* Cách 2: } (x + y + z)^2 = 2(x + y + z)(x + y) + (x + y)^2 \\ & = [(x + y + z) - (x + y)]^2 = (x + y + z - x - y)^2 = z^2 \end{aligned}$$

35. Tính nhanh:

a) $34^2 + 66^2 + 68.66$;

b) $74^2 + 24^2 - 48.74$.

Giải

a) $34^2 + 66^2 + 68.66 = 34^2 + 2.34.66 + 66^2 = (34 + 66)^2 = 100^2 = 10000$

b) $74^2 + 24^2 - 48.74 = 24^2 - 2.24.74 + 74^2 = (24 - 74)^2 = (-50)^2 = 2500$

36. Tính giá trị các biểu thức sau:

a) $x^2 + 4x + 4$ tại $x = 98$;

b) $x^2 + 3x^2 + 3x + 1$ tại $x = 99$.

Giải

a) $x^2 + 4x + 4$ với $x = 98$

Ta có: $x^2 + 4x + 4 = (x^2 + 2x.2 + 2^2) = (x + 2)^2 = (98 + 2)^2 = 100^2 = 10000$

b) $x^2 + 3x^2 + 3x + 1$ với $x = 99$

Ta có: $(x^2 + 3x^2 + 3x + 1) = (x + 1)^2 = (99 + 1)^2 = 100^2 = 10000$

37. Dùng bút chì nối các biểu thức sao cho chúng tạo thành các hằng đẳng thức.

$(x - y)(x^2 + xy + y^2)$	$x^2 + y^2$
$(x + y)(x - y)$	$x^2 - y^2$
$x^2 - 2xy + y^2$	$x^2 + 2xy + y^2$
$(x + y)^2$	$x^2 - y^2$
$(x + y)(x^2 - xy + y^2)$	$(y - x)^2$
$y^2 + 3xy^2 + 3x^2y + x^3$	$x^3 - 3x^2y + 3xy^2 - y^3$
$(x - y)^2$	$(x + y)^2$

Giải

Nếu để có hằng đẳng thức:

$(x - y)(x^2 + xy + y^2)$	$x^3 + y^3$
$(x + y)(x - y)$	$x^2 - y^2$
$x^2 - 2xy + y^2$	$x^2 + 2xy + y^2$
$(x + y)^2$	$x^2 - y^2$
$(x + y)(x^2 - xy + y^2)$	$(y - x)^2$
$y^2 + 3xy^2 + 3x^2y + x^3$	$x^3 - 3x^2y + 3xy^2 - y^3$
$(y - x)^2$	$(x + y)^2$

38. Chứng minh các đẳng thức sau:

a) $(a - b)^3 = (b - a)^3$.

b) $(-a - b)^2 = (a + b)^2$

Giải

Ta biến đổi số hạng thứ 2 của biểu thức lại:

ta Chung nhân với $(x - 2)$ để có:

$$Ta có: (x - 2)(x - 2) = x^2 - 4x + 4 = (x - 2)(x - 2) \quad \text{đặt } (x - 2) = A \text{ thì ta có:}$$

ta Chung nhân với $(x - 2)$ để có:

$$Ta có: (x - 2)(x - 2) = x^2 - 4x + 4 = (x - 2)(x - 2) \quad \text{đặt } (x - 2) = A \text{ thì ta có:}$$

§6. PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶT NHÂN TỬ CHUNG

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. **Nhắc lại:** Phân tích đa thức thành nhân tử (hay thừa số) ta biến đổi đa thức thành một tích của những đa thức.

Ví dụ: Phân tích đa thức $3x^2 - 6x$ thành nhân tử

$$Ta có: 3x^2 - 6x = 3x(x - 2)$$

2. **Ứng dụng của việc phân tích đa thức thành nhân tử**

Việc phân tích đa thức thành nhân tử có nhiều lợi ích giúp chúng ta rút gọn được biểu thức tính nhanh, giải phương trình.

3. **Các phương pháp phân tích thành nhân tử cơ bản thường gặp**

Phương pháp đặt nhân tử chung

Phương pháp dùng hằng đẳng thức

Phương pháp nhóm hạng tử

Phối hợp nhiều phương pháp

Ngoài ra còn có những phương pháp đặc biệt hơn như: Phương pháp thêm bớt cùng một hạng tử vào đa thức, phương pháp tách hạng tử.

4. **Phương pháp đặt nhân tử chung**

Khi tất cả các số hạng của đa thức có một thừa số chung, ta đặt thừa số chung đó ra ngoài dấu ngoặc () để làm nhân tử chung.

Các số hạng bên trong dấu () có được bằng cách lấy số hạng của đa thức chia cho nhân tử chung.

5. **Chú ý:** Nhiều khi cần đổi dấu các hạng tử để làm xuất hiện nhân tử chung

$$\text{Ví dụ: } 2x(x - y) + (y - x) = 2x(x - y) + (x - y)(-1) = (x - y)(2x - 1)$$

II. BÀI TẬP

A. Bài tập mẫu

1. Phân tích đa thức thành nhân tử:

a) $x^2 - x$;

b) $5x^2(x - 2y) - 15x(x - 2y)$.

c) $3(x - y) - 5x(y - x)$

Giải

a) $x^2 - x = x(x - 1)$

b) $5x^2(x - 2y) - 15x(x - 2y) = 5x.x(x - 2y) - 5x.3(x - 2y) = 5x[x(x - 2y) - 3(x - 2y)]$

c) $3(x - y) - 5x(y - x) = 3(x - y) - 5x[-(x - y)]$
 $= 3(x - y) + 5x(x - y) = (x - y)(3 + 5x).$

2. Giải phương trình:

a) $3x^2 - 6x = 0$;

b) $2x(x - 3) + 5(x - 3) = 0$.

Giải

Hướng dẫn: $A.B = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} A = 0 \\ B = 0 \end{cases}$

a) Ta có: $3x^2 - 6x = 0 \Leftrightarrow 3x(x - 2) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 3x = 0 \\ x - 2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 2 \end{cases}$

Vậy phương trình có 2 nghiệm là $x = 0$ hoặc $x = 2$

b) $2x(x - 3) + 5(x - 3) = 0 \Leftrightarrow (x - 3)(2x + 5) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x - 3 = 0 \\ 2x + 5 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3 \\ x = -\frac{5}{2} \end{cases}$

Vậy phương trình có 2 nghiệm là $x = 3$ hoặc $x = -\frac{5}{2}$.

B. Bài tập căn bản

39. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) $3x - 6y$;

b) $\frac{2}{5}x^2 + 5x^3 + x^2y$;

c) $14x^2y - 21xy^2 + 28x^2y^2$;

d) $\frac{2}{5}x(y - 1) - \frac{2}{5}y(y - 1)$

e) $10x(x - y) - 8y(y - x)$.

Giải

a) $3x - 6y = 3(x - 2y)$

b) $\frac{2}{5}x^2 + 5x^3 + x^2y = x^2(\frac{2}{5} + 5x + y)$

c) $14x^2y - 21xy^2 + 28x^2y^2 = 7xy(2x - 3y + 4xy)$

d) $\frac{2}{5}x(y - 1) - \frac{2}{5}y(y - 1) = \frac{2}{5}(y - 1)(x - y)$

$$a) 10(x-y) = 8(x-y) + 2(x-y) \Rightarrow 10(x-y) = 8(x-y) + 2(5x+4y)$$

40. Tính giá trị các biểu thức sau

a) $15.91,5 + 150.0,85$

b) $x(x-1) = y(1-x)$ tại $x = 2001$ và $y = 1999$

Giải

$$\begin{aligned} a) 15.91,5 + 150.0,85 &= 15.91,5 + 15.10.0,85 \\ &= 15.91,5 + 15.8,5 = 15.(91,5 + 8,5) = 15.100 = 1500 \end{aligned}$$

b) $x(x-1) = y(1-x)$ tại $x = 2001$ và $y = 1999$

$$\begin{aligned} x(x-1) + y(x-1) &= (x-1)(x+y) = (2001-1).(2001+1999) \\ &= 2000.4000 = 8.000.000 \end{aligned}$$

41. Tìm x, biết:

a) $5x(x-2000) = x+2000 = 0$,

b) $x^2 - 13x = 0$

Giải

a) $5x(x-2000) = x+2000 = 0 \Leftrightarrow 5x(x-2000) - (x+2000) = 0$

$$\Leftrightarrow (x-2000)(5x-1) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x-2000=0 \\ 5x-1=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=2000 \\ x=\frac{1}{5} \end{cases}$$

Vậy $x = \frac{1}{5}$ hoặc $x = 2000$

$$b) x^2 - 13x = 0 \Leftrightarrow x(x^2 - 13) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x=0 \\ x^2-13=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=0 \\ x=\pm\sqrt{13} \end{cases}$$

Vậy $x = 0$ hoặc $x = \pm\sqrt{13}$

42. Chứng minh rằng $55^{n+1} - 55^n$ chia hết cho 54 (với n là số tự nhiên).

Giải

Ta có: $55^{n+1} - 55^n = 55^n.55 - 55^n = 55^n(55 - 1)$

$$= 55^n.54 \text{ (với } n \in \mathbb{N})$$

§7. PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÙNG HẰNG ĐẲNG THỨC

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

Về áp dụng phương pháp dùng hằng đẳng thức cần lưu ý:

Trước tiên phải nhận xét xem các hạng tử của đa thức có chưa nhân tử chung không? Nếu có thì áp dụng phương pháp đặt thành nhân tử chung

Nếu không áp dụng được phương pháp đặt thành nhân tử chung thì xem có thể áp dụng hằng đẳng thức đáng nhớ để phân tích đa thức thành nhân tử hay không?

Chú ý: Đôi khi phải đổi dấu mới áp dụng được hằng đẳng thức.

Ví dụ: $x^2y - 8x^2y - 16 = -(x^2y + 8x^2y + 16) = -(x^2y + 4)^2$

II. BÀI TẬP

A. Bài tập mẫu

1. Phân tích đa thức thành nhân tử:

a) $x^2 - 4x + 4$.

b) $1 - 8x^3$.

c) $4x^2 + 4x - 1$

Giải

a) $x^2 - 4x + 4 = x^2 - 2 \cdot x \cdot 2 + 2^2 = (x - 2)^2$

b) $1 - 8x^3 = (1)^3 - (2x)^3 = (1 - 2x)(1^2 + 1 \cdot 2x + (2x)^2) = (1 - 2x)(1 + 2x + 4x^2)$

c) $4x^2 + 4x - 1 = -4x^2 - 4x + 1 = -(2x)^2 - 2 \cdot 2x \cdot 1 + 1^2 = -(2x - 1)^2$

2. a) Tính nhanh: $105^2 - 25$

b) Hiệu các bình phương của hai số tự nhiên liên tiếp bằng 11. Tìm hai số a, b .

Giải

a) Tính nhanh: $105^2 - 25$

Ta có: $105^2 - 25 = 105^2 - 5^2 = (105 + 5)(105 - 5) = 110 \cdot 100 = 11000$

b) Gọi hai số tự nhiên liên tiếp cần tìm là n và $n + 1$

Theo đề bài, ta có: $(n + 1)^2 - n^2 = 11 \Leftrightarrow n^2 + 2n + 1 - n^2 = 11$

$\Leftrightarrow 2n + 1 = 11 \Leftrightarrow 2n = 10 \Leftrightarrow n = 5$

Vậy hai số phải tìm là 5 và 6

B. Bài tập cơ bản

43. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) $x^2 + 6x + 9$.

b) $10x^2 - 25 - x^3$.

c) $8x^3 - \frac{1}{8}$.

d) $\frac{1}{25}x^2 - 64$.

Giải

$$\text{a) } 3x^2 + 6x + 9 = 3(x^2 + 2x + 3) = 3(x + 1)^2 + 2$$

$$\text{b) } 10x^2 - 25 = 5(x^2 - 5) = 5(x - \sqrt{5})(x + \sqrt{5}) = 5(x - \sqrt{5})(x + \sqrt{5})$$

$$\begin{aligned} \text{c) } 4x^3 - \frac{1}{8} &= 4x^3 - \frac{1}{2^3} = \frac{1}{2} \left(8x^3 - \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2} (2x)^3 - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^3 \\ &= \frac{1}{2} \left(2x - \frac{1}{2} \right) \left(4x^2 + 2x + \frac{1}{4} \right) \end{aligned}$$

$$\text{d) } \frac{1}{25}x^2 - 64y^2 = \frac{1}{5}x^2 - (8y)^2 = \frac{1}{5}(x + 40y)\left(\frac{1}{5}x - 40y\right)$$

44. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử

$$\text{a) } x^3 + \frac{1}{27}$$

$$\text{b) } (a + b)^3 - (a - b)^3$$

$$\text{c) } (a + b)^3 + (a - b)^3$$

$$\text{d) } 8x^3 + 12x^2y + 6xy^2 + y^3$$

$$\text{e) } x^3 + 9x^2 - 27x + 27$$

Giải

$$\text{a) } x^3 + \frac{1}{27} = x^3 + \left(\frac{1}{3}\right)^3 = \left(x + \frac{1}{3}\right)\left(x^2 - \frac{1}{3}x + \frac{1}{9}\right)$$

$$\begin{aligned} \text{b) } (a + b)^3 - (a - b)^3 &= [(a + b) - (a - b)][(a + b)^2 + (a + b)(a - b) + (a - b)^2] \\ &= (a + b - a + b)a^2 + 2ab + b^2 + a^2 - b^2 + a^2 - 2ab + b^2 = 2b(3a^2 + b^2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c) } (a + b)^3 + (a - b)^3 &= [(a + b) + (a - b)][(a + b)^2 + (a + b)(a - b) + (a - b)^2] \\ &= (a + b + a - b)a^2 + 2ab + b^2 + a^2 + b^2 + a^2 - 2ab + b^2 = 2a(a^2 + 3b^2) \end{aligned}$$

$$\text{d) } 8x^3 + 12x^2y + 6xy^2 + y^3 = (2x)^3 + 3(2x)^2y + 3(2x)y^2 + (y)^3 = (2x + y)^3$$

$$\begin{aligned} \text{e) } x^3 + 9x^2 - 27x + 27 &= (x^3 - 9x^2 + 27x - 27) \\ &= [(x)^3 - 3x^2(3 + 3x) + 3^2(3 - x)] = (x - 3)^3 = (3 - x)^3 \end{aligned}$$

45. Tìm x, biết:

$$\text{a) } 2 - 25x^2 = 0;$$

$$\text{b) } x^2 - x + \frac{1}{4} = 0.$$

Giải

$$\text{a) } 2 - 25x^2 = 0 \Leftrightarrow (\sqrt{2})^2 - (5x)^2 = 0 \Leftrightarrow (\sqrt{2} + 5x)(\sqrt{2} - 5x) = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \sqrt{2} + 5x = 0 \\ \sqrt{2} - 5x = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{\sqrt{2}}{5} \\ x = \frac{\sqrt{2}}{5} \end{cases} \quad +$$

$$\text{Vậy } x = \pm \frac{\sqrt{2}}{5}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } x^2 - x + \frac{1}{4} &= 0 \Leftrightarrow x^2 - 2x \cdot \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{2}\right)^2 = 0 \\ &\Leftrightarrow \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 = 0 \Leftrightarrow x - \frac{1}{2} = 0 \Leftrightarrow x = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

$$\text{Vậy } x = \frac{1}{2}.$$

46. Tính nhanh:

a) $73^2 - 27^2$;

b) $37^2 - 13^2$;

c) $2002^2 - 2^2$

Giải

a) $73^2 - 27^2 = (73 + 27)(73 - 27) = 100 \cdot 46 = 4600$

b) $37^2 - 13^2 = (37 + 13)(37 - 13) = 50 \cdot 24 = 1200$

c) $2002^2 - 2^2 = (2002 + 2)(2002 - 2) = 2004 \cdot 2000 = 4\,008\,000$

§8. PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM HẠNG TỬ

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. Phương pháp chung:

- Trước hết ta nhận xét rằng đa thức đó không thể phân tích thành nhân tử bằng phương pháp đặt thành nhân tử chung (PP1), dùng hằng đẳng thức đáng nhớ (PP2). Khi đó ta nghĩ đến phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử (PP3).
- Ta nhận xét để tìm cách nhóm các hạng tử một cách thích hợp (có thể giao hoán các hạng tử để nhóm) sao cho sau khi nhóm từng nhóm đa thức có thể phân tích được thành nhân tử bằng PP1, PP2 và khi đó đa thức mới phải xuất hiện nhân tử chung.
- Ta áp dụng phương pháp đặt thành nhân tử chung để phân tích đa thức đã cho thành nhân tử.

Ví dụ: Phân tích đa thức sau thành nhân tử: $2xy + 3z + 6y + xz$

B1: Ta nhận thấy rằng đa thức không thể phân tích bằng PP1 hoặc PP2. Ta nghĩ đến dùng PP3.

B2: Ta thấy rằng cần giao hoán các hạng tử để có cách nhóm thích hợp. Đó là:

$$\begin{aligned} 2xy + 3z + 6y + xz &= 2xy + 6y + 3z + xz \\ &= (2xy + 6y) + (3z + xz) = 2y(x + 3) + z(x + 3) = (x + 3)(2y + z) \end{aligned}$$

2. Chú ý

Đầu với một đa thức, ta có thể đa thức chia nhóm các hạng tử một cách thích hợp.

Khi phân tích đa thức thành nhân tử ta phải phân tích đến cuối cùng (đến khi nào không thể còn phân tích được nữa).

Đều phân tích bằng cách nào thì kết quả cũng là duy nhất.

Khi nhóm các hạng tử thì phải chú ý dấu của đa thức.

II. BÀI TẬP

A. Bài tập mẫu

1. Phân tích các đa thức sau đây thành nhân tử

a) $xy - 5y + 2x - 10$; b) $2xy + z + 2x + yz$; c) $x^2 + 2x + 1 - y^2$.

Giải

$$\begin{aligned}\text{a) } xy - 5y + 2x - 10 &= (xy - 5y) + (2x - 10) \\ &= y(x - 5) + 2(x - 5) = (x - 5)(y + 2) \\ \text{b) } 2xy + z + 2x + yz &= (2xy + 2x) + (z + yz) \\ &= 2x(y + 1) + z(y + 1) = (y + 1)(2x + z) \\ \text{c) } x^2 + 2x + 1 - y^2 &= (x^2 + 2x + 1) - y^2 \\ &= (x + 1)^2 - y^2 = (x + 1 + y)(x + 1 - y).\end{aligned}$$

2. Tìm y , biết $y(y - 4) + y - 4 = 0$

Giải

$$\begin{aligned}\text{Ta có: } y(y - 4) + y - 4 &= 0 \Leftrightarrow y(y - 4) + (y - 4) = 0 \\ &\Leftrightarrow (y - 4)(y + 1) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} y - 4 = 0 \\ y + 1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = 4 \\ y = -1 \end{cases}\end{aligned}$$

Vậy $y = 4$ hoặc $y = -1$.

B. Bài tập căn bản

47. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử

a) $x^2 - xy + x - y$; b) $xz + yz - 5(x + y)$;
c) $3x^2 - 3xy - 5x + 5y$.

Giải

$$\begin{aligned}\text{a) } x^2 - xy + x - y &= (x^2 - xy) + (x - y) = x(x - y) + (x - y) = (x - y)(x + 1) \\ \text{b) } xz + yz - 5(x + y) &= (xz + yz) - 5(x + y) \\ &= z(x + y) - 5(x + y) = (x + y)(z - 5) \\ \text{c) } 3x^2 - 3xy - 5x + 5y &= (3x^2 - 3xy) - (5x - 5y) \\ &= 3x(x - y) - 5(x - y) = (x - y)(3x - 5)\end{aligned}$$

48. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) $x^2 + 4x - y^2 + 4$;

b) $3x^2 + 6xy + 3y^2 - 3z^2$;

c) $x^2 - 2xy + y^2 - z^2 + 2xz - t^2$.

Giải

a) $x^2 + 4x - y^2 + 4 = (x^2 + 4x + 4) - y^2$

$$= (x + 2)^2 - y^2 = (x + 2 + y)(x + 2 - y)$$

b) $3x^2 + 6xy + 3y^2 - 3z^2 = 3(x^2 + 2xy + y^2 - z^2) = 3[(x^2 + 2xy + y^2) - z^2]$

$$= 3[(x + y)^2 - z^2] = 3(x + y + z)(x + y - z)$$

c) $x^2 - 2xy + y^2 - z^2 + 2xz - t^2 = (x^2 - 2xy + y^2) - (z^2 - 2xz + t^2)$

$$= (x - y)^2 - (z - t)^2 = [(x - y) + (z - t)][(x - y) - (z - t)]$$

$$= (x - y + z - t)(x - y - z + t).$$

49. Tính nhanh: a) $37,5 \cdot 6,5 - 7,5 \cdot 3,4 - 6 \cdot 6,7,5 + 3,5 \cdot 37,5$

b) $45^2 + 40^2 - 15^2 + 80 \cdot 45$

Giải

a) $37,5 \cdot 6,5 - 7,5 \cdot 3,4 - 6 \cdot 6,7,5 + 3,5 \cdot 37,5 = (37,5 \cdot 6,5 + 3,5 \cdot 37,5) - (7,5 \cdot 3,4 + 6 \cdot 7,5)$

$$= 37,5(6,5 + 3,5) - 7,5(3,4 + 6 \cdot 2) = 37,5 \cdot 10 - 7,5 \cdot 10$$

$$= 10(37,5 - 7,5) = 10 \cdot 30 = 300$$

b) $45^2 + 40^2 - 15^2 + 80 \cdot 45 = (40^2 + 80 \cdot 45 + 45^2) - 15^2$

$$= (40^2 + 2 \cdot 40 \cdot 45 + 45^2) - 15^2 = (40 + 45)^2 - 15^2 = 85^2 - 15^2$$

$$= (85 + 15)(85 - 15) = 100 \cdot 70 = 7000$$

50. Tìm x, biết

a) $x(x - 2) + x - 2 = 0$;

b) $5x(x - 3) - x + 3 = 0$

Giải

a) $x(x - 2) + x - 2 = 0 \Leftrightarrow x(x - 2) + (x - 2) = 0$

$$\Leftrightarrow (x - 2)(x + 1) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x - 2 = 0 \\ x + 1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ x = -1 \end{cases}$$

Vậy $x = 2$ hoặc $x = -1$

b) $5x(x - 3) - x + 3 = 0 \Leftrightarrow 5x(x - 3) - (x - 3) = 0$

$$\Leftrightarrow (x - 3)(5x - 1) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x - 3 = 0 \\ 5x - 1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3 \\ x = \frac{1}{5} \end{cases}$$

Vậy $x = 3$ hoặc $x = \frac{1}{5}$.

§9. PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG CÁCH PHỐI HỢP NHIỀU PHƯƠNG PHÁP

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. *Phương pháp chung*: Ta đi tìm hướng giải bài toán bằng cách đặc kỳ đã n rút ra nhân tử có thể

Đặt nhân tử chung

Hoặc dùng hằng đẳng thức

Hoặc nhóm nhiều hạng tử

Hoặc có thể phối hợp các phương pháp trên để phân tích đa thức thành nhân tử

Ví dụ: Phân tích đa thức thành nhân tử

$$\begin{aligned}x^2 - 2xy + y^2 - 4 &= (x^2 - 2xy + y^2) - 4 \\&= (x - y)^2 - 2^2 = (x - y + 2)(x - y - 2)\end{aligned}$$

2. *Chú ý*: Nếu các hạng tử của đa thức có nhân tử chung, ta nên đặt nhân tử chung ra ngoài dấu ngoặc () để đa thức trong () đơn giản hơn rồi mới tiếp tục phân tích đến cuối cùng khi không còn phân tích được nữa

II. BÀI TẬP

A. Bài tập mẫu

1. Phân tích đa thức thành nhân tử

a. $3xy^2 - 12xy + 12x$.

b. $x^2 + 2xy + y^2 - x^2 - y^2$.

c. $4x^3 - x^3 + 4x^2 - x$

Giải

a. $3xy^2 - 12xy + 12x = 3x(y^2 - 4y + 4) = 3x(y - 2)^2$

b. $x^2 + 2xy + y^2 - x^2 - y^2 = (x^2 + 2xy + y^2) - (x^2 + y^2)$
 $= (x + y)^2 - x^2 - y^2 = (x + y + x)(x + y - x) + (x + y - y)(x + y + y)$

c. $4x^3 - x^3 + 4x^2 - x = x(4x^2 - x^2 + 4x - 1) = x(4x^2 - x^2) + (4x - 1)$
 $= x(x^2)(4x - 1) + (4x - 1) = (x + 1)(x - 1)(4x - 1)$

2. Tìm x, biết: $(2x - 3)^2 - (x + 5)^2 = 0$.

Giải

Ta có $(2x - 3)^2 - (x + 5)^2 = 0 \Leftrightarrow [(2x - 3) + (x + 5)][(2x - 3) - (x + 5)] = 0$
 $\Leftrightarrow (2x - 3 + x + 5)(2x - 3 - x - 5) = 0$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} (3x + 2)(x - 8) = 0 \vee \\ (3x + 2 = 0 \vee x - 8 = 0) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -\frac{2}{3} \\ x = 8 \end{cases}$$

$$\text{Vậy } x = 8 \text{ hoặc } x = -\frac{2}{3}.$$

B. Bài tập căn bản

51. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

$$\text{a) } x^3 - 2x^2 + x; \quad \text{b) } 2x^3 + 4x + 2 - 2y^2; \quad \text{c) } 2xy - x^2 - y^2 + 16$$

Giải

$$\text{a) } x^3 - 2x^2 + x = x(x^2 - 2x + 1) = x(x - 1)^2$$

$$\begin{aligned} \text{b) } 2x^3 + 4x + 2 - 2y^2 &= 2(x^3 + 2x + 1 - y^2) = 2[(x^3 + 2x + 1) - y^2] \\ &= 2[(x + 1)^2 - y^2] = 2(x + 1 + y)(x + 1 - y) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c) } 2xy - x^2 - y^2 + 16 &= -(x^2 - 2xy + y^2 - 16) = -(x^2 - 2xy + y^2 - 16) \\ &= -[(x - y)^2 - 4^2] = -(x - y + 4)(x - y - 4) \\ &= (4 - x + y)(4 + x - y) \end{aligned}$$

52. Chứng minh rằng $(5n + 2)^2 - 4$ chia hết cho 5 với mọi số nguyên n .

Giải

$$\begin{aligned} \text{Ta có: } (5n + 2)^2 - 4 &= (5n)^2 + 2 \cdot (5n) \cdot 2 + 2^2 - 4 = 25n^2 + 20n + 4 - 4 \\ &= 25n^2 + 20n = 5n(5n + 4) : 5 \text{ (đpcm)} \end{aligned}$$

53. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

$$\text{a) } x^3 - 3x + 2$$

Gọi y : Ta không thể áp dụng ngay các phương pháp đã học để phân tích nhưng nếu tách hạng tử $-3x = -x - 2x$ thì ta có $x^3 - 3x + 2 = x^3 - x - 2x + 2$ và có thể dễ dàng phân tích tiếp.

Cũng có thể tách 2 = -4 + 6 ta có $x^3 - 3x + 2 = x^3 - 4 - 3x + 6$, tự đây dễ dàng phân tích tiếp.

$$\text{b) } x^3 + x - 6;$$

$$\text{c) } x^3 + 5x + 6.$$

Giải

a) Theo gợi ý của bài này, trong toán học đây gọi là phương pháp "Tách một hạng tử thành nhiều hạng tử". Chúng ta sẽ xem thêm trong phần "Phân tích đa thức thành nhân tử bằng vài phương pháp khác".

$$\text{Ta có: } x^3 - 3x + 2 = (x - 2)(x - 1).$$

$$\begin{aligned} \text{b) } x^3 + \frac{x}{-2x + 3x} - 6 &= x^3 - 2x + 3x - 6 \\ &= (x^3 - 2x) + (3x - 6) = x(x - 2) + 3(x - 2) \\ &= (x - 2)(x + 3) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c) } x^3 + 5x + 6 &= x^3 + 2x + 3x + 6 = (x^3 + 2x) + (3x + 6) \\ &= x(x + 2) + 3(x + 2) = (x + 2)(x + 3). \end{aligned}$$

Luyện tập

54. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử

a) $x^3 + 2x^2y + xy^2 - 9x$,

b) $2x^2 - 2y - x^2 + 2xy - y^2$

c) $x^4 - 2x^2$

Giải

Phân tích các đa thức thành nhân tử

a) $x^3 + 2x^2y + xy^2 - 9x = x(x^2 + 2xy + y^2 - 9)$

$$= x(x^2 + 2xy + y^2 - 9) = x(x + y)^2 - 3x^2$$

$$= x(x + y + 3)(x + y - 3)$$

b) $2x^2 - 2y - x^2 + 2xy - y^2 = (2x^2 - 2y) - (x^2 - 2xy + y^2)$

$$= 2x(x - y) - (x - y)^2 = (x - y)(2 - (x - y))$$

$$= (x - y)(2 - x + y)$$

c) $x^4 - 2x^2 = x^2(x^2 - 2)$

55. Tìm x biết:

a) $x^3 - \frac{1}{4}x = 0$;

b) $(2x - 1)^2 - (x + 3)^2 = 0$;

c) $x^2(x - 3) + 12 - 4x = 0$

Giải

Having doubt, $A \cdot B = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} A = 0 \\ B = 0 \end{cases}$

a) $x^3 - \frac{1}{4}x = 0 \Leftrightarrow x(x^2 - \frac{1}{4}) = 0 \Leftrightarrow x(x^2 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}) = 0$

$$\Leftrightarrow x(x + \frac{1}{2})(x - \frac{1}{2}) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x + \frac{1}{2} = 0 \Leftrightarrow x = -\frac{1}{2} \\ x - \frac{1}{2} = 0 \Leftrightarrow x = \frac{1}{2} \end{cases}$$

Vậy $x = -\frac{1}{2}$ hoặc $x = 0$ hoặc $x = \frac{1}{2}$

b) $(2x - 1)^2 - (x + 3)^2 = 0 \Leftrightarrow (2x - 1) + (x + 3) \cdot (2x - 1) - (x + 3) = 0$

$$\Leftrightarrow (3x + 2)(x - 4) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 3x + 2 = 0 \\ x - 4 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{2}{3} \\ x = 4 \end{cases}$$

Vậy $x = -\frac{2}{3}$ hoặc $x = 4$

c) $x^2(x - 3) + 12 - 4x = 0 \Leftrightarrow x^2(x - 3) - 4(x - 3) = 0 \Leftrightarrow (x - 3)(x^2 - 4) = 0$

$$\Leftrightarrow (x - 3)(x - 2)(x + 2) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x - 3 = 0 \\ x - 2 = 0 \\ x + 2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3 \\ x = 2 \\ x = -2 \end{cases}$$

Vậy $x = -2$ hoặc $x = 2$ hoặc $x = 3$.

56. Tính nhanh giá trị của đa thức: a) $x^2 + \frac{1}{2}x + \frac{1}{16}$ tại $x = 49,75$

b) $x^2 - y^2 - 2y - 1$ với $x = 93$ và $y = 6$

Giải

Ta thu gọn đa thức trước khi thay số vào để tính:

$$\begin{aligned} \text{a) Với } x = 49,75, \text{ ta có: } x^2 + \frac{1}{2}x + \frac{1}{16} &= x^2 + 2 \cdot x \cdot \frac{1}{4} + \left(\frac{1}{4}\right)^2 = \left(x + \frac{1}{4}\right)^2 \\ &= (49,75 + 0,25)^2 = 50^2 = 2500 \end{aligned}$$

b) Với $x = 93$; $y = 6$, ta có:

$$\begin{aligned} x^2 - y^2 - 2y - 1 &= x^2 - (y^2 + 2y + 1) = x^2 - (y + 1)^2 \\ &= (x + y + 1)(x - y - 1) = (93 + 6 + 1)(93 - 6 - 1) = 100 \cdot 86 = 8600 \end{aligned}$$

57. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) $x^2 - 4x + 3$;

b) $x^2 + 5x + 4$;

c) $x^2 - x - 6$;

d) $x^4 + 4$ (Gợi ý câu d): thêm và bớt $4x^2$ vào đa thức đã cho).

Giải

Áp dụng phương pháp tách hạng tử thành nhiều hạng tử

$$\begin{aligned} \text{a) } x^2 - 4x + 3 &= x^2 - 3x - x + 3 = (x^2 - 3x) - (x - 3) \\ &= x(x - 3) - (x - 3) = (x - 3)(x - 1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } x^2 + 5x + 4 &= x^2 + x + 4x + 4 = (x^2 + x) + (4x + 4) \\ &= x(x + 1) + 4(x + 1) = (x + 1)(x + 4) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c) } x^2 - x - 6 &= x^2 - 4 - x - 2 = (x^2 - 4) - (x + 2) \\ &= (x + 2)(x - 2) - (x + 2) = (x + 2)(x - 2 - 1) = (x + 2)(x - 3) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{d) } x^4 + 4 &= x^4 + 4x^2 + 4 - 4x^2 = (x^4 + 4x^2 + 4) - 4x^2 = (x^2 + 2)^2 - (2x)^2 \\ &= (2x + 2)(x^2 + 2 - 2x) \end{aligned}$$

58. Chứng minh rằng $n^3 - n$ chia hết cho 6 với mọi số nguyên n .

Giải

Ta có: $n^3 - n = n(n^2 - 1) = n(n - 1)(n + 1)$ với $n \in \mathbb{Z}$.

Nhận xét: Với $n \in \mathbb{Z}$ thì $n - 1, n, n + 1$ là ba số nguyên liên tiếp nên tích chia hết cho 2 và tích cũng chia hết cho 3 mà $(2 \cdot 3) = 6$ nên tích $(n - 1)n(n + 1) \vdots 6$ (đpcm)

PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG VÀI PHƯƠNG PHÁP KHÁC

Àp dụng bốn phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử vừa học

(Giải nhân tử chung

Đúng hằng đẳng thức

Nhóm hạng tử

Phối hợp ba phương pháp trên

1- Chúng ta có vài phương pháp thường gặp khác (thường dành cho học sinh khá và giỏi) để phân tích đa thức thành nhân tử

1. Phương pháp Tách một hạng tử thành nhiều hạng tử

Ví dụ a) Phân tích đa thức thành nhân tử $x^2 + 5x + 6$

b) Phân tích đa thức thành nhân tử $x^2 - x - 6$

Giải

a) Khi ta không thể áp dụng các phương pháp thông thường ở trên thì ta nghĩ đến dùng phương pháp này

Ta tách số hạng $5x = 2x + 3x$. Khi đó

$$\begin{aligned}x^2 + 5x + 6 &= x^2 + 2x + 3x + 6 = (x^2 + 2x) + (3x + 6) \\&= x(x + 2) + 3(x + 2) = (x + 2)(x + 3).\end{aligned}$$

b) *Cách 1:* Ta tách hạng tử $-x = -3x + 2x$

$$\begin{aligned}\text{Khi đó: } x^2 - x - 6 &= x^2 - 3x + 2x - 6 = (x^2 - 3x) + (2x - 6) \\&= x(x - 3) + 2(x - 3) = (x - 3)(x + 2).\end{aligned}$$

Cách 2: Ta cũng có thể tách hạng tử $-6 = -2 - 4$

$$\begin{aligned}\text{Khi đó: } x^2 - x - 6 &= x^2 - x - 2 - 4 = (x^2 - 1) - (x + 4) \\&= (x + 2)(x - 2) - (x + 2) = (x + 2)(x - 2) - 1(x + 2) \\&= (x + 2)(x - 3).\end{aligned}$$

2. Phương pháp Thêm bớt cùng một hạng tử vào đa thức

Ví dụ: Phân tích đa thức thành nhân tử $x^4 + 4$

Giải

Thương thức: Ta không thể áp dụng các phương pháp đã học. Nếu ta viết $x^4 + 4 = x^4 + 4x^2 + 4 - 4x^2$, tức là "thêm" và "bớt" cùng hạng tử $4x^2$ vào đa thức đã cho thì có thể áp dụng các phương pháp đã học để phân tích đa thức đã cho thành nhân tử

$$\begin{aligned}\text{Thật vậy, } x^4 + 4 &= x^4 + 4x^2 + 4 - 4x^2 = (x^4 + 4x^2 + 4) - 4x^2 \\&= (x^2 + 2)^2 - (2x)^2 = (x^2 + 2 + 2xx^2 + 2 - 2x)\end{aligned}$$

• Bài tập

Phân tích đa thức thành nhân tử:

1. a) $x^2 - 7xy + 10y^2$;

b) $5x^2 + 6xy + y^2$;

c) $x^2 - 5x - 14$;

d) $x^2 + 2x - 15$.

2. a) $2x^2 + 10x + 8$;

b) $x^3 - 9x^2 + 14x$,

3. a) $x^4 + 64$.

b) $x^4 + 4y^4$.

• Bài tập nâng cao

1. Hãy phân tích đa thức $x^3 - x - 6$ thành nhân tử bằng nhiều cách khác nhau.

Giải

* Cách 1:

$$x^3 - x - 6 = x^3 - 4 - x - 2 = (x - 2)(x + 2) - (x + 2) = (x + 2)(x - 3)$$

* Cách 2:

$$x^3 - x - 6 = x^3 - 9 - x + 3 = (x - 3)(x + 3) - (x - 3) = (x - 3)(x + 2)$$

* Cách 3:

$$x^3 - x - 6 = x^3 + 2x - 3x - 6 = x(x + 2) - 3(x + 2) = (x + 2)(x - 3)$$

* Cách 4:

$$x^3 - x - 6 = x^3 - 3x + 2x - 6 = x(x - 3) + 2(x - 3) = (x - 3)(x + 2)$$

* Cách 5:

$$x^3 - x - 6 = x^3 - 2x \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{25}{4} = (x - \frac{1}{2})^2 - (\frac{5}{2})^2 = (x - 3)(x + 2)$$

* Cách 6:

$$x^3 - x - 6 = x^3 + (-3 - 2)x + (-3) \cdot 2 = (x - 3)(x + 2)$$

Tổng quát: $x^3 + (a + b)x + ab = (x + a)(x + b)$

* Cách 7: (Phương pháp hệ số bất định)

$$\text{Giả sử } x^3 - x - 6 = (x + a)(x + b) \Leftrightarrow x^3 - x - 6 = x^2 + (a + b)x + ab$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a + b = -1 \\ ab = -6 \end{cases} \text{ chọn } a = -3, b = 2$$

2. Phân tích thành nhân tử:

a) $16x^4 + 4$;

b) $x^5 + x + 1$;

c) $a(b^3 - c^3) + b(c^3 - a^3) + c(a^3 - b^3)$.

Giải

a) $16x^4 + 4 = (4x^2)^2 + 2^2 + 2 \cdot 4x^2 \cdot 2 = 16x^4$

$$= (4x^2 + 2)^2 - (4x^2)^2 = (4x^2 - 4x + 2)(4x^2 + 4x + 2)$$

b) $x^5 + x + 1 = x^5 - x^2 + x^2 + x + 1 = x^2(x^3 - 1) + (x^2 + x + 1)$

$$= x^2(x - 1) + (x^2 + x + 1) + (x^2 + x + 1)$$

$$= (x^2 + x + 1)(x^2 - x^2 + 1)$$

$$(1) \quad (x + 1)(2x^2 - 2x + 2 - x + 1 - 5) = 0$$

$$(2) \quad (x + 1)(2x^2 - 3x - 2) = 0 \Leftrightarrow (x + 1)(2x^2 - 4x) + 1(x - 2) = 0$$

$$(3) \quad (x + 1)(x - 2)(2x + 1) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x + 1 = 0 \\ x - 2 = 0 \\ 2x + 1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ x = 2 \\ x = -\frac{1}{2} \end{cases}$$

Vậy tập nghiệm của phương trình $S = \{-1; -\frac{1}{2}; 2\}$.

7. Chứng minh rằng với n lẻ thì: a) $n^2 + 4n + 3$ chia hết cho 8
b) $n^3 + 3n^2 - n - 3$ chia hết cho 48

Hướng dẫn

$$a) \quad n^2 + 4n + 3 = (n + 1)(n + 3)$$

$$\text{Với } n = 2k + 1 \quad (n + 1)(n + 3) = 4k(k + 1)k + 2$$

$$b) \quad n^3 + 3n^2 - n - 3 = (n - 1)(n + 1)(n + 3)$$

§10. CHIA ĐƠN THỨC CHO ĐƠN THỨC

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. Giả sử A và B là hai đơn thức, $B \neq 0$

Ta nói A chia hết cho B nếu tìm được một đơn thức Q sao cho $A = B \cdot Q$

Ký hiệu: $Q = A : B$ hoặc $Q = \frac{A}{B}$.

2. Quy tắc:

- a) Trường hợp hai đơn thức là hai lũy thừa của cùng một biến.

$$x^m : x^n = x^{m-n}$$

- b) Trường hợp tổng quát: Muốn chia đơn thức A cho đơn thức B (Trường hợp A chia hết cho B) ta làm như sau:

Chia hệ số của đơn thức A cho hệ số của đơn thức B.

Chia từng lũy thừa của biến trong A cho lũy thừa của cùng biến đó trong B.

Nhân các kết quả tìm được với nhau.

Vì dụ: Thực hiện phép tính:

$$a) \quad 15x^3y^2z : (-3x^2y^2) = \frac{15}{-3} \cdot \frac{x^3}{x^2} \cdot \frac{y^2}{y^2} \cdot \frac{z}{1} = -5xz$$

$$b) \quad 4x^4y^3z^2 : 5x^4y^2 = \frac{4}{5} \cdot \frac{x^4}{x^4} \cdot \frac{y^3}{y^2} \cdot \frac{z^2}{1} = \frac{4}{5}yz^2.$$

II. Bài tập

A. Bài tập mẫu

1. Tính $a) 15x^2 - 3x$
 $b) 15x^2 - 3xy$

$\frac{15(20x^2 - 12x)}{x(15x^2 - 3xy)}$

Giải

a) $15x^2 - 3x = \frac{15 \cdot x^2}{3 \cdot x} = \frac{5x^2}{1} = 5x^2$

b) $15x^2 - 3xy = \frac{3(5x^2 - xy)}{1} = \frac{3}{1}(x^2 - y)$

c) $15x^2 - 3xy = \frac{3(5x^2 - xy)}{1} = 3x(1 - y)$

d) $15x^2 - 3xy = \frac{3(5x^2 - xy)}{1} = 3x^2$

2. Cho $P = 12x^3y^2 + 9xy^2$. Tính giá trị của biểu thức P với $x = 3$

Giải

Es thay giá trị P trên vào thay giá trị của x và y vào biểu thức để tìm giá trị của biểu thức P

Es có

$$P = 12x^3y^2 + 9xy^2 = \frac{12 \cdot x^3 \cdot y^2}{1} = \frac{1}{3} \cdot x^3 \cdot \frac{1}{3} \cdot 36 = \frac{4}{3} \cdot 27 = 36$$

Vậy $P = 36$

B. Bài tập cần làm

59. Làm tính chia

a) $5^3 : 5^2$

b) $\left(\frac{3^{15}}{4}\right) : \left(\frac{3}{4}\right)^2$

c) $(12)^3 : 8^3$

Giải

a) $5^3 : 5^2 = 5^3 - 5^2 = 5$

b) $\frac{3^{15}}{4} : \left(\frac{3}{4}\right)^2 = \left(\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{9}{16}$

c) $12^3 : 8^3 = \left(\frac{12}{8}\right)^3 = \left(\frac{3}{2}\right)^3 = \frac{27}{8}$

60. Làm tính chia

a) $x^{10} : x^5$

b) $(x^2 + x)^5$

c) $(x^2 + y^2) : (x^2 + y^2)$

Giải

a) $x^{10} : x^5 = x^{10 - 5} = x^5$

$$b) (-x)^3 : (-x)^3 = (-x)^{3-3} = (-x)^0 = x^0 = x^2.$$

$$c) (-y)^3 : (-y)^3 = (-y)^{3-3} = (-y)^0 = y.$$

61. Làm tính chia:

$$a) 5x^2y^4 : 10x^2y;$$

$$b) \frac{3}{4}x^3y^3 : \left(-\frac{1}{2}x^2y^2\right);$$

$$c) (-xy)^{12} : (-xy)$$

Giải

$$a) 5x^2y^4 : 10x^2y = \frac{5}{10} \cdot \frac{x^2}{x^2} \cdot \frac{y^4}{y} = \frac{1}{2}y^3$$

$$b) \frac{3}{4}x^3y^3 : \left(-\frac{1}{2}x^2y^2\right) = \frac{3}{4} \cdot \frac{x^3}{x^2} \cdot \frac{y^3}{y^2} = -\frac{3}{2}xy$$

$$c) (-xy)^{12} : (-xy)^1 = (-xy)^{12-1} = (-xy)^{11} = -x^{11}y^{11}$$

62. Tính giá trị của biểu thức sau: $15x^4y^3z^2 - 5xy^2z^2$ tại $x = 2, y = -10$ và $z = 1,2$

Giải

$$\text{Đặt } P = 15x^4y^3z^2 - 5xy^2z^2 = \frac{15}{5} \cdot \frac{x^4}{x} \cdot \frac{y^4}{y^2} \cdot \frac{z^2}{z^2} = 3x^3y = 3 \cdot 2^3 \cdot (-10) = 3 \cdot 8 \cdot (-10) = -240$$

$$\text{Vậy } P = -240$$

§11. CHIA ĐA THỨC CHO ĐƠN THỨC

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. Quy tắc: Đa thức A và đơn thức B ($B \neq 0$)

Muốn chia đa thức A cho đơn thức B, ta chia mỗi hạng tử của A cho B rồi cộng các kết quả lại với nhau.

$$\begin{aligned} \text{Ví dụ: } (15x^2y^3 + 12x^3y^2 - 10xy^3) : 3xy^2 &= \frac{15x^2y^3}{3xy^2} + \frac{12x^3y^2}{3xy^2} - \frac{10xy^3}{3xy^2} \\ &= 5xy + 4x^2 - \frac{10}{3}y. \end{aligned}$$

2. Chú ý: Trong trường hợp đa thức A có thể phân tích thành nhân tử, thường ta phân tích trước để rút gọn cho nhanh.

$$\text{Ví dụ: } (4x^4 - 8x^2y^2) : (-4x^2) = \frac{4x^2(x^2 - 2y^2)}{-4x^2} = -(x^2 - 2y^2) = 2y^2 - x^2$$

Trong thực hành có thể bỏ bớt một số phép tính trung gian, chẳng hạn

$$(5x^3y^3 - 3x^4y^4 + 2x^3y^3) : (-3x^3y^3) = -\frac{5}{3}xy^3 + x^4y^4 - \frac{2}{3}x^3y^3$$

ILLUSTRATION BY

A. Bài tập mẫu

- † Last birth day (age) = 2000 (2001) = 25.

100

[illegible]

- [illegible]

1000

Khung Sét Ta thép cứng độ dày ≥ 10 mm thì bố "sét" làm nhô ra chung
to đặt nhô ra chung đi để đỡ các thanh nhôm như vậy

$$700x^2 - 6x^2 + 1000 = 694x^2 + 1000 \quad 8xy = 8xy + 0 \quad 5xy = 5xy - xy + 4x$$

B. Bài tập căn bản

83. Khẳng định trái chĩa này sẽ sớm đi đợc cả công hội cho đơn thực B không

A 1500, 1700, 1900

13-614



Nhôm set Ta biết rằng đa thức A chia hết cho đơn thức B khi và chỉ khi mỗi hạng tử của A (phân chia) đều chia hết cho đơn thức B .

Vì vậy. Đa thức A có thể đặt v. kim nhieu tự chúng, ta có thể rút gọn cho đa thức $B = 6x^2$

Vậy đã thế A chưa hết cho đến thế B

- 6.4. Làm tính chẵn

$$f(x) = 2x^3 + (x^2 - 4x^2) - 2x$$

b) $(x^3 - 2x^2y + 3xy^2) - (-\frac{1}{5}x)$

c) $(3x^3y^2 + 6x^2y^3 - 12xy^4) - 3xy^2$

100

$$n^2 + 2x^2 + 3x^4 - 4x^3 - 2x^2 = \frac{x^2 + 2x^3 + 3 - 4x}{2x^2} = \frac{2x^3 + 3 - 4x}{2} = x^3 - 2x + \frac{3}{2}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{b} &= \begin{pmatrix} x^4 \\ 2xy^3 + 3xy^2 + 3 \\ 2x^2y + 2xy^2 + 3y^3 + 3 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2x^4 \\ 4xy^3 + 6xy^2 + 6 \\ 4x^2y + 4xy^2 + 6y^3 + 6 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2x^4 \\ 2xy(2y^2 + 3y + 3) + 6 \\ 2xy(2x + 3y + 3) + 6y^3 + 6 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2x^4 \\ 2xy(2y^2 + 3y + 3) + 6 \\ 2xy(2x + 3y + 3) + 6y^3 + 6 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$r = (3x^2y^2 + 6xy^3 - 12xy) - 3xy = \frac{3xy(3y + 2y^2 - 4)}{3xy} = y + 2y^2 - 4$$

65. Làm tính chia: $[3(x-y)^4 + 2(x-y)^3 - 5(x-y)^2] : (y-x)^2$.
(Gợi ý. Có thể đặt $x-y = z$ rồi áp dụng quy tắc chia đa thức cho đơn thức)

Giải

Đặt $(x-y)^2 = t$ ($y-x)^2 = x^2$), ta có:

$$\begin{aligned} [3(x-y)^4 + 2(x-y)^3 - 5(x-y)^2] : (y-x)^2 &= \frac{(x-y)^2[3(x-y)^2 + 2(x-y) - 5]}{(x-y)^2} \\ &= 3(x-y)^2 + 2(x-y) - 5 = 3x^2 - 2xy + y^2 + 2x - 2y - 5 \\ &= 3x^2 - 6xy + 3y^2 + 2x - 2y - 5 \end{aligned}$$

66. Ai đúng, ai sai?

Khi giải bài tập: "Xét xem đa thức $A = 5x^4 - 4x^3 + 6x^2y$ có chia hết cho đơn thức $B = 2x^2$ hay không?"

Hà trả lời: "A không chia hết cho B vì 5 không chia hết cho 2".

Quang trả lời: "A chia hết cho B vì mọi hạng tử của A đều chia hết cho B".

Cho biết ý kiến của em về lời giải của hai bạn?

Giải

Bạn Quang trả lời đúng vì đa thức A chia hết cho đơn thức B khi mỗi hạng tử (phần chữ) của A đều chia hết cho B

$$\text{Ta có: } (5x^4 - 4x^3 + 6x^2y) : 2x^2 = x^2(5x^2 - 4x + 6y) : 2x^2 = \frac{5}{2}x^2 - 2x + 3y$$

Vậy A chia hết cho B.

§12. CHIA ĐA THỨC MỘT BIẾN ĐÃ SẮP XẾP

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

- Phương pháp: Ta trình bày phép chia này tương tự cách chia số tự nhiên. Với hai đa thức tùy ý A và B của cùng một biến, $B \neq 0$, tồn tại duy nhất hai đa thức Q và R sao cho:

$$A = B \cdot Q + R \quad (\text{trong đó } R = 0 \text{ hoặc bậc của } R \text{ bé hơn bậc của } B).$$

- Nếu $R = 0$: ta nói rằng đó là phép chia hết.
- Nếu $R \neq 0$: ta nói rằng đó là phép chia có dư.

- Chú ý:

- Định lý Bơ-du (Bézout): Cho đa thức bậc n của ẩn x:

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 \quad (a_n \neq 0).$$

Số dư trong phép chia đa thức $f(x)$ cho nhị thức bậc nhất $(x-a)$ bằng giá trị của đa thức $f(x)$ tại $x=a$.

- Hệ quả: $f(x)$ chia hết cho $(x-a)$ $\Leftrightarrow f(a) = 0$

Đặt L là tập các đa thức chia hết cho a và $a \mid p$ và $a \mid q$ (với a là đa thức).

Ta chứng minh điều ngược lại.

Trong đa thức $p = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_{n-1}x + a_n$, $a_0 \neq 0$. Vì $a \mid p$ và $a \mid q = a_1x^n + a_2x^{n-1} + \dots + a_{n-1}x + a_n$ là các số nguyên không âm, nếu a không chia hết cho a_0 thì a là hằng số.

Đúng đó p là một biểu thức đa thức do $p = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_{n-1}x + a_n$ là một đa thức với các

hệ số của hằng từ các a_0, a_1, \dots, a_n .

II. BÀI TẬP

A. Bài tập mẫu

1. Sắp xếp đa thức rồi làm tính chia: $(15 + 5x - 3x^3 - 9x) : (5 - 3x)$

Giải

Ta sắp xếp các đa thức theo lũy thừa giảm dần của x , rồi thực hiện phép chia như sau:

$$\begin{array}{r} -3x^3 + 5x + 15 : -3x + 5 = -x^2 + 2x + 3 \\ \underline{-3x^3 + 5x} \\ 9x + 15 \\ \underline{-9x + 15} \\ 0 \end{array}$$

$$\text{Vậy } (15 + 5x - 3x^3 - 9x) : (5 - 3x) = -x^2 + 2x + 3$$

2. Cho A và B là hai đa thức. Hãy chia A cho B rồi viết A dưới dạng:

$$A = B \cdot Q + R$$

$$A = 2x^3 - x^2 - x + 1; \quad B = x^2 - 2x$$

Giải

$$\begin{array}{r} 2x^3 - x^2 - x + 1 : x^2 - 2x = 2x + 3 \\ \underline{2x^3 - 4x^2} \\ 3x^2 - x + 1 \\ \underline{3x^2 - 6x} \\ 5x + 1 \end{array}$$

$$\text{Vậy } (2x^3 - x^2 - x + 1) : (x^2 - 2x) = 2x + 3 + \frac{5x + 1}{x^2 - 2x}$$

3. Dùng hằng đẳng thức để làm tính chia: $(x^3 + 2x^2y + y^3) : (x^2 + y^2)$

Giải

$$\text{Ta có } (x^3 + 2x^2y + y^3) : (x^2 + y^2) = (x^2 + y^2) \cdot x + (x^2 + y^2) = x^3 + y^3$$

B. Bài tập cơ bản

67. Sắp xếp các đa thức theo lũy thừa giảm dần của biến rồi làm phép chia

a) $(x^3 - 7x + 3 - x^2) : (x - 3)$, b) $(2x^3 - 3x^2 - 3x^2 - 2 + 6x) : (x^2 - 2)$

Giải

$$\begin{array}{r} \text{a) } \begin{array}{r} x' \\ x' \end{array} \begin{array}{r} x' \\ 3x' \end{array} \begin{array}{r} 7x \\ 2x' \end{array} \begin{array}{r} +3 \\ +3 \end{array} \left| \begin{array}{r} x \\ x' \end{array} \begin{array}{r} 3 \\ +2x-1 \end{array} \right. \\ \hline \begin{array}{r} 2x' \\ 2x' \end{array} \begin{array}{r} 7x \\ 6x \end{array} \begin{array}{r} +3 \\ +3 \end{array} \\ \hline \begin{array}{r} x \\ x \end{array} \begin{array}{r} +3 \\ +3 \end{array} \\ \hline 0 \end{array}$$

$$\text{Vậy: } x' - 7x + 3 - x' = (x - 3)(x' + 2x - 1)$$

$$\begin{array}{r} \text{b) } \begin{array}{r} 2x' \\ 2x' \end{array} \begin{array}{r} 3x' \\ 3x' \end{array} \begin{array}{r} -3x' \\ -3x' \end{array} \begin{array}{r} +6x \\ +6x \end{array} \begin{array}{r} -2 \\ -2 \end{array} \left| \begin{array}{r} x' \\ 2x' \end{array} \begin{array}{r} -2 \\ 3x+1 \end{array} \right. \\ \hline \begin{array}{r} -3x' \\ -3x' \end{array} \begin{array}{r} +x' \\ +x' \end{array} \begin{array}{r} +6x \\ +6x \end{array} \begin{array}{r} -2 \\ -2 \end{array} \\ \hline \begin{array}{r} 3x' \\ 3x' \end{array} \begin{array}{r} +6x \\ +6x \end{array} \\ \hline \begin{array}{r} x' \\ x' \end{array} \begin{array}{r} 2 \\ 2 \end{array} \\ \hline 0 \end{array}$$

$$\text{Vậy: } 2x' - 3x' - 3x' - 2 + 6x = (x' - 2)(2x' - 3x + 1)$$

68. Áp dụng hằng đẳng thức đáng nhớ để thực hiện phép chia:

$$\text{a) } (x^2 + 2xy + y^2) : (x + y);$$

$$\text{b) } (125x^3 + 1) : (5x + 1);$$

$$\text{c) } (x^2 - 2xy + y^2) : (y - x).$$

Giải

Dùng hằng đẳng thức để tính nhanh.

$$\text{a) } (x^2 + 2xy + y^2) : (x + y) = (x + y)^2 : (x + y) = (x + y)$$

$$\text{b) } (125x^3 + 1) : (5x + 1) = [(5x)^3 + 1] : (5x + 1)$$

$$= (5x + 1)(5x^2 - 5x + 1) : (5x + 1) = 5x^2 - 5x + 1$$

$$\text{c) } (x^2 - 2xy + y^2) : (y - x) = (x - y)^2 : (y - x) = y - x$$

69. Cho hai đa thức: $A = 3x^4 + x^3 + 6x - 5$; $B = x^2 + 1$.

Tìm dư R trong phép chia A cho B rồi viết A dưới dạng: $A = B \cdot Q + R$

Giải

Chia A cho B, ta có:

$$\begin{array}{r} 3x^4 + x^3 \qquad \qquad \qquad + 6x - 5 \left| \begin{array}{r} x^2 + 1 \\ 3x^2 + x - 3 \end{array} \right. \\ \hline 3x^4 \qquad \qquad \qquad + 3x^3 \qquad \qquad \qquad \\ \hline \begin{array}{r} x^3 \\ x^3 \end{array} \begin{array}{r} -3x^2 \\ -3x^2 \end{array} \begin{array}{r} +6x \\ +6x \end{array} \begin{array}{r} -5 \\ -5 \end{array} \\ \hline \begin{array}{r} x^3 \\ x^3 \end{array} \begin{array}{r} +x \\ +x \end{array} \\ \hline \begin{array}{r} -3x' \\ -3x' \end{array} \begin{array}{r} +6x \\ +6x \end{array} \begin{array}{r} -5 \\ -5 \end{array} \\ \hline \begin{array}{r} -3x' \\ -3x' \end{array} \begin{array}{r} 3 \end{array} \\ \hline \begin{array}{r} 5x \\ 5x \end{array} \begin{array}{r} 2 \end{array} \end{array}$$

$$\text{Vậy } 3x^4 + x^3 + 6x - 5 = (x^2 + 1)(3x^2 + x - 3) + 5x - 2$$

Luyện tập

70. Áp dụng chia:

$$a) (25x^2 - 5x^3) : (5x) = 5x$$

$$b) (3x^2 - 6x^2y + 3x^2y^2) : 3x^2 = 1 - 2y + y^2$$

Giải

$$a) (25x^2 - 5x^3) : (5x) = \frac{25x^2}{5x} - \frac{5x^3}{5x} = 5x - x^2 = -x^2 + 5x$$

$$b) (3x^2 - 6x^2y + 3x^2y^2) : 3x^2 = \frac{3x^2}{3x^2} - \frac{6x^2y}{3x^2} + \frac{3x^2y^2}{3x^2} = 1 - 2y + y^2$$

71. Không thực hiện phép chia, hãy xét xem đa thức A có chia hết cho đa thức B không

a) $A = 15x^3 - 8x^2 + x^2$, $B = \frac{1}{2}x$

b) $A = x^2 - 2x + 1$, $B = 1 - x$

Giải

Đa thức A chia hết cho đơn thức B khi và chỉ khi mỗi hạng tử A (phân chia đều) chia hết cho đơn thức B.

a) Ta có mỗi hạng tử của đa thức A đều chia hết cho đơn thức B tức của đơn thức $B = \frac{1}{2}x$ nên hơn hoặc bằng bậc mỗi hạng tử của đa thức

$$A = 15x^3 - 8x^2 + x^2$$

Vậy đa thức A chia hết cho đơn thức B

b) Ta có $A = x^2 - 2x + 1 = (x - 1)^2 = (1 - x)(1 - x)$, mà $(1 - x) = (1 - x)$

Vậy đa thức A chia hết cho đơn thức B

72. Làm tính chia: $(2x^4 + x^3 - 3x^2 + 5x - 2) : (x^2 - x + 1)$

Giải

Thực hiện phép chia:

$$\begin{array}{r} 2x^2 + x^2 + 3x^2 + 5x - 2 \\ 2x^4 + 2x^3 + 2x^2 \\ \hline 0x^4 + 0x^3 + 0x^2 + 5x - 2 \\ 0x^4 + 0x^3 + 0x^2 + 3x \\ \hline 2x^4 + 2x^3 + 2x^2 \\ \hline 0x^4 + 0x^3 + 0x^2 + 2x - 2 \\ 0x^4 + 0x^3 + 0x^2 + 2x - 2 \\ \hline 0 \end{array}$$

$$\text{Vậy } (2x^4 + x^3 - 3x^2 + 5x - 2) : (x^2 - x + 1) = 2x^2 + x + 3$$

73. Tính nhanh:

a) $(4x^2 - 9y^2) : (2x - 3y)$,

b) $(27x^3 - 1) : (3x - 1)$,

c) $(2x^3 + 1) : (4x^2 - 2x + 1)$,

d) $(x^2 - 3x + xy - 3y) : (x + y)$

Giải

$$\begin{aligned} \text{a) } (4x^2 - 9y^2) : (2x - 3y) &= [(2x)^2 - (3y)^2] : (2x - 3y) \\ &= (2x + 3y)(2x - 3y) : (2x - 3y) = (2x + 3y) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } (27x^3 - 1) : (3x - 1) &= [(3x)^3 - 1^3] : (3x - 1) \\ &= (3x - 1)(3x^2 + 3x + 1) : (3x - 1) \\ &= (3x - 1)(3x^2 + 3x + 1) : (3x - 1) = 3x^2 + 3x + 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c) } (8x^3 + 1) : (4x^2 - 2x + 1) &= [(2x)^3 + 1^3] : (4x^2 - 2x + 1) \\ &= (2x + 1)(2x^2 - 2x + 1) : (4x^2 - 2x + 1) \\ &= (2x + 1)(4x^2 - 2x + 1) : (4x^2 - 2x + 1) = 2x + 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{d) } (x^3 - 3x + xy - 3y) : (x + y) &= [(x^3 - 3x) + (xy - 3y)] : (x + y) \\ &= [x(x - 3) + y(x - 3)] : (x + y) \\ &= (x - 3)(x + y) : (x + y) = x - 3 \end{aligned}$$

74. Tìm số a để đa thức $2x^3 - 3x^2 + x + a$ chia hết cho đa thức $x + 2$

Giải

Ta có $A = B \cdot Q + R$

Để $A = B \cdot Q$ thì $R = 0$ (hoặc áp dụng định lí Bézout để tìm a).

Ta thực hiện phép chia:

$$\begin{array}{r|l} 2x^3 - 3x^2 + x + a & x + 2 \\ \underline{2x^3 + 4x^2} & \\ -7x^2 + x + a & \\ \underline{-7x^2 - 14x} & \\ 15x + a & \\ \underline{15x + 30} & \\ a - 30 & \end{array}$$

Để đa thức $2x^3 - 3x^2 + x + a$ chia hết cho đa thức $x + 2$ thì dư $a - 30 = 0$ hay $a = 30$.

Vậy khi $a = 30$ thì đa thức $2x^3 - 3x^2 + x + a$ chia hết cho đa thức $x + 2$.

ÔN TẬP CHƯƠNG I

A. Trắc nghiệm

- $(a + b)(a^2 - b^2) = (a + b)(a^{2-1} + a^{1-1}b + \dots + ab^{2-1} + b^{2-1})$ với mọi n .
- $(a + b)^n = (a + b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + \dots + ab^{n-2} + b^{n-1})$ với n lẻ.
- $(a + b)^n = a^n + na^{n-1}b + \frac{n(n-1)}{2}a^{n-2}b^2 + \dots + nab^{n-1} + b^n$

Áp dụng trong số học: $a, b \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{Z} +$ ta có:

$$a^n - b^n = (a - b) \text{ với mọi } n (a \neq b)$$

$$a^n + b^n = (a + b) \text{ với mọi } n \text{ lẻ.}$$

$$a^n - b^n = (a - b) \text{ với mọi } n \text{ chẵn}$$

B. Bài tập

75. Tính nhanh: a) $5x^2(3x^2 - 7x + 2)$, b) $\frac{2}{3}xy(2x^2y - 3xy + y^2)$

76. Tính nhanh: a) $(2x - 3x)(5x^2 - 2x + 1)$, b) $(x - 2y)(3xy + 5y^2 + x)$

Giải

75. a) $5x^2(3x^2 - 7x + 2) = 15x^4 - 35x^3 + 10x^2$

$$b) \frac{2}{3}xy(2x^2y - 3xy + y^2) = \frac{4}{3}x^3y^2 - 2x^2y^2 + \frac{2}{3}xy^3$$

76. a) $(2x^2 - 3x)(5x^2 - 2x + 1) = 2x^2(5x^2 - 2x + 1) - 3x(5x^2 - 2x + 1)$
 $= 10x^4 - 4x^3 + 2x^2 - 15x^3 + 6x^2 - 3x$
 $= 10x^4 - 19x^3 + 8x^2 - 3x$

$$b) (x - 2y)(3xy + 5y^2 + x) = x(3xy + 5y^2 + x) - 2y(3xy + 5y^2 + x)$$

 $= 3x^2y + 5xy^2 + x^2 - 6xy^2 - 10y^3 - 2xy$
 $= 3x^2y + x^2 - 2xy - xy^2 - 10y^3$

77. Tính nhanh giá trị của biểu thức:

a) $M = x^2 + 4y^2 - 4xy$ tại $x = 18, y = 4$

b) $N = 8x^3 - 12x^2y + 6xy^2 - y^3$ tại $x = 6, y = 8$

Giải

a) Với $x = 18, y = 4$ ta có: $M = x^2 + 4y^2 - 4xy = x^2 - 2(2y)(x - 2y)$
 $= (x - 2y)^2 = (18 - 2 \cdot 4)^2 = 100$

b) Với $x = 6; y = 8$ ta có: $N = 8x^3 - 12x^2y + 6xy^2 - y^3$
 $= (2x)^3 - 3(2x)^2y + 3(2x)(y^2) - (y)^3$
 $= (2x - y)^3 = (2 \cdot 6 - 8)^3 = 8000$

78. Rút gọn các biểu thức sau:

a) $x + 2)(x - 2) - (x - 3)(x + 1)$

b) $2x + 1)^2 + (3x - 1)^2 + 2(2x + 1)(3x - 1)$.

Giải

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad (x + 2)(x - 2) \cdot (x - 3)(x + 1) &= (x^2 - 2^2) \cdot (x^2 + x - 3x - 3) \\ &= x^2 - 4 \cdot x^2 + 2x + 3 = 2x - 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b)} \quad (2x + 1)^2 + (3x - 1)^2 + 2(2x + 1)(3x - 1) \\ = 4x^2 + 4x + 1 + 9x^2 - 6x + 1 + 12x^2 - 4x + 6x - 2 = 25x^2 \end{aligned}$$

79. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

$$\text{a)} \quad x^3 - 4 + (x - 2)^2, \quad \text{b)} \quad x^3 - 2x^2 + x - xy^2, \quad \text{c)} \quad x^3 - 4x^2 - 12x + 2^3.$$

Giải

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad x^3 - 4 + (x - 2)^2 &= (x^3 - 2^3) + (x - 2)^2 \\ &= (x + 2)(x - 2) + (x - 2)(x - 2) \\ &= (x - 2)(x + 2) + (x - 2) = 2x(x - 2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b)} \quad x^3 - 2x^2 + x - xy^2 &= x(x^2 - 2x + 1 - y^2) = x(x^2 - 2x + 1) - y^2 \\ &= x(x - 1)^2 - y^2 = x(x - 1 + y)(x - 1 - y) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c)} \quad x^3 - 4x^2 - 12x + 2^3 &= (x^3 + 2^3) - 4x(x + 3) \\ &= (x + 2)(x^2 - 2x + 4) - 4x(x + 3) = (x + 2)(x^2 - 3x + 9) - 4x(x + 3) \\ &= (x + 3)(x^2 - 3x + 9 - 4x) = (x + 3)(x^2 - 7x + 9). \end{aligned}$$

80. Làm nháp:

$$\text{a)} \quad (6x^3 - 7x^2 - x + 2) : (2x + 1).$$

$$\text{b)} \quad (x^4 - x^3 + x^2 + 3x) : (x^2 - 2x + 3);$$

$$\text{c)} \quad (x^2 - y^2 + 6x + 9) : (x + y + 3).$$

Giải

$$\begin{array}{r|l} \begin{array}{r} \text{a)} \quad \begin{array}{r} 6x^3 \qquad 7x^2 \qquad x + 2 \\ \underline{6x^3 \qquad + 3x^2} \\ 10x^2 \qquad x + 2 \\ \underline{10x^2 \qquad 5x} \\ 4x + 2 \\ \underline{4x + 2} \\ 0 \end{array} \end{array} & \begin{array}{l} 2x + 1 \\ 3x^2 - 5x + 2 \end{array} \end{array}$$

$$\text{Vậy: } (6x^3 - 7x^2 - x + 2) : (2x + 1) = 3x^2 - 5x + 2$$

$$\begin{array}{r|l} \text{b)} \quad \begin{array}{r} x^4 \qquad x^3 \qquad + x^2 + 3x \\ \underline{x^4 \qquad - 2x^3 \qquad + 3x^2} \\ x^3 \qquad 2x^2 + 3x \\ \underline{x^3 \qquad 2x^2 + 3x} \\ 0 \end{array} & \begin{array}{l} x^2 \qquad 2x + 3 \\ x^2 + x \end{array} \end{array}$$

$$\text{Vậy: } (x^4 - x^3 + x^2 + 3x) : (x^2 - 2x + 3) = x^2 + x$$

$$\begin{aligned} \text{c)} \quad (x^2 - y^2 + 6x + 9) : (x + y + 3) &= \frac{(x^2 + 6x + 9) - y^2}{x + y + 3} = \frac{(x + 3)^2 - y^2}{x + y + 3} \\ &= \frac{(x + 3 + y)(x + 3 - y)}{x + y + 3} = x + 3 - y \end{aligned}$$

$$\text{Vậy: } (x^2 - y^2 + 6x + 9) : (x + y + 3) = x + 3 - y.$$

81. (a) $x \in \mathbb{R}$ bất kỳ

$$(1) \int_0^x \cos t \, dt = \sin x$$

$$\int_0^x \cos t \, dt = \int_0^x (2\cos t + 2) \, dt$$

$$(2) \int_0^x (2\cos t + 2) \, dt = \sin x$$

Giải

$$\int_0^x (2\cos t + 2) \, dt = \sin x \Leftrightarrow \int_0^x \cos t \, dt = 0$$

$$(1) \int_0^x \cos t \, dt = 1 - \cos x \Leftrightarrow \frac{2}{3} x + x + 2 \sin x = 2 \cos x$$

$$\begin{aligned} \frac{2}{3} x + x + 2 \sin x &= 2 \cos x \\ \frac{5}{3} x + 2 \sin x &= 2 \cos x \Leftrightarrow x = 0 \text{ hoặc } x = 2 \text{ hoặc } x = -2 \\ x = 2 &\Rightarrow \frac{10}{3} + 4 \sin 2 = 2 \cos 2 \\ x = -2 &\Rightarrow \frac{-10}{3} - 4 \sin 2 = 2 \cos 2 \end{aligned}$$

$$(2) x = 2(2) \Rightarrow \sin 2(2) + 2(2) = \sin x + 2(2) \Leftrightarrow \sin x = 0 \Leftrightarrow x = 2$$

$$\sin x + 2(2) = \sin x + 2(2) \Leftrightarrow \sin x = 0$$

$$\Rightarrow 2k\pi \text{ hoặc } (2k+1)\pi \text{ với } k \in \mathbb{Z} \text{ thì } x = 2 \text{ hoặc } x = -2$$

$$\text{Vậy } x \in \mathbb{Z}(2) \text{ thì } \sin x = 0 \text{ và } x \in 2\mathbb{Z} \text{ thì } \sin x = 0$$

$$\begin{aligned} (1) \cos x + \sin x &= 0 \Leftrightarrow \cos x = -\sin x \\ \Leftrightarrow \cos x &= \sin(x + \frac{\pi}{2}) \\ \Leftrightarrow \cos x &= \cos(x - \frac{\pi}{2}) \end{aligned}$$

82. Chứng minh: $\sin x' = 2xy + y^2 + 1 \neq 0$ với mọi x và y
vì $x' = x^2 + 1 > 0$ với mọi số thực x .

Giải

Hypothesis: Ta có $x' = x^2 + 1$ với mọi x

a) Chứng minh $x' = 2xy + y^2 + 1 > 0$ với mọi x, y

$$\text{Thật vậy } x' = 2xy + y^2 + 1 \geq (x' - 2xy + y^2) + 1$$

$$= (x' - x^2 + 1) + 1 > 0 \text{ với mọi } x, y$$

$$\text{Vậy } x' = 2xy + y^2 + 1 > 0 \text{ với mọi số thực } x, y \text{ (đpcm)}$$

b) Chứng minh $x' = x^2 + 1 > 0$ với mọi x

$$\begin{aligned} \text{Thật vậy } x' = x^2 + 1 &= (x' - x + 1) + (x - 2x + \frac{1}{2}) + (\frac{1}{2}x^2 + \frac{3}{2}) \\ &= (x' - \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}) + (x - \frac{1}{2}x^2 - \frac{3}{4}) + \frac{3}{4} < 0 \end{aligned}$$

$$\text{Vậy } x' = x^2 + 1 > 0 \text{ với mọi } x \text{ (đpcm)}$$

83. Ta có: số $2n - n + 2$ chia hết cho $2n + 1$

Giải

Trước hết ta thực hiện phép chia $2n^2 - n + 2$ cho $2n + 1$, ta viết được

$$\frac{2n^2 - n + 2}{2n + 1} = n - 1 + \frac{3}{2n + 1}$$

Để $(2n^2 - n + 2) : (2n + 1)$ với $n \in \mathbb{Z}$ thì $2n + 1$ phải là ước của 3 nghĩa là $2n + 1$ phải bằng $\pm 1; \pm 3$.

Ta có: $2n + 1 = 1 \quad \Rightarrow n = 0$

$2n + 1 = -1 \quad \Rightarrow n = -1$

$2n + 1 = 3 \quad \Rightarrow n = 1$

$2n + 1 = -3 \quad \Rightarrow n = -2$

Vậy ta tìm được $n = -2; -1; 0; 1$

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG I

- Chọn câu trả lời đúng. Rút gọn $2x(5x^2 - 4x - 1)$, ta được biểu thức
(A) $10x^2 - 8x^2 + 2x$ (B) $10x^3 - 8x^2 - 2x$
(C) $10x^3 + 8x^2 + 2x$ (D) $10x^3 - 8x^2 + 2x$
- Chọn câu trả lời đúng. Rút gọn biểu thức: $x^n(x^{m+1} + y^n) - y^n(x^m + y^{m+1})$ được kết quả là:
(A) $x^{m+1} - y^n$ (B) $x^{2n} - y^{m+1}$ (C) $x^{m+n} - y^{m+n}$ (D) $x^{m+1} - y$
- Chọn câu trả lời đúng. Tính $\left(x + \frac{1}{3}\right)\left(x - \frac{1}{3}\right) (9 - 18x)$ được kết quả là:
(A) $18x^3 + 9x^2 - 2x - 1$ (B) $-18x^3 + 9x^2 + 2x - 1$
(C) $18x^3 - 9x^2 - 1$ (D) $-18x^3 + 9x^2 - 2x$
- Chọn câu trả lời đúng. Tính $(2x + y)^2 + (2x - y)^2$ được kết quả là:
(A) $4x^2 + 2y^2$ (B) $8x^2 - 2y^2$
(C) $8x^2 + 8xy + 2y^2$ (D) $8x^2 + 2y^2$
- Chọn câu trả lời đúng. Giá trị của biểu thức $A = x^3 - 9x^2 + 27x - 1$ tại $x = 4$ là:
(A) 11 (B) -17 (C) 10 (D) 57
- Chọn câu trả lời đúng. ta $(b^2)^3 + (a + b)^3 - a(b^2 + 2a^2) = ?$
(A) $2a^3 + 2b^3 + 3a^2b$ (B) 0
(C) $a^3 + b^3 + 6a^2b$ (D) $2a^3 + 2b^3$
- Chọn câu trả lời đúng.
Cho biểu thức: $A = (x - y + x^2) + (x - y)^2 + 2(x - y + xy - x)$
Giá trị của A tại $x = 10$ là:
(A) 100 (B) 20 (C) 10 (D) 20

9. *Viết biểu thức đại số* Cho $x = 2$ và $D = (5x - 1)^2 - 10$
 $A = 11$; (B) -1 ; (C) $D = 0$; (D) $D = 12$; (E) $D = 18$
9. *Viết biểu thức đại số* Kết quả phân tích $3x^2 + 6xy + 2y^2 + z$ thành nhân tử
 $A) (x + z)(2y + 1)$; (B) $(3x + y)(2y + 1)$;
 $C) (2x + 1)(2y + 3)$; (D) $(3x + y)(2y + 1)$;
10. *Viết biểu thức đại số* Thu gọn $(a + b - c)^2$
 $A) (a + b - c)$; (B) $(a + b - c)$;
 $C) (a + b - c)^2$; (D) $(a + b - c)^3$
11. *Viết biểu thức đại số* $(8x^2y^3 - 12x^4y + 3xy^2) + (3xy) + 0$
 $A) -3x^4y - 4x^2y$; (B) $-3x^4y^2 + 4x + y$;
 $C) 3xy^2 - 4x^2y$; (D) $-3x^4y^2 + 4x^2y$
12. *Viết biểu thức đại số* $\left(x^3 - x^2 + \frac{1}{3}x - \frac{1}{27}\right) \left(x - \frac{1}{3}\right)^2 =$
 $A) x - \frac{1}{3}$; (B) $\left(x + \frac{1}{3}\right)^2$; (C) $\left(\frac{1}{3} - x\right)^2$; (D) $x^2 - \frac{2}{3}x + \frac{1}{9}$
13. *Viết biểu thức đại số* $(x^3 + 3x^2 + 2x) : (x + 1)$
 $A) x + 2x^2$; (B) $x^2 - 2x$; (C) $x^2 + 2x$; (D) $x - 2x^2$
14. *Viết biểu thức đại số* Cho $P = (x + 3)^2 - (x - 3)(x + 3)$ Tìm giá trị của x là $P = 0$
 $A) x = 0$; (B) $x = 3$; (C) $x = 6$; (D) $x = -3$.

ĐẠI AN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG I

1. $x(5x^2 - 4x - 1) - 2x(5x^2 - 2x - 4x - 2x - 1) = 10x^3 - 8x^2 - 2x$ Chọn câu B
2. $x^{m+1} + x^n y^2 - y^2 x^n - y^2 y^{n-1} = x^{m+1} - y^{n+2} x^{n+1} - y^{n+1}$ Chọn câu D
3. $x^2 - \frac{1}{3}x - \frac{1}{3}x - \frac{1}{9} \Big) (9 - 18x) = 9x^2 - 18x^3 + 3x - 6x^2 - 3x + 6x^2 + 2x - 1$
 $= -18x^3 + 9x^2 + 2x - 1$ Chọn câu B
4. $(x^2 + 4xy + y^2 + 4x^2 - 4xy + y^2 = 8x^2 + 2y^2$ Chọn câu D
5. $(x^3 - 9x^2 + 27x - 17) = (x^3 - 3x^2 + 3x - 27) + 10 = (x - 3)^3 + 10$
 $\text{Đặt } x = 4 \Rightarrow A = (x - 3)^3 + 10 = (4 - 3)^3 + 10 = 11$ Chọn câu A
6. $(x^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3 + a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 - 6ab^2 - 2a^3 = 0$ Chọn câu B.
7. $A = (x - y + z)^2 + 2(x - y + z)(y - z) + (z - y)^2$
 $= (x - y + z)^2 - 2(x - y + z)(z - y) + (z - y)^2$
 $= [x - y + z - (z - y)]^2$
 $= x^2 = 10^2 = 100$ Chọn câu A

8. $D = (6x - 4 - 4)(6x - 4 + 4) = 36x^2 - 48x$

$36 = 6 \cdot 6$; $12 = 12 \cdot 1$

$48 = 6 \cdot 8$; $12 = 12 \cdot 1$ Chọn câu D.

9. $3x + z + 2y(3x + z) = (3x + z)(1 + 2y)$. Chọn câu D

10. $(a + b - c)^2 : (a + b - c)^3 = (a + b - c)^{2-3} = (a + b - c)^{-1}$. Chọn câu C

11. $(9x^3y^3 - 12x^2y + 3xy^2) : (-3xy) = 9x^3y^3 : (-3xy) - 12x^2y : (-3xy) + 3xy^2 : (-3xy)$
 $= -3x^2y^2 + 4x - y$. Chọn câu D.

12. $\left(x^3 - x^2 + \frac{1}{3}x - \frac{1}{27}\right) : \left(x - \frac{1}{3}\right) = \left(x^3 - 3x^2 \cdot \frac{1}{3} + 3x \cdot \frac{1}{3^2} - \frac{1}{3^3}\right) : \left(x - \frac{1}{3}\right)$
 $= \left(x - \frac{1}{3}\right)^3 : \left(x - \frac{1}{3}\right) = \left(x - \frac{1}{3}\right)^2 = \left[\left(\frac{1}{3} - x\right)\right]^2 = \left(\frac{1}{3} - x\right)^2 = x^2 - \frac{2}{3}x + \frac{1}{9}$

Chọn câu B.

13.
$$\begin{array}{r} x^3 + 3x^2 + 2x \overline{) x + 1} \\ x^3 + x^2 \\ \hline 2x^2 + 2x \\ 2x^2 + 2x \\ \hline 0 \end{array}$$

Chọn câu C.

14. $P = (x + 3)(x + 3 - x + 3) = 0 \Leftrightarrow 6(x + 3) = 0 \Leftrightarrow x = -3$. Chọn câu D

§1. PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

- Định nghĩa. Một phân thức đại số là một biểu thức có dạng $\frac{A}{B}$, trong đó A, B là những đa thức và $B \neq 0$.
 A được gọi là tử thức.
 B được gọi là mẫu thức.
 Đặc biệt. Một đa thức bằng 0 luôn có mẫu mẫu thức với mẫu thức bằng 1.
- Họ phân thức bằng nhau.
 Cho hai phân thức $\frac{A}{B}$ và $\frac{C}{D}$ ($B, D \neq 0$).
 Ta gọi $\frac{A}{B} = \frac{C}{D}$ nếu $A \cdot D = B \cdot C$.

II. BÀI TẬP

A. Bài tập mẫu

- Dùng định nghĩa, xét xem các biểu thức sau đây, biểu thức nào được gọi là phân thức. Vì sao?

$$\frac{x}{5}, \frac{x^2}{x-y}, \frac{2xy \cdot y^2}{x-y}, x-1, 3, \frac{x+1}{1}, \frac{x+1}{x^2}$$

Giải

Theo định nghĩa phân thức đại số, các biểu thức sau đây là những phân thức: $\frac{x}{5}, \frac{x^2}{x-y}, \frac{2xy \cdot y^2}{x-y}, x-1, 3,$

Theo định nghĩa, biểu thức $\frac{x+1}{1}$ không phải là phân thức đại số, bởi

$\frac{x+1}{1}$ không phải là một đa thức

2. Bạn An bảo rằng: $\frac{3x+3}{3x} = 3$; Còn bạn Mai thì nói: $\frac{3x+3}{3x} = \frac{x+1}{x}$.

Theo em ai nói đúng?

Giải:

Bạn Mai nói đúng. Thật vậy, $\frac{3x+3}{3x} = \frac{3(x+1)}{3x} = \frac{x+1}{x}$ (dpcm).

Bạn An nói sai. Thật vậy $(3x+3).1 = 3x+3 \neq 3.3x = 9x$ hay $\frac{3x+3}{3x} \neq 3$.

B. Bài tập căn bản

1. Dùng định nghĩa hai phân thức bằng nhau chứng tỏ rằng:

a) $\frac{5y}{7} = \frac{20xy}{28x}$;

b) $\frac{3x(x+5)}{2(x+5)} = \frac{3x}{2}$;

c) $\frac{x+2}{x-1} = \frac{(x+2)(x+1)}{x^2-1}$;

d) $\frac{x^2-x-2}{x+1} = \frac{x^2-3x+2}{x-1}$.

e) $\frac{x^3+8}{x^2-2x+4} = x+2$.

Giải:

Hướng dẫn: Ta tính tích 2 trung tỉ số và tích 2 ngoại tỉ số rồi so sánh.

a) Ta có $\frac{5y}{7} = \frac{140xy}{28x}$ và $\frac{20xy}{28x} = \frac{140xy}{7}$ $\Rightarrow \frac{5y}{7} = \frac{20xy}{28x}$

Vậy $\frac{5y}{7} = \frac{20xy}{28x}$

b) Ta có $\frac{3x(x+5)}{2(x+5)} = \frac{6x^2+30x}{2(x+5)}$ và $\frac{3x}{2} = \frac{3x(x+5)}{2(x+5)}$ $\Rightarrow \frac{3x(x+5)}{2(x+5)} = \frac{3x}{2}$

c) Ta có: $(x-1)(x+2)(x+1) = (x^2-1)(x+2)$

Vậy $\frac{x+2}{x-1} = \frac{(x+2)(x+1)}{x^2-1}$.

d) Ta có: $(x^2-x-2)(x-1) = (x^2-2x^2-x+2)$

và $(x+1)(x^2-3x+2) = (x^2-2x^2-x+2)$

Vậy $(x^2-x-2)(x-1) = (x+1)(x^2-3x+2)$

Suy ra $\frac{x^2-x-2}{x-1} = \frac{x^2-3x+2}{x-1}$.

e) Ta có $x^3+8 = x^3+2^3 = (x+2)(x^2-2x+4)$

Vậy $\frac{x^3+8}{x^2-2x+4} = x+2$.

2. Cho đa thức bậc 3 có tổng hệ số bằng 2.
$$x^3 - 2x^2 + 3x - 5 = x^3 - 2x^2 + 3x - 5$$

Giải

	x^3	x^2	x	1
Tổng các	1	-2	3	-5
Ta được	1	0	0	2
	x^3	x^2	x	1

$$\bullet \text{ Ta có } (x^3 - 2x^2 + 3x - 5) + (2x^2 - 3x + 5) = (x^3 - 2x^2 + 3x - 5) + (2x^2 - 3x + 5)$$

$$\Leftrightarrow x^3 - 2x^2 + 3x - 5 + 2x^2 - 3x + 5 = x^3$$

$$\bullet \text{ Ta có } (x^3 - 3x^2 + 5x + 3) + (4x^2 - 3x + 1) = (x^3 - 3x^2 + 5x + 3) + (4x^2 - 3x + 1)$$

$$\Leftrightarrow x^3 - 3x^2 + 5x + 3 + 4x^2 - 3x + 1 = x^3 + x^2 + 2x + 4$$

$$\text{Mà (1) và (2), ta có } \frac{x^3 - 2x^2 + 3x - 5}{x^3 + x^2} = \frac{x^3 - 3x^2 + 5x + 3}{x^3 + x^2 + 2x + 4}$$

3. Cho đa thức $x^3 - 4x, x^3 + 4, x^3 + 4x$. Hãy chọn đa thức thích hợp trong bốn đa thức đã cho điền vào chỗ trống trong đẳng thức dưới đây

$$\frac{x^3 - 4x}{x^3 + 4} = \frac{x^3 + 4x}{x^3 + 4}$$

Giải

Ta chọn đa thức $x^3 + 4$ để điền vào chỗ trống trong đẳng thức, khi đó ta

$$\text{được đẳng thức } \frac{x^3 - 4x}{x^3 + 4} = \frac{x^3 + 4x}{x^3 + 4}$$

$$\text{Thật vậy } (x^3 - 4x) + 4x(x + 4) = x(x + 4)(x - 4) + 4x(x + 4)$$

$$\text{Vậy } \frac{x^3 - 4x}{x^3 + 4} = \frac{x^3 + 4x}{x^3 + 4}$$

§2. TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN THỨC

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. Tính chất cơ bản của phân thức:

Nếu nhân cả tử và mẫu của một phân thức với cùng một đa thức khác đa thức 0 thì được một phân thức bằng phân thức đã cho

$$\frac{A}{B} = \frac{A \cdot M}{B \cdot M} \quad (M \text{ là một đa thức khác đa thức } 0)$$

Nếu chia cả tử và mẫu của một phân thức cho nhân tử chung của chúng thì được một phân thức bằng phân thức đã cho

$$\frac{A}{B} = \frac{A : N}{B : N} \quad (N \text{ là một nhân tử chung})$$

2. Quy tắc đổi dấu: Nếu đổi dấu cả tử và mẫu của phân thức thì được một phân thức bằng phân thức đã cho:

$$\frac{A}{B} = \frac{-A}{-B}$$

II. BÀI TẬP

A. Bài tập mẫu

1. Dùng tính chất cơ bản của phân thức hãy giải thích vì sao có thể viết

$$a) \frac{2x(x-1)}{(x+1)(x-1)} = \frac{2x}{x+1}$$

$$b) \frac{A}{B} = \frac{A}{B}$$

Giải

a) Ta có $\frac{2x(x-1)}{(x+1)(x-1)} = \frac{2x}{x+1}$ vì ta chia cả tử và mẫu của phân thức

$\frac{2x(x-1)}{(x+1)(x-1)}$ cho nhân tử chung $(x-1)$ thì được phân thức $\frac{2x}{x+1}$

Hoặc ta nhân tử và mẫu của phân thức $\frac{2x}{x+1}$ với đa thức $(x-1)$ của

$x-1 \neq 0$ thì ta được phân thức $\frac{2x(x-1)}{(x+1)(x-1)}$

$$b) \text{ Tương tự, } \frac{A}{B} = \frac{(-1)A}{(-1)B} = \frac{-A}{B}$$

2. Chứng minh đẳng thức: $\frac{x^2-2xy+y^2}{x^2-y^2} = \frac{x-y}{x+y}$

Giải

Ta biến đổi từ vế phức tạp ra vế đơn giản để tìm đa thức thích hợp

$$a) \frac{x^3 + x^2}{(x-1)(x+1)} - \frac{x^2(x+1)}{(x-1)(x+1)} = \frac{x^2}{x-1} (x^2-1)$$

Vậy phải điền x^2 vào chỗ trống.

$$b) \frac{5(x+y)}{2} - \frac{5(x+y)(x-y)}{2(x-y)} = \frac{5(x^2-y^2)}{2(x-y)} = \frac{5x^2}{2(x-y)} - \frac{5y^2}{2(x-y)}$$

Vậy phải điền $2(x-y)$ vào chỗ trống.

5. **Đố** Hãy dùng tính chất cơ bản của phân thức để điền một đa thức thích hợp

vào chỗ trống: $\frac{x^3-1}{x^2-1} = \frac{\dots}{x+1}$

Giải

$$\begin{aligned} \text{Ta có vế trái } \frac{x^3-1}{x^2-1} &= \frac{(x-1)(x^2+x+1)}{(x-1)(x+1)} \\ &= \frac{(x^3+x^2+x+1)}{x+1} = \frac{\dots}{x+1} = \text{vế phải} \end{aligned}$$

$$\text{Suy ra } \dots = x^3 + x^2 + x + 1$$

$$\text{Vậy } \frac{x^3-1}{x^2-1} = \frac{x^3+x^2+x+1}{x+1}$$

§3. RÚT GỌN PHÂN THỨC

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. Quy tắc: Muốn rút gọn một phân thức đại số ta phải:
Phân tích tử và mẫu thức thành nhân tử (nếu cần) để tìm nhân tử chung.
Chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung giống nhau.

2. Chú ý:

— Ta có thể trình bày cách giải rút gọn phân thức như sau:

$$\text{Ví dụ: Rút gọn phân thức } \frac{3x^2-12x^2+12x}{x^2-4}$$

$$\text{Ta có: } \frac{3x^2-12x^2+12x}{x^2-4} = \frac{3x(x-2)}{(x+2)}$$

Có khi cần đổi dấu ở tử hoặc ở mẫu thức để xuất hiện nhân tử chung

$$\text{Ví dụ: Rút gọn phân thức } \frac{1-x}{x(x-1)}$$

$$\text{Ta có: } \frac{1-x}{x(x-1)} = \frac{(x-1)}{x(x-1)} = \frac{1}{x}$$

II. BÀI TẬP

A. Bài tập mẫu

1. Rút gọn phân thức:

a) $\frac{15x^2 - y^2}{20x^2 - y^2}$

b) $\frac{3ax - a}{25(a - 4)}$

c) $\frac{x - 2x + 1}{5x + 5x'}$

d) $\frac{3x - y}{y - x}$

Giải:

a) $\frac{15x^2 - y^2}{20x^2 - y^2} = \frac{3.5x^2 - y^2}{4.5x^2 - y^2} = \frac{3}{4}$

b) $\frac{3ax - a}{25(ax - 4)} = \frac{a(3x - 1)}{25a(x - 4)} = \frac{3x - 1}{25}$

c) $\frac{x - 2x + 1}{5x + 5x'} = \frac{(x - 1) \cdot (-x + 1)}{5x(x + 1)} = \frac{-x^2}{5x}$

d) $\frac{3x - y}{y - x} = \frac{3x - y}{-(x - y)} = -3$

B. Bài tập cơ bản

7. Rút gọn phân thức:

a) $\frac{6x^2y^2}{8xy^3}$

b) $\frac{10xy^2(x + y)}{15xy(x + y)^2}$

c) $\frac{2x^2 + 2x}{x + 1}$

d) $\frac{x^2 - xy}{x^2 + xy} \cdot \frac{x + y}{x - y}$

Giải:

a) $\frac{6x^2y^2}{8xy^3} = \frac{2.3x^2y^2}{2.4xy^3} = \frac{3x}{4y}$

b) $\frac{10xy^2(x + y)}{15xy(x + y)^2} = \frac{2.5xy^2(x + y)}{3.5xy(x + y)(x + y)} = \frac{2y}{3(x + y)}$

c) $\frac{2x^2 + 2x}{x + 1} = \frac{2x(x + 1)}{x + 1} = 2x$

d) $\frac{x^2 - xy}{x^2 + xy} \cdot \frac{x + y}{x - y} = \frac{(x^2 - xy)(x + y)}{(x^2 + xy)(x - y)}$
 $= \frac{xx(1 - y)(x + y)}{xx(1 + y)(x - y)} = \frac{(x - y)(x + y)}{(x + y)(x - y)} = \frac{x - y}{x - y} = 1$

8. Trung tở nhập của một bạn có ghi một số phép rút gọn phân thức như sau:

a) $\frac{3xy}{5y} = \frac{x}{3}$

b) $\frac{3xy + 3}{9xy + 3} = \frac{x}{3}$

$$c) \frac{3xy + 3}{9y + 9} = \frac{x + 1}{3 + 3} = \frac{x + 1}{6} ;$$

$$d) \frac{3xy + 3x}{9y + 9} = \frac{x}{3}$$

Theo em câu nào đúng, câu nào sai? Em hãy giải thích

Giải

$$a) \frac{3xy}{9y} = \frac{x}{3} : \text{ĐÚNG, vì thực hiện đúng quy tắc}$$

$$b) \frac{3xy + 3}{9xy + 3} = \frac{x}{3} : \text{SAI, vì chưa phân tích tử và mẫu ra thừa số để rút gọn}$$

gọn hạng tử ở mẫu với hạng tử ở tử của phân thức

$$\text{Làm đúng như sau: } \frac{3xy + 3}{9xy + 3} = \frac{3(xy + 1)}{3(3xy + 1)} = \frac{xy + 1}{3xy + 1}$$

$$c) \frac{3xy + 3}{9y + 9} = \frac{x + 1}{3 + 3} = \frac{x + 1}{6} : \text{SAI, (giải thích như bài b)}$$

$$\text{Làm đúng như sau: } \frac{3xy + 3}{9y + 9} = \frac{3(xy + 1)}{9(y + 1)} = \frac{xy + 1}{3y + 3}$$

$$d) \frac{3xy + 3x}{9y + 9} = \frac{x}{3} : \text{ĐÚNG, nhưng khi giải qua gọn, có thể hiểu nhầm về cách giải.}$$

$$\text{Nên làm như sau: } \frac{3xy + 3x}{9y + 9} = \frac{3x(y + 1)}{9(y + 1)} = \frac{x}{3}$$

9. Áp dụng quy tắc đổi dấu rồi rút gọn phân thức:

$$a) \frac{36(x - 2)^3}{32 - 16x} ;$$

$$b) \frac{x^2}{5y^2} - \frac{xy}{5xy}$$

Giải

$$a) \frac{36(x - 2)^3}{32 - 16x} = \frac{36(x - 2)(x - 2)^2}{-16(x - 2)} = \frac{9(x - 2)^2}{4}$$

$$b) \frac{x^2 - xy}{5y^2 - 5xy} = \frac{x(x - y)}{5y(y - x)} = \frac{-x(y - x)}{5y(y - x)} = \frac{x}{5y}$$

10. **Đố:** Đố em rút gọn được phân thức:
$$\frac{x^7 + x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1}{x^2 - 1}$$

Giải

$$\begin{aligned} \frac{x^7 + x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1}{x^2 - 1} &= \frac{(x^7 + x^6 + x^5 + x^4) + (x^3 + x^2 + x + 1)}{x^2 - 1} \\ &= \frac{x^4(x^3 + x^2 + x + 1) + (x^3 + x^2 + x + 1)}{x^2 - 1} \end{aligned}$$

$$\frac{x^2 - \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2}}{x - \frac{1}{x}} = \frac{(x - \frac{1}{x})(x + \frac{1}{x}) - \frac{1}{x^2}}{x - \frac{1}{x}} = \frac{x^2 + 1 - \frac{1}{x^2}}{x - \frac{1}{x}}$$

$$\frac{x^2 + 1 - \frac{1}{x^2}}{x - \frac{1}{x}} = \frac{x^3 + 1 - \frac{1}{x}}{x(x - \frac{1}{x})} = \frac{x^3 + 1 - \frac{1}{x}}{x^2 - 1}$$

Luyện tập

- 11 Rút gọn phân thức: a) $\frac{12x^2y}{18xy}$ b) $\frac{15x(x^2 - 5)}{20x^2(x + 5)}$

Giải

$$\text{a) } \frac{12x^2y}{18xy} = \frac{2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot x \cdot x \cdot \cancel{y}}{3 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x \cdot \cancel{y}} = \frac{2x}{3}$$

$$\text{b) } \frac{15x(x^2 - 5)}{20x^2(x + 5)} = \frac{3 \cdot 5 \cdot x \cdot (x^2 - 5)}{4 \cdot 5 \cdot x \cdot x \cdot (x + 5)} = \frac{3(x^2 - 5)}{4x(x + 5)}$$

- 12 Phân tích tử và mẫu thành nhân tử rồi rút gọn phân thức

- a) $\frac{3x^2 - 12x + 12}{x^2 - 8x}$ b) $\frac{7x^2 - 14x + 7}{3x^2 - 3x}$

Giải

$$\text{a) } \frac{3x^2 - 12x + 12}{x^2 - 8x} = \frac{3(x^2 - 4x + 4)}{x(x^2 - 8x)} = \frac{3(x - 2)^2}{x(x^2 - 2^2)}$$

$$= \frac{3(x - 2)(x - 2)}{x(x - 2)(x + 2)} = \frac{3(x - 2)}{x(x + 2)}$$

$$\text{b) } \frac{7x^2 - 14x + 7}{3x^2 - 3x} = \frac{7(x^2 - 2x + 1)}{3x(x - 1)} = \frac{7(x - 1)(x - 1)}{3x(x - 1)} = \frac{7(x - 1)}{3x}$$

- 13 Áp dụng quy tắc đổi dấu rồi rút gọn phân thức

- a) $\frac{45x(3 - x)}{15x(x - 3)^2}$ b) $\frac{y^2 - x^2}{x^3 - 3x^2y + 3xy^2 - y^3}$

Giải

$$\text{a) } \frac{45x(3 - x)}{15x(x - 3)^2} = \frac{3 \cdot 15 \cdot x \cdot (3 - x)}{15 \cdot x \cdot (x - 3)(x - 3)} = \frac{3}{(x - 3)^2}$$

$$\text{b) } \frac{y^2 - x^2}{x^3 - 3x^2y + 3xy^2 - y^3} = \frac{(x^2 - y^2)}{(x - y)(x^2 - y^2)} = \frac{(x - y)(x + y)}{(x - y)(x - y)(x + y)} = \frac{1}{(x - y)}$$

§4. QUY ĐỒNG MẪU THỨC NHIỀU PHÂN THỨC

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. Quy đồng mẫu thức: Để thực hiện được phép cộng, phép trừ các phân thức không cùng mẫu thức, ta cần phải biến đổi các phân thức đã cho thành những phân thức có mẫu thức chung. Phép biến đổi này gọi là quy đồng mẫu thức.

2. Cách tìm mẫu thức chung (MTC): Muốn tìm MTC của nhiều phân thức ta phải phân tích các mẫu thức thành nhân tử (nếu cần).

Chọn một tích gồm các nhân tử chia hết cho các nhân tử bằng số ở các mẫu thức (nếu các nhân tử này là những số nguyên thì đó là BCNN của chúng), với mỗi cơ sở của lũy thừa có mặt trong các mẫu thức ta lấy lũy thừa với số mũ cao nhất.

Ví dụ 1: Tìm mẫu thức chung của các phân thức sau:

$$\frac{2}{3x^2 - 2}, \frac{x}{x^2 + 2x + 1}, \frac{y}{2x^2 - 2}$$

- Bước 1: Phân tích các mẫu thức thành nhân tử:

$$3x^2 - 2, x^2 + 2x + 1 = (x + 1)^2; 2x^2 - 2 = 2(x + 1)(x - 1)$$

- Bước 2: Tìm MTC $3x^2(x + 1)^2(x - 1)$

3. Quy đồng mẫu thức: Muốn quy đồng mẫu thức nhiều phân thức, ta có thể làm như sau:

- Phân tích các mẫu thức thành nhân tử rồi tìm MTC.

Tìm nhân tử phụ (TSP) của mỗi mẫu thức.

$$\text{TSP} = \frac{\text{MTC}}{\text{MT của PT}}$$

Nhân tử thức và mẫu thức của mỗi phân thức với nhân tử phụ tương ứng

Ví dụ 2: Quy đồng mẫu thức của các phân thức:

$$\frac{1}{xy - 2y^2}; \frac{x}{x + 2y}; \frac{x}{4xy^2 - x^2}$$

Giải:

- Bước 1: Tìm MTC

Phân tích các mẫu thức thành nhân tử.

$$xy - 2y^2 = y(x - 2y); \quad x + 2y;$$

$$4xy^2 - x^2 = x(4y^2 - x^2) = x[(2y)^2 - x^2] = x(2y - x)(2y + x)$$

$$\text{MTC} = xy(x + 2y)(x - 2y)$$

- Bước 2: Tìm TSP của từng phân thức.

$$\begin{aligned} \text{TSĐ}^* (\text{phần thức 1}) &= \frac{xy(x - 2y)(x + 2y)}{y(x - 2y)} = x(x + 2y) \\ \text{TSĐ}^* (\text{phần thức 2}) &= \frac{xy(x - 2y)(x + 2y)}{x + 2y} = xy(x - 2y) \\ \text{TSĐ}^* (\text{phần thức 3}) &= \frac{xy(x - 2y)(x + 2y)}{x(2y - x)(2y + x)} = y \end{aligned}$$

- **Hướng dẫn Quy đồng mẫu thức**

$$\begin{aligned} \frac{1}{x + 2y} &= \frac{1 \cdot x(x + 2y)}{y(x - 2y)(x + 2y)} = \frac{x(x + 2y)}{xy(x - 2y)(x + 2y)} \\ \frac{x}{x + 2y} &= \frac{y \cdot xy(x - 2y)}{(x + 2y) \cdot xy(x - 2y)} = \frac{xy'(x - 2y)}{xy(x + 2y)(x - 2y)} \\ \frac{x}{4xy - x^2} &= \frac{x(2y - x)(2y + x)(y)}{x(2y - x)(2y + x)(y)} = \frac{xy}{xy(x - 2y)(x + 2y)} \end{aligned}$$

II. BÀI TẬP

A. Bài tập mẫu

1. Tìm mẫu thức chung của các phân thức sau: $\frac{2}{3x^2}, \frac{x}{x^2}, 2x + 1, \frac{y}{2x^2 - 2}$

Giải:

Hướng dẫn: Phân tích các mẫu thức thành nhân tử

$$3x^2, x^2 + 2x + 1 = (x + 1)^2, 2x^2 - 2 = 2(x + 1)(x - 1)$$

Hướng dẫn: Tìm MTC: $3x^2(x + 1)^2(x - 1)$

2. Quy đồng mẫu thức của các phân thức: $\frac{1}{xy - 2y'}, \frac{x}{x + 2y}, \frac{x}{4xy' - x^2}$

Giải:

Hướng dẫn: Tìm MTC

Phân tích các mẫu thức thành nhân tử

$$xy - 2y' = y(x - 2y); x + 2y;$$

$$4xy' - x^2 = x(4y' - x') = x(2y' - x') = x(2y - x)(2y + x)$$

$$\text{MTC} = xy(x + 2y)(x - 2y)$$

Hướng dẫn: Tìm TSĐ của từng phân thức

$$\text{TSĐ}^* (\text{phần thức 1}) = \frac{xy(x - 2y)(x + 2y)}{y(x - 2y)} = x(x + 2y)$$

$$\text{TSĐ}^* (\text{phần thức 2}) = \frac{xy(x - 2y)(x + 2y)}{x + 2y} = xy(x - 2y)$$

$$\text{TSP (phần thứ 1)} = \frac{xy(x - 2y)(x + 2y)}{x(2y - x)(2y + x)} = 1$$

Hạng 1: Quy đồng mẫu thức:

$$\frac{1}{xy - 2y^2} = \frac{1 \cdot (x + 2y)}{y(x - 2y)(x + 2y)} = \frac{x(x + 2y)}{xy(x - 2y)(x + 2y)}$$

$$\frac{x}{x + 2y} = \frac{y \cdot xy(x - 2y)}{x + 2y \cdot xy(x - 2y)} = \frac{xy^2(x - 2y)}{xy(x + 2y)(x - 2y)}$$

$$\frac{x}{4xy^2 - x^3} = \frac{x(x + y)}{x(2y - x)(2y + x)(y)} = \frac{xy}{xy(x + 2y)(x - 2y)}$$

B. Bài tập căn bản

14. Quy đồng mẫu thức các phân thức sau:

a) $\frac{5}{x^5y^3} ; \frac{7}{12x^3y^4}$

b) $\frac{4}{15x^3y^5} ; \frac{11}{12x^4y^2}$

Giải

a) Ta có MTC = $12x^5y^4$

$$\text{Khi đó } \frac{5}{x^5y^3} = \frac{5 \cdot 12y}{x^5y^3 \cdot 12y} = \frac{60y}{12x^5y^4}$$

$$\frac{7}{12x^3y^4} = \frac{7 \cdot x^2}{12x^3y^4 \cdot x^2} = \frac{7x^2}{12x^5y^4}$$

b) Ta có MTC = $60x^4y^5$

$$\text{Khi đó } \frac{4}{15x^3y^5} = \frac{4 \cdot 4x}{15x^3y^5 \cdot 4x} = \frac{16x}{60x^4y^5}$$

$$\frac{11}{12x^4y^2} = \frac{11 \cdot 5y^3}{12x^4y^2 \cdot 5y^3} = \frac{55y^3}{60x^4y^5}$$

15. Quy đồng mẫu thức của các phân thức sau:

a) $\frac{5}{2x + 6} ; \frac{3}{x^2 - 9}$

b) $\frac{2x}{x^2 - 6x + 16} ; \frac{x}{3x^2 - 11x}$

Giải

$$\text{a) Ta có: } \left. \begin{array}{l} 2x + 6 = 2(x + 3) \\ x^2 - 9 = (x + 3)(x - 3) \end{array} \right\} \Rightarrow \text{MTC} = 2(x + 3)(x - 3)$$

$$\text{TSP (PT}_1\text{)} = \frac{2(x + 3)(x - 3)}{2(x + 3)} = x - 3$$

$$\text{TSP (PT}_2\text{)} = \frac{2(x + 3)(x - 3)}{(x + 3)(x - 3)} = 2$$

$$\begin{aligned}
&\text{Nhân cho} \quad \begin{matrix} 5 & & 3x-10 \\ 2x+1 & - & 3x+10 & = & 0 \end{matrix} \\
&\quad \quad \quad \begin{matrix} 10 & & 3x-10 \\ - & & - \\ 2x+1 & - & 3x+10 & = & 0 \end{matrix} \\
&\quad \quad \quad \begin{matrix} 10 & & 3x-10 \\ - & & - \\ 2x+1 & - & 3x+10 & = & 0 \end{matrix} \\
&\quad \quad \quad \begin{matrix} 10 & & 3x-10 \\ - & & - \\ 2x+1 & - & 3x+10 & = & 0 \end{matrix} \\
&\text{Vậy } P(x) = \frac{10x^2 - 3x + 10}{(x-1)^2} = \frac{10(x-1)^2 + 21(x-1) + 21}{(x-1)^2} \\
&\quad \quad \quad P(x) = P'(x) = \frac{20(x-1) + 21}{(x-1)^2} = 21 \\
&\quad \quad \quad P(x) = P''(x) = \frac{20(x-1) + 21}{(x-1)^2} = 21 \\
&\text{Nhân cho} \quad \begin{matrix} 2x & & -2x-3x & & 3x \\ x & - & 3x+10 & - & (x-1)^2 & - & (3x+10) \\ - & & - & & - & & - \\ x & & - & 3x+10 & - & (x-1)^2 & - & (3x+10) \\ - & & - & & - & & - \\ 3x & - & 12x & - & 30x & - & 10 \end{matrix}
\end{aligned}$$

16. Cho đồng mẫu thức các phân thức sau, viết các áp dụng quy tắc đổi dấu để rút gọn phân thức (đưa về mẫu thức chung trước khi rút gọn)

$$\text{a) } \frac{4x^2 - 3x + 5}{x^2 - 1} - \frac{1 - 2x}{x^2 + x + 1} = \frac{10}{x+2} - \frac{5}{2x-4} + \frac{1}{3x}$$

Giải

$$\text{a) MTC} = (x-1)(x^2+x+1)$$

$$\begin{aligned}
\text{Ta có } \frac{4x^2 - 3x + 5}{x^2 - 1} &= \frac{4x^2 - 3x + 5}{(x-1)(x^2+x+1)} \\
&= \frac{1-2x}{x^2+x+1} = \frac{(x-1)(1-2x)}{(x-1)(x^2+x+1)} \\
&= \frac{1-2x}{x^2+x+1} = \frac{(x-1)(x^2+x+1)}{(x-1)(x^2+x+1)} \\
&= \frac{2x-1}{(x-1)(x^2+x+1)}
\end{aligned}$$

b) Phân tích các mẫu số thừa số

$$\begin{aligned}
&x+2 \\
&2x-4 = 2(x-2) \\
&3x-6 = 3(x-2)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{Ta có } \frac{10}{x+2} &= \frac{10(x-2)}{6(x-2)(x+2)} = \frac{5(x-2)}{3(x-2)(x+2)} \\
&= \frac{5}{3(x+2)} = \frac{5(3x+2)}{6(x+2)(x+2)} = \frac{15x+2}{6(x+2)(x+2)} \\
&= \frac{15x+2}{6(x+2)(x+2)}
\end{aligned}$$

$$\frac{1}{5-3x} = \frac{1}{3(2-x)} = \frac{1(2x+2)}{6x-2(2x+2)} = \frac{2x+2}{-2(3x-2)}$$

17. **Đố:** Cho hai phân thức: $\frac{5x^2}{x^3-6x^2}$ và $\frac{3x^2+18x}{x^2-36}$

Khi quy đồng mẫu thức, bạn Tuấn đã chọn MTC = $x^2(x-6)(x+6)$, còn bạn Lan bảo rằng: "Quá đơn giản! MTC = $x-6$ ". Đố em biết bạn nào chọn đúng?

Giải:

$$\left. \begin{array}{l} \text{Ta có } \frac{5x^2}{x^3-6x^2} = \frac{x^2(x-6)}{x^2(x-6)} \\ \text{và } \frac{3x^2+18x}{x^2-36} = \frac{3x(x+6)}{(x-6)(x+6)} \end{array} \right\} \Rightarrow \text{MTC} = x^2(x-6)(x+6)$$

Vậy bạn Tuấn đã chọn đúng.

$$\begin{aligned} \text{Bạn Lan bảo như sau: } \frac{5x^2}{x^3-6x^2} &= \frac{5x^2}{x^2(x-6)} = \frac{5}{x-6} \\ \text{và } \frac{3x^2+18x}{x^2-36} &= \frac{3x(x+6)}{(x-6)(x+6)} = \frac{3x}{x-6} \end{aligned}$$

Vậy bạn Lan cũng chọn đúng.

Luyện tập

18. Quy đồng mẫu thức hai phân thức:

a) $\frac{3x}{2x+4}$ và $\frac{x+3}{x^2-4}$;

b) $\frac{x+5}{x^3+4x+4}$ và $\frac{x}{3x+6}$

Giải:

$$\text{a) } \left. \begin{array}{l} \frac{3x}{2x+4} = \frac{2(x+2)}{2(x+2)(x+2)} \\ \frac{x+3}{x^2-4} = \frac{1(x-2)(x+2)}{(x-2)(x+2)(x+2)} \end{array} \right\} \Rightarrow \text{MTC} = 2(x+2)^2$$

$$\text{Ta có: } \frac{3x}{2x+4} = \frac{3x(x+2)}{2(x+2)(x+2)} = \frac{3x^2+6x}{2(x^2-4)}$$

$$\frac{x+3}{x^2-4} = \frac{2(x-2)}{2(x^2-4)} = \frac{2x-6}{2(x^2-4)}$$

$$\text{b) } \left. \begin{array}{l} \frac{x^2+4x+4}{3x+6} = \frac{(x+2)^2}{3(x+2)} \\ \frac{x}{3x+6} = \frac{x}{3(x+2)} \end{array} \right\} \Rightarrow \text{MTC} = 3(x+2)^2$$

$$\text{Ta có: } \frac{x^2+4x+4}{3x+6} = \frac{3(x+2)}{3(x+2)^2} = \frac{3x+12}{3(x+2)^2}$$

$$\frac{x}{3x+6} = \frac{x(x+2)}{3(x+2)^2} = \frac{x^2+2x}{3(x+2)^2}$$

19. Dùng đồng thức/Huân chia để phân tích được:

$$\begin{aligned} & \frac{1}{x^2 + 3x + 2} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x+2} \quad \Leftrightarrow \frac{1}{x^2 + 3x + 2} = \frac{A(x+2)}{x^2 + 3x + 2} + \frac{B(x+1)}{x^2 + 3x + 2} \\ & \Leftrightarrow 1 = (A+B)x + 2A+B \quad \Leftrightarrow \begin{cases} A+B=0 \\ 2A+B=1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A=-1 \\ B=1 \end{cases} \end{aligned}$$

Giải:

a) Ta có: $\frac{x^2 + 2x + 3}{x^2 + 3x + 2} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x+2}$ $\Leftrightarrow \text{MTC} = (x+1)(x+2) = x^2 + 3x + 2$

Khi đó: $\frac{1}{x^2 + 3x + 2} = \frac{A(x+2)}{x^2 + 3x + 2} + \frac{B(x+1)}{x^2 + 3x + 2}$

Suy ra: $\frac{x^2 + 2x + 3}{x^2 + 3x + 2} = \frac{A(x+2) + B(x+1)}{x^2 + 3x + 2} \Leftrightarrow \frac{A(2) + B(1)}{x^2 + 3x + 2} = \frac{x^2 + 2x + 3}{x^2 + 3x + 2}$

b) $\text{MTC} = x - 1$

Khi đó $\frac{x + 1}{x - 1} = \frac{A(x - 1) + B}{x - 1} \Leftrightarrow \frac{x + 1}{x - 1} = \frac{A(x - 1) + B}{x - 1}$

20. Phân tích các mẫu thức:

$$\begin{aligned} & \frac{x^2 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3}{x^2 + 3x + 2} = \frac{(x + y)^3}{(x + 1)(x + 2)} \quad \text{MTC} = (x + 1)(x + 2) \\ & \frac{x^2 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3}{x^2 + 3x + 2} = \frac{A}{x + 1} + \frac{B}{x + 2} \end{aligned}$$

Quy đồng mẫu thức

$$\begin{aligned} & \frac{x^2 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3}{x^2 + 3x + 2} = \frac{A}{x + 1} + \frac{B}{x + 2} \\ & \frac{x^2 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3}{x^2 + 3x + 2} = \frac{A(x + 2) + B(x + 1)}{(x + 1)(x + 2)} \\ & \frac{x^2 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3}{x^2 + 3x + 2} = \frac{A(x + 2) + B(x + 1)}{(x + 1)(x + 2)} \end{aligned}$$

20. Cho hai phân thức $\frac{1}{x^2 + 3x + 10}$ và $\frac{x}{x^2 + 7x + 10}$

Không dùng cách phân tích các mẫu thức, thuận tiện từ, hãy chứng tỏ rằng có thể qua đồng mẫu thức hai phân thức này với mẫu thức chung là:

$$x^2 + 5x^2 - 4x - 20$$

Giải:

Vì $x^2 + 5x^2 - 4x - 20$ là MTC của hai phân thức, do đó thuận số phụ của mỗi phân thức sẽ bằng MTC chia cho mẫu thức của từng phân thức

Ta có: $\text{TSĐ}(\text{PT}_1) = \frac{x^2 + 5x^2 - 4x - 20}{x^2 + 3x + 10} = x + 2$

Và: $\text{TSĐ}(\text{PT}_2) = \frac{x^2 + 5x^2 - 4x - 20}{x^2 + 7x + 10} = x - 2$

$$\text{Vậy } \frac{1}{x^2 + 3x - 10} = \frac{3x + 2}{(x^2 + 3x - 10)(x + 2)} = \frac{(x + 2)}{x^3 + 5x^2 - 4x - 20}$$

$$\text{và } \frac{x}{x^2 + 7x - 10} = \frac{x(x + 2)}{(x^2 + 7x - 10)(x + 2)} = \frac{x(x + 2)}{x^3 + 9x^2 + 7x - 20}$$

§5. PHÉP CỘNG CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. Cộng hai phân thức cùng mẫu thức:

Quy tắc: Muốn cộng hai (hay nhiều) phân thức cùng mẫu thức ta cộng các tử thức với nhau, giữ nguyên mẫu thức và rút gọn phân thức vừa tìm được (nếu có thể).

$$\frac{A}{B} + \frac{C}{B} = \frac{A + C}{B}$$

2. Cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau:

Quy tắc: Muốn cộng hai (hay nhiều) phân thức có mẫu thức khác nhau, ta quy đồng mẫu thức, rồi cộng các phân thức có cùng mẫu thức vừa tìm được.

$$\frac{A}{B} + \frac{C}{D} = \frac{AD}{BD} + \frac{CB}{BD} = \frac{AD + BC}{BD}$$

3. Chú ý: Phép cộng các phân thức cũng có các tính chất:

a) Tính chất giao hoán: $\frac{A}{B} + \frac{C}{D} = \frac{C}{D} + \frac{A}{B}$

b) Tính kết hợp: $\left(\frac{A}{B} + \frac{C}{D}\right) + \frac{E}{F} = \frac{A}{B} + \left(\frac{C}{D} + \frac{E}{F}\right)$

II. BÀI TẬP

A. Bài tập mẫu

Thực hiện phép cộng các phân thức:

a) $\frac{3x + 1}{7x^2y} + \frac{2x + 2}{7x^2y}$

b) $\frac{x^2 + 4}{x - 2} + \frac{4x}{2 - x}$

c) $\frac{6}{x^2 + 4x} + \frac{3}{2x + 8}$

d) $x^2 + x + 1 + \frac{x^3}{1 - x}$

Giải

a) $\frac{3x + 1}{7x^2y} + \frac{2x + 2}{7x^2y} = \frac{3x + 1 + 2x + 2}{7x^2y} = \frac{5x + 3}{7x^2y}$

$$b) \frac{x^2 + 1}{x^2 - 2} + \frac{4x}{x - \frac{1}{2}} = \frac{x^2 + 1}{x^2 - 2} + \frac{4x}{x - \frac{1}{2}} = \frac{x^2 - 4x + 4}{x^2 - 2} + \frac{(x - \frac{1}{2})^2}{x^2 - 2} = \frac{x^2 - 2}{x^2 - 2}$$

$$c) \frac{6}{x^2 + 4x} + \frac{3}{2x + 8}$$

$$\text{Ta có } \frac{x^2 + 4x}{2x + 8} = \frac{x(x + 4)}{2(x + 4)} = \text{MTC} = 2(x + 4)$$

$$\text{Khi đó } \frac{6}{x^2 + 4x} + \frac{3}{2x + 8} = \frac{6}{2x(x + 4)} + \frac{3x}{2x(x + 4)} = \frac{12 + 3x}{2x(x + 4)} = \frac{3(x + 4)}{2x(x + 4)} = \frac{3}{2x}$$

$$d) \text{Ta có } x^2 + x + 1 = \frac{x^2 + x + 1}{1}$$

$$\text{Vậy MTC} = 1 - x$$

$$x^2 + x + 1 + \frac{x^2}{1 - x} = \frac{(x^2 + x + 1)(1 - x)}{1 - x} + \frac{x^2}{1 - x} = \frac{1 - x^2 + x^2}{1 - x} = \frac{1}{1 - x}$$

B. Bài tập căn bản

21. Thực hiện các phép tính sau

$$a) \frac{3x - 5}{7} + \frac{4x + 5}{7}; \quad b) \frac{5xy - 4y}{2x^2y^3} + \frac{3xy + 4y}{2x^2y^3} \quad c) \frac{x + 1}{x - 5} + \frac{x - 18}{x - 5} + \frac{x + 2}{x - 5}$$

Giải

$$a) \frac{3x - 5}{7} + \frac{4x + 5}{7} = \frac{3x - 5 + 4x + 5}{7} = \frac{7x}{7} = x$$

$$b) \frac{5xy - 4y}{2x^2y^3} + \frac{3xy + 4y}{2x^2y^3} = \frac{5xy - 4y + 3xy + 4y}{2x^2y^3} = \frac{8xy}{2x^2y^3} = \frac{4}{xy^2}$$

$$c) \frac{x + 1}{x - 5} + \frac{x - 18}{x - 5} + \frac{x + 2}{x - 5} = \frac{x + 1 + x - 18 + x + 2}{x - 5} = \frac{3(x - 5)}{x - 5} = 3$$

22. Áp dụng quy tắc đổi dấu để các phân thức có cùng mẫu thức rồi làm tính cộng phân thức:

$$a) \frac{2x^2 - x}{x - 1} + \frac{x + 1}{1 - x} + \frac{2 - x^2}{x - 1}; \quad b) \frac{4 - x^2}{x - 3} + \frac{2x - 2x^2}{3 - x} + \frac{5 - 4x}{x - 3}$$

Giải

$$a) \frac{2x^2 - x}{x - 1} + \frac{x + 1}{1 - x} + \frac{2 - x^2}{x - 1} = \frac{2x^2 - x}{x - 1} + \frac{-(x + 1)}{x - 1} + \frac{2 - x^2}{x - 1} \\ = \frac{2x^2 - x - x - 1 + 2 - x^2}{x - 1} = \frac{x^2 - 2x + 1}{x - 1} = \frac{(x - 1)^2}{x - 1} = x - 1$$

$$b) \frac{4 - x^2}{x - 3} + \frac{2x - 2x^2}{3 - x} + \frac{5 - 4x}{x - 3} = \frac{4 - x^2}{x - 3} + \frac{-(2x - 2x^2)}{x - 3} + \frac{5 - 4x}{x - 3}$$

$$= \frac{-4}{x-3} \cdot \frac{x^2 - 2x + 2x^2 + 5 - 4x}{x-3} = \frac{x^2 - 6x + 9}{x-3} = \frac{(x-3)^2}{x-3} = x-3$$

23. Làm các phép tính sau:

$$a) \frac{y}{2x^2 - xy} + \frac{4x}{y^2 - 2xy};$$

$$b) \frac{1}{x+2} + \frac{3}{x^2-4} + \frac{x-14}{(x^2+4x+4)(x-2)};$$

$$c) \frac{1}{x+2} + \frac{1}{(x+2)(4x+7)};$$

$$d) \frac{1}{x+3} + \frac{1}{(x+3)(x+2)} + \frac{1}{(x+2)(4x+7)}.$$

Giải

$$a) \frac{y}{2x^2 - xy} + \frac{4x}{y^2 - 2xy}$$

$$\text{Ta có: } \left. \begin{array}{l} 2x^2 - xy = x(2x - y) \\ y^2 - 2xy = y(y - 2x) \end{array} \right\} \Rightarrow \text{MTC} = xy(2x - y)$$

$$\begin{aligned} \text{Khi đó } \frac{y}{2x^2 - xy} + \frac{4x}{y^2 - 2xy} &= \frac{y \cdot y}{xy(2x - y)} + \frac{4x \cdot x}{x \cdot y(2x - y)} \\ &= \frac{y^2 - 4x^2}{xy(2x - y)} = \frac{(y - 2x)(y + 2x)}{xy(2x - y)} = \frac{-(y - 2x)}{xy} \end{aligned}$$

$$b) \frac{1}{x+2} + \frac{3}{x^2-4} + \frac{x-14}{(x^2+4x+4)(x-2)}$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{Ta có: } x^2 - 4 = (x+2)(x-2) \\ (x^2+4x+4)(x-2) = (x+2)^2(x-2) \end{array} \right\}$$

$\Rightarrow \text{MTC} = (x+2)^2(x-2)$, khi đó:

$$\begin{aligned} \frac{1}{x+2} + \frac{3}{x^2-4} + \frac{x-14}{(x^2+4x+4)(x-2)} &= \frac{(x+2)(x-2)}{(x+2)^2(x-2)} + \frac{3(x-2)}{(x+2)^2(x-2)} + \frac{x-14}{(x+2)^2(x-2)} \\ &= \frac{(x+2)(x-2) + 3(x-2) + x-14}{(x+2)^2(x-2)} = \frac{x^2-4+3x+6+x-14}{(x+2)^2(x-2)} \\ &= \frac{x^2+4x-12}{(x+2)^2(x-2)} = \frac{x^2+4x+4-16}{(x+2)^2(x-2)} = \frac{(x+2)^2-4^2}{(x+2)^2(x-2)} = \frac{(x+2+4)(x+2-4)}{(x+2)^2(x-2)} \\ &= \frac{(x+6)(x-2)}{(x+2)^2(x-2)} = \frac{x+6}{(x+2)^2} \end{aligned}$$

$$c) \frac{1}{x+2} + \frac{1}{(x+2)(4x+7)} = \frac{4x+7}{(x+2)(4x+7)} + \frac{1}{(x+2)(4x+7)}$$

$$= \frac{4x+7+1}{(x+2)(4x+7)} = \frac{4x+8}{(x+2)(4x+7)} = \frac{4(x+2)}{(x+2)(4x+7)} = \frac{4}{4x+7}$$

Giải

$$c) \frac{x+1}{x^2-1} - \frac{x+1}{x^2-x}$$

$$\text{Ta có: } \frac{x^2-1}{x^2-x} = \frac{(x+1)(x-1)}{x(x-1)} \quad \text{MTC} = x(x+1)(x-1)$$

$$\begin{aligned} \text{Khi đó: } \frac{x+1}{x^2-1} - \frac{x+1}{x^2-x} &= \frac{x+1}{(x+1)(x-1)} - \frac{x+1}{x(x-1)} \\ &= \frac{x(x-1)}{x(x-1)(x-1)} - \frac{(x+1)(x-1)}{x(x-1)(x-1)} = \frac{x^2-3x}{x(x-1)(x-1)} \\ &= \frac{x-1}{x(x-1)(x-1)} - \frac{1}{x(x-1)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} c) \frac{x+2}{x^2+3x} - \frac{x+1}{x^2-9} &= \frac{x+2}{x(x+3)} - \frac{(x+1)}{(x+3)(x-3)} \\ &= \frac{(x+2)(x-3)}{x(x+3)(x-3)} - \frac{x^2-1}{x(x+3)(x-3)} \\ &= \frac{-2x-6}{x(x+3)(x-3)} = \frac{-2(x+3)}{x(x+3)(x-3)} = \frac{-2}{x(x-3)} \end{aligned}$$

B. Bài tập căn bản

28. Theo quy tắc đổi dấu ta có: $-\frac{A}{B} = \frac{A}{-B}$. Do đó ta cũng có $-\frac{A}{-B} = \frac{A}{B}$.

Chẳng hạn, phân thức đối của $\frac{4}{5-x}$ là $\frac{4}{5-x} = \frac{4}{-(5-x)} = \frac{4}{x-5}$. Áp dụng điều này, hãy điền những phân thức thích hợp vào những chỗ trống dưới đây:

a) $\frac{x^2+2}{1-5x} = \dots$

b) $\frac{4x+1}{5-x} = \dots$

Giải

$$\text{Ta có: } \frac{A}{B} = \frac{(-A)}{B} = \frac{A}{(-B)}$$

a) $\frac{x^2+2}{1-5x} = \frac{x^2+2}{-(1-5x)} = \frac{x^2+2}{5x-1}$

b) $\frac{4x+1}{5-x} = \frac{4x+1}{-(5-x)} = \frac{4x+1}{x-5}$

29. Làm tính trừ các phân thức sau:

a) $\frac{4x-1}{3x^2y} - \frac{7x-1}{3x^2y}$

b) $\frac{4x+5}{2x-1} - \frac{5-9x}{2x-1}$

$$c) \frac{11x}{2x-3} - \frac{x-18}{3-2x}.$$

$$d) \frac{2x-7}{10x-4} - \frac{3x+5}{4-10x}$$

Giải

$$\begin{aligned} a) \frac{4x-1}{3x^2y} - \frac{7x-1}{3x^2y} &= \frac{4x-1}{3x^2y} + \frac{-(7x-1)}{3x^2y} \\ &= \frac{4x-1-(7x-1)}{3x^2y} = \frac{4x-1-7x+1}{3x^2y} = \frac{-3x}{3x^2y} = \frac{-3x}{3x^2y} \cdot \frac{1}{xy} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b) \frac{4x+5}{2x-1} - \frac{5-9x}{2x-1} &= \frac{4x+5}{2x-1} + \frac{-(5-9x)}{2x-1} \\ &= \frac{4x+5-(5-9x)}{2x-1} = \frac{4x+5-5+9x}{2x-1} = \frac{13x}{2x-1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} c) \frac{11x}{2x-3} - \frac{x-18}{3-2x} &= \frac{11x}{2x-3} + \frac{x-18}{2x-3} \\ &= \frac{11x+x-18}{2x-3} = \frac{12x-18}{2x-3} = \frac{6(2x-3)}{2x-3} = 6 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} d) \frac{2x-7}{10x-4} - \frac{3x+5}{4-10x} &= \frac{2x-7}{10x-4} + \frac{3x+5}{10x-4} \\ &= \frac{2x-7+3x+5}{10x-4} = \frac{5x-2}{10x-4} = \frac{5x-2}{2(5x-2)} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

30. Thực hiện các phép tính sau:

$$a) \frac{3}{2x+6} - \frac{x-6}{2x^2+6x};$$

$$b) x^2+1 - \frac{x^4-3x^2+2}{x^2-1}$$

Giải

$$\begin{aligned} a) \frac{3}{2x+6} - \frac{x-6}{2x^2+6x} &= \frac{3}{2x(x+3)} + \frac{-(x-6)}{2x(x+3)} \\ &= \frac{3x-(x-6)}{2x(x+3)} = \frac{3x-x+6}{2x(x+3)} = \frac{2(x+3)}{2x(x+3)} = \frac{1}{x} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b) x^2+1 - \frac{x^4-3x^2+2}{x^2-1} &= \frac{(x^2+1)(x^2-1)}{x^2-1} + \frac{-(x^4-3x^2+2)}{x^2-1} \\ &= \frac{(x^2-1)-(x^4-3x^2+2)}{x^2-1} = \frac{x^2-1-x^4+3x^2-2}{x^2-1} \\ &= \frac{3x^2-3}{x^2-1} = \frac{3(x^2-1)}{x^2-1} = 3 \end{aligned}$$

31. Chứng tỏ rằng mỗi hiệu sau đây bằng một phân thức có tử bằng 1.

$$a) \frac{1}{x} - \frac{1}{x+1};$$

$$b) \frac{1}{xy} - \frac{1}{y^2} - \frac{1}{xy}$$

Giải

$$a) \quad \frac{1}{x} - \frac{1}{x+1} = \frac{x+1-x}{x(x+1)} = \frac{1}{x(x+1)}$$

$$b) \quad \frac{1}{xy-x^2} - \frac{1}{y^2-xy} = \frac{1}{xy(y-x)} - \frac{1}{y(y-x)}$$

$$= \frac{y}{xy^2(y-x)} - \frac{x}{xy^2(y-x)} = \frac{y-x}{xy^2(y-x)} = \frac{1}{xy^2}$$

Từ hai kết quả trên chúng ta thấy nếu cho x và y là những số tự nhiên khác 0 thì giá trị tương ứng của mỗi phân thức trên là một phân số với tử số luôn bằng 1

32. Bài 32. Dùng tính nhanh được tổng sau:

$$\frac{1}{x(x+1)} + \frac{1}{(x+1)(x+2)} + \frac{1}{(x+2)(x+3)} + \frac{1}{(x+3)(x+4)} + \frac{1}{(x+4)(x+5)} + \frac{1}{(x+5)(x+6)}$$

Giải

Áp dụng kết quả bài tập 31 a) ta có thể tính nhanh được phép tính đã cho

$$\begin{aligned} \text{Thật vậy, ta có} \quad & \frac{1}{x(x+1)} = \frac{1}{x} - \frac{1}{x+1} \\ & \frac{1}{(x+1)(x+2)} = \frac{1}{x+1} - \frac{1}{x+2} \\ & \frac{1}{(x+2)(x+3)} = \frac{1}{x+2} - \frac{1}{x+3} \\ & \frac{1}{(x+3)(x+4)} = \frac{1}{x+3} - \frac{1}{x+4} \\ & \frac{1}{(x+4)(x+5)} = \frac{1}{x+4} - \frac{1}{x+5} \\ & \frac{1}{(x+5)(x+6)} = \frac{1}{x+5} - \frac{1}{x+6} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Vậy,} \quad & \frac{1}{x(x+1)} + \frac{1}{(x+1)(x+2)} + \frac{1}{(x+2)(x+3)} + \frac{1}{(x+3)(x+4)} + \frac{1}{(x+4)(x+5)} + \frac{1}{(x+5)(x+6)} \\ & = \frac{1}{x} - \frac{1}{x+6} = \frac{x+6-x}{x(x+6)} = \frac{6}{x(x+6)} \end{aligned}$$

Luyện tập

33. Làm các phép tính sau:

$$a) \frac{4xy - 5}{10x^3y} - \frac{6y^2 - 5}{10x^3y};$$

$$b) \frac{7x + 6}{2x(x + 7)} - \frac{3x + 6}{2x^2 + 14x}$$

Giải

$$\begin{aligned} a) \frac{4xy - 5}{10x^3y} - \frac{6y^2 - 5}{10x^3y} &= \frac{4xy - 5}{10x^3y} + \frac{-(6y^2 - 5)}{10x^3y} \\ &= \frac{4xy - 5 - (6y^2 - 5)}{10x^3y} = \frac{4xy - 5 - 6y^2 + 5}{10x^3y} \\ &= \frac{4xy - 6y^2}{10x^3y} = \frac{2y(2x - 3y)}{10x^3y} = \frac{2x - 3y}{5x^3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b) \frac{7x + 6}{2x(x + 7)} - \frac{3x + 6}{2x^2 + 14x} &= \frac{7x + 6}{2x(x + 7)} + \frac{-(3x + 6)}{2x(x + 7)} = \frac{7x + 6 - (3x + 6)}{2x(x + 7)} \\ &= \frac{7x + 6 - 3x - 6}{2x(x + 7)} = \frac{4x}{2x(x + 7)} = \frac{2}{x + 7} \end{aligned}$$

34. Dùng quy tắc đổi dấu rồi thực hiện các phép tính sau:

$$a) \frac{4x + 13}{5x(x - 7)} - \frac{x - 48}{5x(7 - x)};$$

$$b) \frac{1}{x - 5x^2} - \frac{25x - 15}{25x^2 - 1}$$

Giải

$$\begin{aligned} a) \frac{4x + 13}{5x(x - 7)} - \frac{x - 48}{5x(7 - x)} &= \frac{4x + 13}{5x(x - 7)} + \frac{x - 48}{-5x(7 - x)} \\ &= \frac{4x + 13}{5x(x - 7)} + \frac{x - 48}{5x(x - 7)} = \frac{4x + 13 + x - 48}{5x(x - 7)} = \frac{5x - 35}{5x(x - 7)} = \frac{5(x - 7)}{5x(x - 7)} = \frac{1}{x} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b) \frac{1}{x - 5x^2} - \frac{25x - 15}{25x^2 - 1} &= \frac{1}{x(1 - 5x)} - \frac{25x - 15}{(5x + 1)(5x - 1)} \\ &= \frac{-1}{x(5x - 1)} + \frac{15 - 25x}{(5x + 1)(5x - 1)} = \frac{-5x - 1 + 15x - 25x^2}{x(5x + 1)(5x - 1)} \\ &= \frac{-(25x^2 - 10x + 1)}{x(5x + 1)(5x - 1)} = \frac{-(5x - 1)^2}{x(5x + 1)(5x - 1)} = \frac{-(5x - 1)}{x(5x + 1)} = \frac{1 - 5x}{x(5x + 1)} \end{aligned}$$

35. Thực hiện các phép tính:

$$a) \frac{x + 1}{x - 3} - \frac{1 - x}{x + 3} - \frac{2x(1 - x)}{9 - x^2};$$

$$b) \frac{3x + 1}{(x - 1)^2} - \frac{1}{x + 1} + \frac{x + 3}{1 - x^2}$$

Giải

$$\begin{aligned} \text{a. } \frac{x+1}{x-3} - \frac{1-x}{x+3} - \frac{2x+3}{x-3} &= \frac{(x+1)(x+3)}{(x-3)(x+3)} - \frac{(1-x)(x+3)}{(x-3)(x+3)} - \frac{2x(1-x)}{(x-3)(x+3)} \\ &= \frac{(x+1)(x+3) - (1-x)(x+3) - 2x(1-x)}{(x-3)(x+3)} \\ &= \frac{x^2+4x+3 - x^2-4x+3 + 2x - 2x^2}{(x-3)(x+3)} \\ &= \frac{2x-6}{(x-3)(x+3)} = \frac{2(x-3)}{(x-3)(x+3)} = \frac{2}{x+3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b. } \frac{3x+1}{(x-1)^2} - \frac{1}{x+1} - \frac{x+3}{1-x^2} &= \frac{3x+1}{(x-1)^2} + \frac{1}{x+1} - \frac{x+3}{x^2-1} \\ &= \frac{(3x+1)(x+1) - (x-1)^2 - (x+3)(x-1)}{(x-1)^2(x+1)} \\ &= \frac{3x^2+4x+1 - x^2+2x-1 - x^2-2x+3}{(x-1)^2(x+1)} \\ &= \frac{x^2+4x+3}{(x-1)^2(x+1)} = \frac{x^2+x+3x+3}{(x-1)^2(x+1)} \\ &= \frac{x(x+1)+3(x+1)}{(x-1)^2(x+1)} = \frac{(x+1)(x+3)}{(x-1)^2(x+1)} = \frac{x+3}{(x-1)^2} \end{aligned}$$

35. Một công ty may mặc phải sản xuất 10000 sản phẩm trong x ngày. Khi thực hiện không những đã làm xong sớm một ngày mà còn làm thêm được 80 sản phẩm.

a) Hãy biểu diễn qua x .

Số sản phẩm phải sản xuất trong một ngày theo kế hoạch;

Số sản phẩm thực tế đã làm được trong một ngày;

Số sản phẩm làm thêm trong một ngày.

b) Tính số sản phẩm làm thêm trong một ngày với $x = 25$.

Giải

a) Biểu diễn qua x :

Số sản phẩm phải sản xuất trong một ngày theo kế hoạch là:

$$\frac{10.000}{x} \text{ (sản phẩm)}$$

Vì công ty phải sản xuất 10.000 sản phẩm xong sớm 1 ngày và còn làm thêm được 80 sản phẩm. Vậy số sản phẩm thực tế đã làm được trong 1 ngày:

$$\frac{10.000}{x-1} + \frac{80}{x-1} = \frac{10.080}{x-1} \text{ (sản phẩm)}$$

Vậy số sản phẩm làm thêm trong một ngày là:

$$\frac{10.080}{x-1} - \frac{10.000}{x} \text{ (sản phẩm)}$$

b) Với $x = 25$ thì biểu thức $\frac{10.080}{x-1} - \frac{10.000}{x}$ có giá trị bằng:

$$\frac{10.080}{24} - \frac{10.000}{25} = 420 - 400 = 20 \text{ (sản phẩm)}$$

Đáp số: 20 (sản phẩm)

37. Đố. Cho phân thức $\frac{2x+1}{x^2-3}$. Đố em tìm được một phân thức mà khi lấy phân

thức đã cho trừ đi phân thức phải tìm ta được một phân thức bằng phân thức đối của phân thức đã cho.

Giải

Gọi A là phân thức phải tìm, theo đề bài ta có: $\frac{2x+1}{x^2-3} - A = \frac{2x+1}{x^2-3}$

$$\text{Suy ra } A = \frac{2x+1}{x^2-3} + \frac{2x+1}{x^2-3} = \frac{4x+2}{x^2-3}$$

Vậy phân thức phải tìm là phân thức $\frac{4x+2}{x^2-3}$.

§7. PHÉP NHÂN CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

- Quy tắc: Muốn nhân hai phân thức đại số ta nhân các tử thức với nhau, các mẫu thức với nhau rồi rút gọn phân thức vừa tìm được.

$$\frac{A}{B} \cdot \frac{C}{D} = \frac{A \cdot C}{B \cdot D}$$

- Các tính chất

a) Tính giao hoán: $\frac{A}{B} \cdot \frac{C}{D} = \frac{C}{D} \cdot \frac{A}{B}$

b) Tính kết hợp: $\left(\frac{A}{B} \cdot \frac{C}{D}\right) \cdot \frac{E}{F} = \frac{A}{B} \cdot \left(\frac{C}{D} \cdot \frac{E}{F}\right)$

- c) Phép nhân phân phối với phép cộng:

$$\frac{A}{B} \cdot \left(\frac{C}{D} + \frac{E}{F}\right) = \frac{A}{B} \cdot \frac{C}{D} + \frac{A}{B} \cdot \frac{E}{F}$$

II. BÀI TẬP

A. Bài tập mẫu

1. Thực hiện phép tính

$$a) \left(\frac{(x-13)^2}{2x^5} \right) : \left(\frac{3x^2}{x-13} \right) \qquad b) \frac{x^2+6x+9}{1-x} : \frac{(x-1)^2}{2(x-3)^2}$$

Giải

$$\begin{aligned} a) \left(\frac{(x-13)^2}{2x^5} \right) : \left(\frac{3x^2}{x-13} \right) &= \frac{(x-13)^2}{2x^5} \cdot \frac{(x-13)}{3x^2} = \frac{(x-13)^3}{2x^5(x-13)} \\ &= \frac{(x-13)(x-13)(x-13)}{2x^5(x-13)} = \frac{(x-13)(x-13)}{2x^5} = \frac{(x-13)^2}{2x^5} \\ b) \frac{x^2+6x+9}{1-x} : \frac{(x-1)^2}{2(x-3)^2} &= \frac{(x+3)^2}{1-x} \cdot \frac{2(x-3)^2}{(x-1)^2} = \frac{(x+3)^2(x-3)^2}{(1-x)(x-1)^2} = \frac{(x+3)^2}{2(x+3)} \end{aligned}$$

2. Tính nhanh

$$\frac{3x^5+5x^3+1}{x^4-7x^2+2} : \frac{x}{2x+3} \cdot \frac{x^4-7x^2+2}{3x^5+5x^3+1}$$

Giải

Áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp của phép nhân, ta có:

$$\begin{aligned} \frac{3x^5+5x^3+1}{x^4-7x^2+2} : \frac{x}{2x+3} \cdot \frac{x^4-7x^2+2}{3x^5+5x^3+1} &= \left(\frac{3x^5+5x^3+1}{x^4-7x^2+2} \cdot \frac{x^4-7x^2+2}{3x^5+5x^3+1} \right) : \frac{x}{2x+3} = \frac{x}{2x+3} \end{aligned}$$

B. Bài tập cơ bản

38. Thực hiện các phép tính sau

$$a) \frac{15x-2y^2}{7y^3-x^2} : \qquad b) \frac{4y^2}{11x^4} : \left(\frac{3x^2}{8y} \right) \qquad c) \frac{x^3-8}{5x+20} : \frac{x^2+4x}{x^2+2x+4}$$

Giải

$$\begin{aligned} a) \frac{15x-2y^2}{7y^3-x^2} : \frac{15x-2y^2}{7y^3-x^2} &= \frac{3x}{7xy} \\ b) \frac{4y^2}{11x^4} : \left(\frac{3x^2}{8y} \right) &= \frac{4y^2}{11x^4} \cdot \frac{8y}{3x^2} = \frac{32y^3}{33x^6} \\ c) \frac{x^3-8}{5x+20} : \frac{x^2+4x}{x^2+2x+4} &= \frac{(x^3-2^3)(x^2+4x)}{(5x+20)(x^2+2x+4)} \\ &= \frac{(x-2)(x^2+2x+4) \cdot x(x+4)}{(5x+4)(x^2+2x+4)} = \frac{x(x-2)}{5x+4} \end{aligned}$$

39. Thực hiện các phép tính sau (chú ý về dấu):

$$a) \frac{5x+10}{4x-8} \cdot \frac{4-2x}{x+2};$$

$$b) \frac{x^2-36}{2x+10} \cdot \frac{3}{6-x}$$

Giải

$$a) \frac{5x+10}{4x-8} \cdot \frac{4-2x}{x+2} = \frac{(5x+10)(4-2x)}{(4x-8)(x+2)} = \frac{5(x+2)(4-2x)}{-2(4-2x)(x+2)} = -\frac{5}{2}$$

$$\begin{aligned} b) \frac{x^2-36}{2x+10} \cdot \frac{3}{6-x} &= \frac{(x^2-36) \cdot 3}{(2x+10)(6-x)} \\ &= \frac{3(x+6)(x-6)}{(2x+10)(-x-6)} = \frac{3(x+6)(x-6)}{-2(x+5)(x+6)} = \frac{-3(x-6)}{2(x+5)} \end{aligned}$$

40. Rút gọn biểu thức sau theo hai cách (sử dụng và không sử dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng):

$$\frac{x-1}{x} \cdot \left(x^2 + x + 1 + \frac{x^3}{x-1} \right)$$

Giải

* Cách 1: Rút gọn trực tiếp

$$\begin{aligned} \text{Ta có: } \frac{x-1}{x} \cdot \left(x^2 + x + 1 + \frac{x^3}{x-1} \right) &= \frac{x-1}{x} \cdot \left[\frac{(x^2+x+1)(x-1)+x^3}{x-1} \right] \\ &= \frac{x-1}{x} \cdot \frac{2x^3-1}{x-1} = \frac{2x^3-1}{x} \end{aligned}$$

* Cách 2: Áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng, ta có:

$$\begin{aligned} \frac{x-1}{x} \cdot \left(x^2 + x + 1 + \frac{x^3}{x-1} \right) &= \frac{x-1}{x} \cdot x^2 + \frac{x-1}{x} \cdot x + \frac{x-1}{x} + \frac{x^3(x-1)}{x(x-1)} \\ &= x(x-1) + x-1 + \frac{x-1}{x} + x^2 = \frac{x^2(x-1) + x(x-1) + x-1 + x^3}{x} \\ &= \frac{x^3 - x^2 + x^2 - x + x - 1 + x^3}{x} = \frac{2x^3-1}{x} \end{aligned}$$

Nhận xét: Dù hai cách tính khác nhau, nhưng kết quả đúng bao giờ cũng giống nhau.

41. Để dễ am hiểu được vào chỗ trống của dãy phép nhân dưới đây thường phân thức có mẫu thức bằng tử thức cộng với 1:

$$\frac{1}{x} \cdot \frac{x}{x+1} \cdot \dots\dots\dots = \frac{1}{x+7}$$

Giải

Ta có thể diễn tiếp tục chia một phân thức thỏa mãn điều kiện trên để tích bằng $\frac{1}{x+7}$

$$\text{Ta có } \frac{1}{x} : \frac{x}{x+1} : \frac{x+1}{x+2} : \frac{x+2}{x+3} : \frac{x+3}{x+4} : \frac{x+4}{x+5} : \frac{x+5}{x+6} : \frac{x+6}{x+7} = \frac{1}{x+7}$$

§8. PHÉP CHIA PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. **Phân thức nghịch đảo** Hai phân thức được gọi là nghịch đảo nhau nếu tích của chúng bằng 1.

Cụ thể Cho $\frac{A}{B}$ là phân thức đại số $\neq 0$ thì

- $\frac{B}{A}$ là phân thức nghịch đảo của phân thức $\frac{A}{B}$
- $\frac{A}{B}$ là phân thức nghịch đảo của phân thức $\frac{B}{A}$

2. **Phép chia các phân thức đại số**

Quy tắc: Muốn chia phân thức $\frac{A}{B}$ cho phân thức $\frac{C}{D}$ khác 0, bằng cách ta nhân $\frac{A}{B}$ với phân thức nghịch đảo của $\frac{C}{D}$.

Tổng quát: $\frac{A}{B} : \frac{C}{D} = \frac{A}{B} \cdot \frac{D}{C}$ (với $\frac{C}{D} \neq 0$)

3. **Chú ý** Khi có một dãy các phép chia (hoặc phép nhân và phép chia) thì ta phải thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải hoặc đổi phép chia thành phép nhân với phân số nghịch đảo.

$$\text{Ví dụ: } \frac{4x^2}{5y^2} : \frac{6x}{5y} : \frac{2x}{3y} = \left(\frac{4x^2}{5y^2} : \frac{6x}{5y} \right) : \frac{2x}{3y} = \left(\frac{4x^2}{5y^2} \cdot \frac{5y}{6x} \right) : \frac{2x}{3y} = \frac{2x}{3y} : \frac{2x}{3y} = 1$$

$$\text{hoặc: } \frac{4x^2}{5y^2} : \frac{6x}{5y} : \frac{2x}{3y} = \frac{4x^2}{5y^2} \cdot \frac{5y}{6x} \cdot \frac{3y}{2x} = 1$$

II. BÀI TẬP

A. Bài tập mẫu

1. Tìm phân thức nghịch đảo của mỗi phân thức sau:

a) $-\frac{3y^2}{2x}$;

b) $\frac{x^2 + x - 6}{2x + 1}$;

c) $\frac{1}{x - 2}$;

d) $3x + 2$.

Giải

a) Phân thức nghịch đảo của phân thức $-\frac{3y^2}{2x}$ là phân thức $-\frac{2x}{3y^2}$ vì:

$$\left(-\frac{3y^2}{2x}\right) \cdot \left(-\frac{2x}{3y^2}\right) = 1$$

b) Phân thức nghịch đảo của phân thức $\frac{x^2 + x - 6}{2x + 1}$ là phân thức

$$\frac{2x + 1}{x^2 + x - 6} \quad \text{vì:} \quad \left(\frac{x^2 + x - 6}{2x + 1}\right) \cdot \left(\frac{2x + 1}{x^2 + x - 6}\right) = 1$$

c) Phân thức nghịch đảo của phân thức $\frac{1}{x - 2}$ là phân thức $x - 2$ vì:

$$\frac{1}{x - 2} \cdot (x - 2) = 1$$

d) Phân thức nghịch đảo của phân thức $3x + 2$ là phân thức $\frac{1}{3x + 2}$ vì:

$$(3x + 2) \cdot \frac{1}{3x + 2} = 1.$$

2. Tính: a) $\frac{24x^3}{5y^2x^4} \cdot \frac{8x^2}{15y^3x^2}$;

b) $\frac{x^2 - 25}{x^2 - 3x} \cdot \frac{x^2 + 5x}{x^2 - 9}$

Giải

$$\text{a) } \frac{24x^3}{5y^2x^4} \cdot \frac{8x^2}{15y^3x^2} = \frac{24x^3}{5y^2x^4} \cdot \frac{15y^3x^2}{8x^2} = \frac{9xy}{x^2}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } \frac{x^2 - 25}{x^2 - 3x} \cdot \frac{x^2 + 5x}{x^2 - 9} &= \frac{(x^2 - 25)(x^2 + 5x)}{(x^2 - 3x)(x^2 - 9)} \\ &= \frac{(x + 5)(x - 5)(x + 5)x}{x(x - 3)(x + 3)(x + 3)} = \frac{(x + 5)(x - 5)}{x^2} \end{aligned}$$

B. Bài tập căn bản

42. Tính tích chia phân thức

$$a) \left(\frac{20x}{3y^2} \right) : \left(\frac{4x^3}{5y} \right)$$

$$b) \frac{4x + 12}{(x + 4)^2} : \frac{3(x + 3)}{x + 4}$$

Giải

$$a) \left(\frac{20x}{3y^2} \right) : \left(\frac{4x^3}{5y} \right) = \left(\frac{20x}{3y^2} \right) \cdot \frac{5y}{4x^3} = \frac{20x \cdot 5y}{3x^3 \cdot 4y^2} = \frac{25}{3x^2y}$$

$$b) \frac{4x + 12}{(x + 4)^2} : \frac{3(x + 3)}{x + 4} = \frac{4x + 12}{(x + 4)^2} \cdot \frac{x + 4}{3(x + 3)} = \frac{4(x + 3)(x + 4)}{(x + 4)^2 \cdot 3(x + 3)} = \frac{4}{3(x + 4)}$$

43. Thực hiện các phép tính sau

$$a) \frac{5x - 10}{x^2 + 7} : (2x - 4)$$

$$b) (x^2 - 25) : \frac{2x + 10}{3x - 7}$$

$$c) \frac{x^2 + x}{5x^2 - 10x + 5} : \frac{3x + 3}{5x - 5}$$

Giải

$$\begin{aligned} a) \frac{5x - 10}{x^2 + 7} : (2x - 4) &= \frac{5x - 10}{x^2 + 7} \cdot \frac{1}{2x - 4} \\ &= \frac{(5x - 10) \cdot 1}{(x^2 + 7)(2x - 4)} = \frac{5(x - 2)}{(x^2 + 7) \cdot 2(x - 2)} = \frac{5}{2(x^2 + 7)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b) (x^2 - 25) : \frac{2x + 10}{3x - 7} &= (x^2 - 25) \cdot \frac{3x - 7}{2x + 10} \\ &= \frac{(x + 5)(x - 5)(3x - 7)}{2(x + 5)} = \frac{(x - 5)(3x - 7)}{2} = \frac{3x^2 - 22x + 35}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} c) \frac{x^2 + x}{5x^2 - 10x + 5} : \frac{3x + 3}{5x - 5} &= \frac{x(x + 1)}{5(x^2 - 2x + 1)} \cdot \frac{5(x - 1)}{3(x + 1)} \\ &= \frac{5x(x + 1)(x - 1)}{5(x - 1)^2 \cdot 3(x + 1)} = \frac{x}{3(x - 1)} \end{aligned}$$

44. Tìm biểu thức Q, biết rằng: $\frac{x^2 + 2x}{x - 1} : Q = \frac{x^2 - 4}{x^2 - x}$

Giải

$$\Rightarrow \text{có } \frac{x^2 + 2x}{x - 1} : Q = \frac{x^2 - 4}{x^2 - x}$$

$$\Rightarrow Q = \frac{x^2 - 4}{x^2 - x} \cdot \frac{x^2 + 2x}{x - 1} = \frac{(x + 2)(x - 2)}{x(x - 1)} \cdot \frac{x(x + 2)}{x(x - 1)} = \frac{(x + 2)(x - 2)(x + 2)}{x^2(x - 1)(x - 1)} = \frac{x + 2}{x}$$

$$\text{Vậy } Q = \frac{x + 2}{x}.$$

45. **Đố.** Đố em điền được vào chỗ trống của dãy phép chia dưới đây những phân thức có tử thức bằng mẫu thức cộng với 1.

$$\frac{x}{x+1} : \frac{x+2}{x+1} ; \frac{x+3}{x+2} ; \dots\dots\dots = \frac{x}{x+6}$$

Em hãy ra cho bạn một câu đố tương tự, với vế phải của đẳng thức là $\frac{x}{x+n}$, trong đó n và là số tự nhiên lớn hơn 1 tùy ý mà em thích.

Giải

Ta có thể điền tiếp vào chỗ một số phân thức thỏa mãn để bài đố phép chia bằng phân thức $\frac{x}{x+6}$

$$\text{Ta có: } \frac{x}{x+1} : \frac{x+2}{x+1} : \frac{x+3}{x+2} : \frac{x+4}{x+3} : \frac{x+5}{x+4} : \frac{x+6}{x+5} = \frac{x}{x+6}$$

* Chứng minh: Vận dụng quy tắc được ghi trong phần kiến thức cơ bản

$$\begin{aligned} \text{Ta có: } \frac{x}{x+1} : \frac{x+2}{x+1} : \frac{x+3}{x+2} : \frac{x+4}{x+3} : \frac{x+5}{x+4} : \frac{x+6}{x+5} \\ = \frac{x}{x+1} \cdot \frac{x+1}{x+2} \cdot \frac{x+2}{x+3} \cdot \frac{x+3}{x+4} \cdot \frac{x+4}{x+5} \cdot \frac{x+5}{x+6} = \frac{x}{x+6} \end{aligned}$$

* Câu đố cho bạn em hãy tự ra.

§9. BIẾN ĐỔI CÁC BIỂU THỨC HỮU TỈ. GIÁ TRỊ CỦA PHÂN THỨC

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. Biểu thức hữu tỉ

- Một biểu thức chỉ chứa các phép toán cộng, trừ, nhân, chia và chứa biến ở mẫu được gọi là biểu thức phân.
- Một đa thức còn được gọi là biểu thức nguyên.
- Các biểu thức nguyên và các biểu thức phân có một tên chung là biểu thức hữu tỉ.

2. Giá trị của phân thức: Giá trị của một phân thức chỉ được xác định với điều kiện giá trị của mẫu thức khác 0.

II. BÀI TẬP

A. Bài tập mẫu

1. Biến đổi biểu thức sau thành phân thức $A = \frac{1 + \frac{x^2}{x-1}}{1 + \frac{2x}{x^2+1}}$, $B = \frac{1 + \frac{x-1}{x^2-2}}{1 + \frac{x^2-2}{x^2+1}}$

Lời giải

$$\begin{aligned} \text{Ta có: } A &= \frac{1 + \frac{x^2}{x-1}}{1 + \frac{2x}{x^2+1}} = \frac{\frac{x-1+x^2}{x-1}}{\frac{x^2+1+2x}{x^2+1}} = \frac{\frac{x-1}{x^2+1}}{\frac{(x+1)^2}{x^2+1}} \\ &= \frac{x-1}{x-1} \cdot \frac{x^2+1}{(x+1)^2} = \frac{(x-1)(x^2+1)}{(x-1)(x+1)^2} = \frac{x^2+1}{(x+1)(x+1)} = \frac{x^2+1}{x^2+1} \\ B &= \frac{1 + \frac{x-1}{x^2-2}}{1 + \frac{x^2-2}{x^2+1}} = \frac{\frac{x-1+x^2-2}{x^2-2}}{\frac{x^2+1+x^2-2}{x^2+1}} = \frac{\frac{x-1}{x^2-1}}{\frac{1}{x^2+1}} = \frac{x-1}{x+1} \cdot \frac{x^2+1}{1} \\ &= \frac{(x-1)(x+1)(x+1)}{x+1} = (x-1)^2 \end{aligned}$$

2. Cho biểu thức: $\frac{x+1}{x^2-x} - \frac{x+3}{x^2-1}$

- a) Tìm điều kiện của x để giá trị của phân thức được xác định.
b) Tính giá trị của biểu thức với $x = -0,33$.

Lời giải

$$\text{Ta có } \left. \begin{aligned} x^2 - x &= x(x-1) \\ x^2 - 1 &= (x-1)(x+1) \end{aligned} \right\} \Rightarrow \text{MTC} = x(x-1)(x+1)$$

$$\begin{aligned} \text{Khi đó: } \frac{x+1}{x^2-x} - \frac{x+3}{x^2-1} &= \frac{(x+1)(x+1)}{x(x-1)(x+1)} - \frac{x(x+3)}{x(x-1)(x+1)} \\ &= \frac{x^2+2x+1-x^2-3x}{x(x+1)(x-1)} = \frac{-x+1}{x(x+1)(x-1)} = \frac{-(x-1)}{x(x+1)(x-1)} \end{aligned}$$

- a) Để phân thức được xác định thì

$$x(x+1)(x-1) \neq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x \neq 0 \\ x+1 \neq 0 \\ x-1 \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \neq 0 \\ x \neq -1 \\ x \neq 1 \end{cases}$$

Vậy để phân thức được xác định thì $x \neq 0$ và $x \neq \pm 1$

b) Với $x = -0,33$

$$\begin{aligned} \text{Ta có: } \frac{x+1}{x^2-x} - \frac{x+3}{x^2-1} &= \frac{-(x-1)}{x(x+1)(x-1)} = \frac{1}{x(x+1)} \\ &= \frac{-1}{-0,33(-0,33+1)} = \frac{-1}{-0,33 \cdot 0,67} = \frac{1}{0,2211} \end{aligned}$$

B. Bài tập căn bản

46. Biến đổi mỗi biểu thức sau thành một phân thức đại số:

a) $\frac{1+\frac{1}{x}}{1-\frac{1}{x}}$

b) $\frac{1-\frac{2}{x}}{1-\frac{x+1}{x^2-1}}$

Giải

a) $\frac{1+\frac{1}{x}}{1-\frac{1}{x}} = \frac{\frac{x+1}{x}}{\frac{x-1}{x}} = \frac{x+1}{x} \cdot \frac{x}{x-1} = \frac{x+1}{x-1}$

b) Xem bài tập mẫu 1B.

47. Với giá trị nào của x thì giá trị của mỗi phân thức sau được xác định?

a) $\frac{5x}{2x+4}$

b) $\frac{x-1}{x^2-1}$

Giải

a) Phân thức $\frac{5x}{2x+4}$ được xác định khi: $2x+4 \neq 0 \Leftrightarrow 2x \neq -4 \Leftrightarrow x \neq -2$

b) Phân thức $\frac{x-1}{x^2-1}$ được xác định khi:

$$x^2-1 \neq 0 \Leftrightarrow (x+1)(x-1) \neq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x+1 \neq 0 \\ x-1 \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \neq -1 \\ x \neq 1 \end{cases}$$

Vậy phân thức $\frac{x-1}{x^2-1}$ được xác định khi $x \neq \pm 1$.

48. Cho phân thức $\frac{x^2+4x+4}{x+2}$

a) Với điều kiện nào của x thì giá trị của phân thức được xác định?

b) Rút gọn phân thức.

c) Tìm giá trị của x để giá trị của phân thức bằng 1.

d) Có giá trị nào của x để giá trị của phân thức bằng 0 hay không?

Lưu ý

a) Phân thức được xác định khi $x + 2 \neq 0 \Leftrightarrow x \neq -2$

b) Rút gọn phân thức $\frac{x^2 + 4x + 4}{x + 2} = \frac{(x + 2)^2}{x + 2} = x + 2$ (với $x \neq -2$)

c) Phân thức $\frac{x^2 + 4x + 4}{x + 2} = x + 2$ có giá trị bằng 1 hay $x + 2$ có giá trị bằng 1 có nghĩa là $x + 2 = 1$, khi đó $x + 2 = 1 \Leftrightarrow x = -1$

Vậy khi $x = -1$ thì giá trị của phân thức bằng 1, theo mẫu $x \neq -2$

d) Phân thức có giá trị bằng 0 nghĩa là $x + 2 = 0 \Leftrightarrow x = -2$ (không thỏa mãn điều kiện $x \neq -2$)

Vậy không có giá trị nào của x để giá trị phân thức bằng 0

49. Định nghĩa Đồ em tìm được một phân thức (của một biến x) mà giá trị của nó được xác định với mọi giá trị của x khác các ước của 2

Lưu ý

Ta có $U(2) = 1; -1; +2$

Ta có thể tìm được nhiều phân thức thỏa mãn đề bài

Vì đây
$$\frac{1}{(x^2 - 1)(x + 2)(x - 2)} = \frac{x - 5}{(x^2 - 1)(x + 2)(x - 2)}$$

Luyện tập

50. Thực hiện phép tính.

$$a) \left(\frac{x}{x+1} + 1 \right) \cdot \left(1 - \frac{3x^2}{1-x^2} \right).$$

$$b) (x^2 - 1) \left(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1} - 1 \right)$$

Lưu ý

$$\begin{aligned} a) \left(\frac{x}{x+1} + 1 \right) \cdot \left(1 - \frac{3x^2}{1-x^2} \right) &= \frac{x + x + 1}{x + 1} \cdot \frac{1 - x^2 - 3x^2}{1 - x^2} \\ &= \frac{2x + 1}{x + 1} \cdot \frac{1 - 4x^2}{1 - 4x^2} = \frac{(2x + 1)(1 - 4x^2)}{(x + 1)(1 - 4x^2)} = \frac{1 - 4x^2}{1 - 4x^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b) (x^2 - 1) \left(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1} - 1 \right) &= (x^2 - 1) \left(\frac{(x+1) - (x-1) - (x-1)(x+1)}{(x-1)(x+1)} \right) \\ &= (x^2 - 1) \left(\frac{3 - x^2}{(x-1)(x+1)} \right) = 3 - x^2 \end{aligned}$$

51. Làm các phép tính sau:

$$a) \left(\frac{x^2}{y^2} + \frac{y}{x} \right) : \left(\frac{x}{y^2} - \frac{1}{y} + \frac{1}{x} \right); \quad b) \left(\frac{1}{x^2 + 4x + 4} - \frac{1}{x^2 - 4x + 4} \right) \cdot \left(\frac{1}{x+2} + \frac{1}{x-2} \right)$$

Giải

$$\begin{aligned} a) \left(\frac{x^2}{y^2} + \frac{y}{x} \right) : \left(\frac{x}{y^2} - \frac{1}{y} + \frac{1}{x} \right) &= \frac{x^3 + y^3}{xy^2} : \frac{x^3 - xy + y^3}{xy^2} = \frac{x^3 + y^3}{xy^2} \cdot \frac{xy^2}{x^3 - xy + y^3} \\ &= \frac{(x^3 + y^3) \cdot xy^2}{xy^2(x^3 - xy + y^3)} = \frac{(x + y)(x^2 - xy + y^2) \cdot xy^2}{xy^2(x^3 - xy + y^3)} = x + y \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b) &\left(\frac{1}{x^2 + 4x + 4} - \frac{1}{x^2 - 4x + 4} \right) \cdot \left(\frac{1}{x+2} + \frac{1}{x-2} \right) \\ &= \left[\frac{1}{(x+2)^2} - \frac{1}{(x-2)^2} \right] : \left[\frac{x-2+x+2}{(x+2)(x-2)} \right] \\ &= \left[\frac{(x-2)^2 - (x+2)^2}{(x+2)^2(x-2)^2} \right] : \left[\frac{2x}{(x+2)(x-2)} \right] = \frac{-8x}{(x+2)^2(x-2)^2} \cdot \frac{(x+2)(x-2)}{2x} \\ &= \frac{-4}{(x+2)(x-2)} \quad (\text{điều kiện } x \neq 0; x \neq \pm 2) \\ &= \frac{-4}{x^2 - 4} \end{aligned}$$

52. Chứng tỏ rằng với $x \neq 0$ và $x \neq \pm a$ (a là một số nguyên), giá trị của biểu

thức: $\left(a - \frac{x^2 + a^2}{x + a} \right) \cdot \left(\frac{2a}{x} - \frac{4a}{x - a} \right)$ là một số chẵn.

Giải

$$\begin{aligned} \text{Ta có } \left(a - \frac{x^2 + a^2}{x + a} \right) \cdot \left(\frac{2a}{x} - \frac{4a}{x - a} \right) &= \left(\frac{ax + a^2 - x^2 - a^2}{x + a} \right) \cdot \left[\frac{2a(x - a) - 4ax}{x(x - a)} \right] \\ &= \left(\frac{ax - x^2}{x + a} \right) \cdot \left[\frac{-2a(x + a)}{x(x - a)} \right] = \left[\frac{x(a - x)}{x + a} \right] \cdot \left[\frac{-2a(x + a)}{-x(a - x)} \right] \\ &= \frac{x(a - x) \cdot 2a(x + a)}{(x + a) \cdot x(a - x)} = 2a \quad (\text{điều kiện: } x \neq 0; x \neq \pm a) \end{aligned}$$

Với a là một số nguyên thì $2a$ luôn là một số chẵn (đpcm)

53. a) Biến đổi mỗi biểu thức sau thành một phân thức đại số:

$$1 + \frac{1}{x};$$

$$1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{x}};$$

$$1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{x}}};$$



hành phân thức đại số và kiểm tra lại dự đoán.

Giải

$$a) \quad 1 + \frac{1}{x} = \frac{x+1}{x}$$

Hướng dẫn: Ta thực hiện phép biến đổi từ dưới lên.

$$1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{x}} = 1 + \frac{1}{\frac{x+1}{x}} = 1 + \frac{x}{x+1} = \frac{x+1+x}{x+1} = \frac{2x+1}{x+1}$$

$$\begin{aligned} 1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{x}}} &= 1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{\frac{x+1}{x}}} = 1 + \frac{1}{1 + \frac{x}{x+1}} = 1 + \frac{1}{\frac{x+1+x}{x+1}} \\ &= 1 + \frac{1}{\frac{2x+1}{x+1}} = 1 + \frac{x+1}{2x+1} = \frac{2x+1+x+1}{2x+1} = \frac{3x+2}{2x+1} \end{aligned}$$

b) Nhận xét: Biểu thức đã cho có dạng tương tự như các biểu thức đã cho ở trên. Do đó ta có thể dự đoán như sau:

– Qủa kết quả trên, ta thấy kết quả tiếp theo sau là một phân thức mà tử thức bằng tổng của tử và mẫu thức là tử của kết quả kể trước nó.

Như vậy, có thể dự đoán rằng nếu biểu thức có bốn gạch phân số thì kết quả là $\frac{5x+3}{3x+2}$ và trong trường hợp này có năm gạch phân số.

Vậy kết quả sẽ là $\frac{8x+5}{5x+3}$

54. Tìm các giá trị của x để giá trị của các phân thức sau được xác định:

$$a) \quad \frac{3x+2}{x^2-6x};$$

$$b) \quad \frac{5}{x^2-3}$$

Giải

a) Phân thức: $\frac{3x+2}{x^2-6x}$ được xác định khi:

$$x^2 - 6x \neq 0 \Leftrightarrow 2x(x-3) \neq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 2x \neq 0 \\ x-3 \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \neq 0 \\ x \neq 3 \end{cases}$$

b) Phân thức $\frac{x}{x^2 - 3}$ xác định khi:

$$x^2 - 3 \neq 0 \Leftrightarrow x^2 - \left(\sqrt{3}\right)^2 \neq 0 \Leftrightarrow (x - \sqrt{3})(x + \sqrt{3}) \neq 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x - \sqrt{3} \neq 0 \\ x + \sqrt{3} \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \neq \sqrt{3} \\ x \neq -\sqrt{3} \end{cases}$$

55. Cho phân thức $\frac{x^2 + 2x + 1}{x^2 - 1}$

- a) Với giá trị nào của x thì giá trị của phân thức được xác định?
 b) Chứng tỏ phân thức rút gọn của phân thức đã cho là $\frac{x+1}{x-1}$.
 c) Để tính giá trị của phân thức đã cho tại $x = 2$ và tại $x = -1$, bạn Thống đã làm như sau:

- Với $x = 2$, phân thức đã cho có giá trị là $\frac{2+1}{2-1} = 3$;
- Với $x = -1$, phân thức đã cho có giá trị là $\frac{-1+1}{-1-1} = 0$.

Em có đồng ý không? Nếu không, em hãy chỉ ra chỗ mà em cho là sai.
 Theo em, với những giá trị nào của biến thì có thể tính được giá trị của phân thức đã cho bằng cách tính giá trị của phân thức rút gọn?

Giải

a) Phân thức $\frac{x^2 + 2x + 1}{x^2 - 1}$ được xác định khi:

$$x^2 - 1 \neq 0 \Leftrightarrow (x - 1)(x + 1) \neq 0 \Leftrightarrow x \neq \pm 1.$$

b) Khi đó: $\frac{x^2 + 2x + 1}{x^2 - 1} = \frac{(x + 1)^2}{(x + 1)(x - 1)} = \frac{x + 1}{x - 1}$

- c) Với $x = 2$ thì phân thức đã cho được xác định. Bạn Thống có thể thay vào biểu thức thu gọn để tính và kết quả bằng 3 là đúng.
 Với $x = -1$ làm cho phân thức đã cho không được xác định (không có nghĩa). Bạn Thống không thể tính được giá trị của biểu thức đã cho với $x = -1$.

Tóm lại, với mọi giá trị của $x \in \mathbb{R} \setminus \{\pm 1\}$ thì ta có thể tính giá trị của biểu thức đã cho bằng cách tính giá trị của biểu thức thu gọn.

56. Cho phân thức $\frac{3x^2 + 6x + 12}{x^3 - 8}$

- a) Với điều kiện nào của x thì giá trị của phân thức được xác định?
 b) Rút gọn phân thức.

- d) Em có biết trên toàn thế giới đã có bao nhiêu con vi khuẩn không? Tính giá trị của biểu thức dưới đây để biết 4001 em sẽ tìm được câu trả lời thật đáng ngạc nhiên trong tổng số đó chỉ có 2000 là vi khuẩn có hại)

Giải

- a) Phân thức $\frac{3x^2 + 6x + 12}{x^2 + 8}$ được xác định khi

$$\begin{aligned}x^2 + 8 > 0 & \Leftrightarrow x^2 - 2x + 0 > -4x - 2 + 2x^2 + 2x + 4 > 0 \\& \Leftrightarrow -4x - 2 > -2x^2 - 2x - 2 \Leftrightarrow x > 2\end{aligned}$$

$$\text{Với } x^2 + 2x + 4 < 0 \Leftrightarrow x^2 + 2x + 1 + 3 = (x + 1)^2 + 3 > 0$$

Vậy phân thức xác định khi $x > 2$

$$\text{b) Khi đó } \frac{3x^2 + 6x + 12}{x^2 + 8} = \frac{3x^2 + 2x + 1}{x^2 + 2x + 1} = \frac{3}{x + 2}$$

- c) Với $x = \frac{4001}{2000}$ ($x > 2$) nên phân thức đã cho được xác định khi đó phân

$$\text{thức đã cho có giá trị là } \frac{3}{\frac{4001}{2000}} = \frac{3}{\frac{4001}{2000}} = \frac{3 \cdot 2000}{4001} = 6000$$

Vậy trên toàn thế giới đã có 6000 con vi khuẩn

ÔN TẬP CHƯƠNG II

Bảng tóm tắt

I. Khái niệm về phân thức đại số và tính chất của phân thức đại số

1. Phân thức đại số là biểu thức có dạng $\frac{A}{B}$, với A, B là những đa thức và B khác đa thức 0.
2. Hai phân thức bằng nhau: $\frac{A}{B} = \frac{C}{D}$ nếu $AD = BC$.
3. Tính chất cơ bản của phân thức: Nếu $M \neq 0$ thì $\frac{A}{B} = \frac{AM}{BM}$.

II. Các phép toán trên tập hợp các phân thức đại số

1. Phép cộng

- a) Cộng hai phân thức cùng mẫu thức $\frac{A}{M}, \frac{B}{M} = \frac{A + B}{M}$

b) Cộng hai phân thức khác mẫu thức:

– Quy đồng mẫu thức.

– Cộng hai phân thức cùng mẫu thức vừa tìm được.

2. Phép trừ

a) Phân thức đối của $\frac{A}{B}$ kí hiệu bởi $-\frac{A}{B}$, $-\frac{A}{B} = \frac{A}{-B} = \frac{-A}{B}$.

b) $\frac{A}{B} - \frac{C}{D} = \frac{A}{B} + (-\frac{C}{D})$

3. Phép nhân: $\frac{A}{B} \cdot \frac{C}{D} = \frac{AC}{BD}$

4. Phép chia

a) Phân thức nghịch đảo của phân thức $\frac{A}{B}$ khác 0 là $\frac{B}{A}$.

b) $\frac{A}{B} : \frac{C}{D} = \frac{A}{B} \cdot \frac{D}{C}$

Luyện tập

57. Chứng tỏ mỗi cặp phân thức sau bằng nhau:

a) $\frac{3}{2x-3}$ và $\frac{3x+6}{2x^2+x-6}$;

b) $\frac{2}{x+4}$ và $\frac{2x^2-6x}{x^3+7x^2+12x}$.

Giải

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad \frac{3x+6}{2x^2+x-6} &= \frac{3x+6}{2x^2-8+x+2} = \frac{3(x+2)}{2(x^2-4)+(x+2)} \\ &= \frac{3(x+2)}{2(x+2)(x-2)+(x+2)} = \frac{3(x+2)}{(x+2)(2(x-2)+1)} \\ &= \frac{3(x+2)}{(x+2)(2x-3)} = \frac{3}{2x-3} \quad (\text{điều kiện: } x \neq -2 \text{ và } x \neq \frac{3}{2}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b)} \quad \frac{2x^2+6x}{x^3+7x^2+12x} &= \frac{2x(x+3)}{x(x^2+7x+12)} \\ &= \frac{2x(x+3)}{x(x^2+3x)+(4x+12)} = \frac{2x(x+3)}{x[x(x+3)+4(x+3)]} \\ &= \frac{2x(x+3)}{x(x+3)(x+4)} = \frac{2}{x+4} \quad (\text{điều kiện: } x \neq 0, x \neq -4 \text{ và } x \neq -3) \end{aligned}$$

58. Thực hiện các phép tính sau:

a) $\left(\frac{2x+1}{2x-1} - \frac{2x-1}{2x+1} \right) : \frac{4x}{10x-5}$;

b) $\left(\frac{1}{x^2+x} - \frac{2-x}{x+1} \right) : \left(\frac{1}{x} + x - 2 \right)$

$$b) \left(\frac{1}{x-1} - \frac{x^2-1}{x^2+1} \right) : \left(\frac{1}{2x-1} + \frac{1}{x^2} \right)$$

Giải

Chúng ta thực hiện phép tính trong ngoặc trước

$$\begin{aligned} a) \left(\frac{2x-1}{2x-1} - \frac{2x-1}{2x+1} - \frac{4x}{10x-5} \right) : \left(\frac{(2x-1)^2}{(2x-1)(2x+1)} + \frac{4x}{5(2x-1)} \right) &= \frac{4x}{5(2x-1)} \\ &= \left(\frac{(2x-1) - 2x - 1 + 2x + 1 - 2x + 1}{(2x-1)(2x+1)} \right) : \frac{4x}{5(2x-1)} \\ &= \frac{8x}{(2x-1)(2x+1)} : \frac{4x}{5(2x-1)} \\ &= \frac{8x}{(2x-1)(2x+1)} \cdot \frac{5(2x-1)}{4x} = \frac{10}{2x+1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b) \left(\frac{1}{x^2+x} - \frac{2}{x+1} \right) : \left(\frac{1}{x} + x - \frac{2}{x} \right) &= \left(\frac{1}{x(x+1)} - \frac{2}{x+1} \right) : \left(\frac{1}{x} + x - \frac{2}{x} \right) \\ &= \left(\frac{1-x(2-x)}{x(x+1)} \right) : \left(\frac{1+x^2-2x}{x} \right) = \left(\frac{x^2-2x+1}{x(x+1)} \right) : \left(\frac{x^2-2x+1}{x} \right) \\ &= \frac{(x-1)^2}{x(x+1)} : \frac{x}{(x-1)^2} = \frac{1}{x+1} \quad (\text{điều kiện: } x \neq 0, x \neq -1 \text{ và } x \neq 1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} c) \frac{1}{x-1} - \frac{x^3-x}{x^2+1} : \left(\frac{1}{x^2-2x+1} + \frac{1}{1-x^2} \right) &= \frac{1}{x-1} - \frac{x(x^2-1)}{x^2+1} : \left(\frac{1}{(x-1)^2} - \frac{1}{x^2-1} \right) \\ &= \frac{1}{x-1} - \frac{x(x+1)(x-1)}{x^2+1} : \left(\frac{(x+1)-(x-1)}{(x-1)^2(x+1)} \right) \\ &= \frac{1}{x-1} - \frac{x}{x^2+1} : \frac{2}{(x-1)^2(x+1)} \\ &= \frac{x^2+1-2x}{(x-1)(x^2+1)} = \frac{(x-1)^2}{(x-1)(x^2+1)} = \frac{x-1}{x^2+1} \end{aligned}$$

59 a) Cho biểu thức $\frac{xP}{x+P} - \frac{yP}{y+P}$. Thay $P = \frac{xy}{x-y}$ vào biểu thức đã cho rồi rút gọn biểu thức.

b) Cho biểu thức $\frac{P^2Q^2}{P^2-Q^2}$. Thay $P = \frac{2xy}{x^2-y^2}$ và $Q = \frac{2xy}{x^2+y^2}$ vào biểu thức đã cho rồi rút gọn biểu thức.

Giải

a) Thay $P = \frac{xy}{x-y}$ vào biểu thức ta được:

$$\begin{aligned}
 x^2P - y^2Q &= x \cdot \frac{xy}{x^2 - y^2} - y \cdot \frac{xy}{x^2 - y^2} = \frac{x^2y}{x^2 - y^2} - \frac{xy^2}{x^2 - y^2} \\
 &= \frac{x^2y - xy^2}{x^2 - y^2} = \frac{xy(x - y)}{x^2 - y^2} = \frac{xy(x - y)}{(x - y)(x + y)} = \frac{xy}{x + y} \\
 &= \frac{x^2y}{x + y} - \frac{xy^2}{x + y} = \frac{x^2y(x - y)}{x^2(x - y)} - \frac{xy^2(x - y)}{y^2(x - y)} = y - x
 \end{aligned}$$

b) Thay $P = \frac{2xy}{x^2 - y^2}$, $Q = \frac{2xy}{x^2 + y^2}$ vào biểu thức, ta được:

$$\frac{P^2 - Q^2}{P^2 + Q^2} = \frac{\left(\frac{2xy}{x^2 - y^2}\right)^2 - \left(\frac{2xy}{x^2 + y^2}\right)^2}{\left(\frac{2xy}{x^2 - y^2}\right)^2 + \left(\frac{2xy}{x^2 + y^2}\right)^2} \quad (1)$$

$$\begin{aligned}
 \text{Từ thức: } \left(\frac{2xy}{x^2 - y^2}\right)^2 - \left(\frac{2xy}{x^2 + y^2}\right)^2 &= \left(\frac{2xy}{x^2 - y^2} - \frac{2xy}{x^2 + y^2}\right)^2 \\
 &= \frac{(4x^2y^2/x^2 - y^2)^2}{(x^2 - y^2)(x^2 + y^2)^2} = \frac{16x^4y^4}{(x^4 - y^4)^2}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Mẫu thức: } \left(\frac{2xy}{x^2 - y^2}\right)^2 + \left(\frac{2xy}{x^2 + y^2}\right)^2 &= \left(\frac{2xy}{x^2 - y^2} + \frac{2xy}{x^2 + y^2}\right) \left(\frac{2xy}{x^2 - y^2} - \frac{2xy}{x^2 + y^2}\right) \\
 &= \left[\frac{2x^3y + 2xy^3 + 2x^3y - 2xy^3}{(x^2 - y^2)(x^2 + y^2)}\right] \cdot \left[\frac{2x^3y + 2xy^3 - 2x^3y + 2xy^3}{(x^2 + y^2)(x^2 - y^2)}\right] \\
 &= \left[\frac{4x^3y}{(x^2 + y^2)(x^2 - y^2)}\right] \cdot \left[\frac{4xy^3}{(x^2 + y^2)(x^2 - y^2)}\right] \\
 &= \frac{16x^4y^4}{(x^4 + y^4)(x^4 - y^4)} = \frac{16x^4y^4}{(x^4 - y^4)^2}
 \end{aligned}$$

$$\text{Thay vào (1) ta được: } \frac{P^2 - Q^2}{P^2 + Q^2} = \frac{(x^4 - y^4)^2}{16x^4y^4} = 1$$

60. Cho biểu thức: $\left(\frac{x+1}{2x-2} + \frac{3}{x^2-1} - \frac{x+3}{2x+2}\right) \cdot \frac{4x^2-4}{5}$

- Hãy tìm điều kiện của x để giá trị của biểu thức được xác định.
- Chứng minh rằng khi giá trị của biểu thức được xác định thì nó không phụ thuộc vào giá trị của biến x .

Giải

$$a) \left| \begin{array}{ccc} x+1 & 3 & x+2 \\ 2x-2 & x^2-1 & 2x+2 \end{array} \right| = \frac{4x-1}{5}$$

$$\text{Biểu thức được xác định khi } \left| \begin{array}{ccc} 2x-2 \neq 0 & \Leftrightarrow & (x \neq 1) \\ x^2-1 \neq 0 & \Leftrightarrow & (x \neq \pm 1) \\ 2x+2 \neq 0 & \Leftrightarrow & (x \neq -1) \end{array} \right|$$

b) Hướng dẫn: Biến đổi biểu thức trong ngoặc để trở thành một phân thức rồi thực hiện phép nhân

$$\begin{aligned} \text{Ta có: } & \left| \begin{array}{ccc} x+1 & 3 & x+2 \\ 2x-2 & x^2-1 & 2x+2 \end{array} \right| = \frac{4x-1}{5} \\ & = \left| \begin{array}{ccc} x+1 & 3 & x+2 \\ 2x-1 & (x-1)(x+1) & 2(x+1) \end{array} \right| = \frac{(2x)^2-2^2}{5} \\ & = \left| \begin{array}{ccc} (x+1)(x-1)+6 & (x+3)(x-1) & (2x+2)(2x-2) \end{array} \right| = \frac{10x+10(x-1)}{5} \\ & = \left| \begin{array}{ccc} x^2+2x+1+6 & x^2-2x+3 & 4(x+1)(x-1) \end{array} \right| = \frac{10(x+1)(x-1)}{5} \\ & = \frac{10 \cdot 4(x+1)(x-1)}{10(x+1)(x-1)} = 4 \text{ (đpcm)} \end{aligned}$$

51. Tìm điều kiện của x để giá trị của biểu thức

$$\left| \begin{array}{ccc} 5x+2 & 5x-2 & x^2-100 \\ x^2-10x & x^2+10x & x^2+4 \end{array} \right| \text{ được xác định.}$$

Tính giá trị của biểu thức tại $x = 20040$

Giải

a) Tìm điều kiện để biểu thức được xác định

Biểu thức được xác định khi:

$$\left| \begin{array}{l} x^2-10x \neq 0 \\ x^2+10x \neq 0 \\ x^2+4 \neq 0, \forall x \in \mathbb{R} \end{array} \right| \Leftrightarrow \left| \begin{array}{l} x(x-10) \neq 0 \\ x(x+10) \neq 0 \end{array} \right| \Leftrightarrow \left| \begin{array}{l} x \neq 0 \\ x \neq \pm 10 \end{array} \right|$$

Vậy biểu thức được xác định khi $x \neq 0$ và $x \neq \pm 10$

b) Hướng dẫn: Ta thu gọn biểu thức trước khi thế giá trị của x vào biểu thức đã cho

$$\text{Ta có: } \left| \begin{array}{ccc} 5x+2 & 5x-2 & x^2-100 \\ x^2-10x & x^2+10x & x^2+4 \end{array} \right| = \frac{x^2-100}{x^2+4}$$

$$\begin{aligned}
&= \left[\frac{5x+2}{x(x-10)} + \frac{5x-2}{x(x+10)} \right] \cdot \frac{(x+10)(x-10)}{x^2+4} \\
&= \frac{(5x+2)(x+10) + (5x-2)(x-10)}{x(x+10)(x-10)} \cdot \frac{(x+10)(x-10)}{x^2+4} \\
&= \frac{5x^2+52x+20+5x^2-52x+20}{x(x^2+4)} \quad (\text{điều kiện } x \neq 10) \\
&= \frac{10x^2+40}{x(x^2+4)} = \frac{10(x^2+4)}{x(x^2+4)} = \frac{10}{x} = \frac{10}{20040} = \frac{1}{2004}
\end{aligned}$$

Vậy giá trị của biểu thức bằng $\frac{1}{2004}$

62. Tìm giá trị của x để: Giá trị của phân thức $\frac{x^2-10x+25}{x^2-5x}$ bằng 0.

Giải

Hướng dẫn: Cho biểu thức đã cho bằng 0 rồi tính x

Theo đề bài ta có: $\frac{x^2-10x+25}{x^2-5x} = 0$ (điều kiện $x \neq 0, x \neq 5$)

$$\Leftrightarrow x^2 - 10x + 25 = 0 \Leftrightarrow (x-5)^2 = 0 \Leftrightarrow x = 5$$

Giá trị $x = 5$ không thỏa mãn với điều kiện đề bài.

Vậy không có giá trị nào của x để giá trị phân thức bằng 0.

63. Viết mỗi phân thức sau dưới dạng tổng của một đa thức và một phân thức với tử thức là một hằng số, rồi tìm các giá trị nguyên của x để giá trị của phân thức cũng là số nguyên:

a) $\frac{3x^2-4x-17}{x+2}$;

b) $\frac{x^2-x+2}{x-3}$.

Giải

Ta thực hiện phép chia đa thức cho đa thức rồi viết theo yêu cầu của đề bài

a) Ta có:

$$\begin{array}{r|l}
3x^2 & -4x-17 \\
-3x^2 & +6x \\
\hline
& -10x-17 \\
& -10x & -20 \\
\hline
& & 3
\end{array}$$

Ta viết: $\frac{3x^2-4x-17}{x+2} = 3x-10 + \frac{3}{x+2}$

b)

$$\begin{array}{r|l}
x^2 & -x+2 \\
-x^2 & +3x \\
\hline
& 2x+2 \\
& 2x & -6 \\
\hline
& & 8
\end{array}$$

Ta viết $\frac{x^2}{x-5} = \frac{x+5}{x-5} + \frac{5}{x-5}$

64. Tính giá trị của phân thức trong bài tập 62 tại $x = 1,12$ và làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ ba.

Giải

$$\begin{aligned}\text{Với } x = 1,12 \text{ ta có } \frac{x^2}{x-5} &= \frac{10x+25}{x-5} = \frac{(x-5)}{x(x-5)} + \frac{x+5}{x} \quad (\text{điều kiện: } x \neq 5) \\ &= \frac{1,12-5}{1,12} + \frac{3,88}{1,12} = 3,464 \quad (\text{chính xác đến } 0,001)\end{aligned}$$

Vậy giá trị của phân thức bằng 3,464.

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG II

1. Chọn câu trả lời đúng.

(A) $\frac{1}{x} = \frac{x^2}{x}$

(B) $\frac{2x}{3} = \frac{3}{2x}$

(C) $\frac{2x+1}{5} = \frac{5x+1}{2}$

(D) $\frac{2x+2}{2x} = \frac{x+1}{x}$

2. Chọn câu trả lời đúng.

Đa thức P trong đẳng thức $\frac{(1-x)^2}{P} = \frac{x^2+x+1}{x}$ là:

(A) $x-1$

(B) $x(1-x)$

(C) $x(x+1)$

(D) $x+1$.

3. Chọn câu trả lời đúng. Đa thức P trong đẳng thức $\frac{x^2-x}{4x^2-4} = \frac{x}{P}$ là

(A) $4(x-2)$

(B) $4(x+1)$

(C) $x+2$

(D) $x-2$.

4. Tìm câu trả lời sai. Đa thức M trong đẳng thức $\frac{64-8x^2}{M} = \frac{16-8x}{2}$ là:

(A) $2x^2+4x+8$

(B) $(2x+2)^2-4x$

(C) $2(x+2)^2-2x$

(D) $(x+2)^2-2x$.

5. Chọn câu trả lời đúng. Biểu thức $\frac{x^3-x^2+x-1}{x^2-1}$ bằng:

(A) $\frac{1}{(x-1)^2}$

(B) $\frac{1}{(x+1)^2}$

(C) $\frac{1}{(x+1)^2+x}$

(D) $\frac{1}{(x+1)^2-x}$

6. Chọn câu trả lời đúng.

Mẫu thức chung của các phân thức $\frac{x}{50-32x^2}$; $\frac{x+1}{4x+5}$ và $\frac{2x+1}{4x-5}$ là:

(A) $2(25-16x^2)$

(B) $4x-5$

(C) $4x+5$

(D) $5-4x$

7. Chọn câu trả lời đúng. $\frac{2x+5}{x+5} - \frac{x+3}{x+5} =$

$$(A) \frac{x+2}{x+5}$$

$$(B) \frac{3x+8}{x+5}$$

$$(C) \frac{x+8}{x+5}$$

$$(D) \frac{3x+12}{x+5}$$

8. Chọn câu trả lời đúng. $\frac{27-x^3}{x+3} : \frac{x^2-9}{x^2-6x+9} =$

$$(A) \frac{9+3x+x^3}{x+3}$$

$$(B) (9+3x+x^3)$$

$$(C) 9+3x+x^3$$

$$(D) -\frac{(9+3x+x^3)}{x+3}$$

9. Chọn câu trả lời đúng. $(2x+3) : \frac{4x^2+6x}{x^2+1} =$

$$(A) \frac{x^2+1}{x}$$

$$(B) \frac{x^2+1}{2x}$$

$$(C) \frac{x}{x^2+1}$$

$$(D) \frac{2(x^2+1)}{x}$$

10. Chọn câu trả lời đúng. Đa thức P trong đẳng thức:

$$\frac{x^3+x^2y+xy^2}{2x+y} \cdot P = \frac{x^4-xy^3}{2xy+y^2} \text{ là:}$$

$$(A) \frac{x-y}{y}$$

$$(B) \frac{y}{x-y}$$

$$(C) \frac{x(x-y)}{2x+y}$$

$$(D) \frac{2x+y}{x(x-y)}$$

11. Chọn câu trả lời đúng. $\left(\frac{x}{x^2-49} - \frac{x-7}{7x+x^2} \right) : \frac{2x-7}{x^2+7x} + \frac{x}{7-x} =$

$$(A) -1$$

$$(B) 1$$

$$(C) \frac{1}{x+7}$$

$$(D) \frac{1}{7-x}$$

12. Chọn câu trả lời đúng. Tìm x để $\frac{36}{x^2+6x} - \frac{x}{x+6} + \frac{7}{x} = 0$

$$(A) x = 6$$

$$(B) x = 7$$

$$(C) x = 13$$

$$(D) x = -13$$

ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG II

1. $\frac{2x+2}{2x} - \frac{2(x+\frac{1}{2})}{2x} = \frac{x+1}{x}$. Chọn câu D.

2. $x(1-x)^3 = P(x^2+x+1)$ hay $x(1-x)(1+x+x^2) = P(x^2+x+1)$
Suy ra: $P = x(1-x)$. Chọn câu B.

3. $\frac{x^2}{4x^2-4} - \frac{x}{4(x^2-1)} = \frac{x(x-1)}{4(x-1)(x+1)} = \frac{x}{4(x+1)}$

Suy ra: $P = 4(x+1)$. Chọn câu B.

4. $\frac{16-8x}{2} - \frac{8(2-x)}{2} = \frac{8(2-x)(4+2x+x^2)}{2(4+2x+x^2)} = \frac{8(2^3-x^3)}{2(4+2x+x^2)}$

$= \frac{64-8x^3}{2(4+2x+x^2)} = \frac{64-8x^3}{2[(x+2)^2-2x]}$. Suy ra: $M = 2(x+2)^2 - 4x$. Chọn câu B

$$5. \frac{x^2 - x^3 - x^2 + 1}{x^3 + 1} = \frac{(x - 1)(x^2 - 1)}{(x^3 + 1)(x^2 + 1)} = \frac{x - 1}{(x + 1)(x^2 + x + 1)} = \frac{1}{x + x + 1} = \frac{1}{x^2 + 2x + 1} = \frac{1}{(x + 1)^2} \quad \text{Chọn câu D}$$

$$6. \frac{x}{50 - 32x^2} = \frac{x}{2(25 - 16x^2)} = \frac{x + 1}{4x + 5} = \frac{2(x + 1)(4x + 5)}{2(4x + 5)(4x + 5)} = \frac{2(x + 1)(4x + 5)}{2(16x^2 + 25)} = \frac{2x + 1}{4x + 5} = \frac{2x + 1}{5 - 4x} = \frac{2(2x + 1)(5 - 4x)}{2(5 - 4x)(5 - 4x)} = \frac{2(2x + 1)(5 - 4x)}{2(25 - 16x^2)} \quad \text{Chọn câu A}$$

$$7. \frac{2x + 5}{x + 5} = \frac{(x + 3)}{x + 5} = \frac{2x + 5 - x - 3}{x + 5} = \frac{x + 2}{x + 5} \quad \text{Chọn câu A}$$

$$8. \frac{(27 - x^3)(x^2 - 9)}{(x + 3)(x - 3)^2} = \frac{(3 - x)(9 + 3x + x^2)(x - 3)(x + 3)}{(x + 3)(x - 3)^2} = \frac{(x - 3)(9 + 3x + x^2)}{x - 3} = (9 + 3x + x^2) \quad \text{Chọn câu B}$$

$$9. (2x + 3) \cdot \frac{x^2 + 1}{4x^2 + 6x} = \frac{(2x + 3)(x^2 + 1)}{2x(2x + 3)} = \frac{x^2 + 1}{2x} \quad \text{Chọn câu B}$$

$$10. P = \frac{x^4 - xy^3}{2xy + y^4} = \frac{x^3 + x^2y + xy^2}{2x + y} = \frac{x(x^3 - y^3)}{y(2x + y)} = \frac{2x + y}{y(2x + y)} = \frac{(x - y)(x^2 + xy + y^2)}{y(x^2 + xy + y^2)} = \frac{x - y}{y} \quad \text{Chọn câu A}$$

$$11. \frac{xx - (x - 7)(x - 7)}{x(x + 7)(x - 7)} = \frac{x(x - 7)}{(x + 7)(2x + 7)} = \frac{x - 7}{x + 7} = \frac{x - 7}{x - 7} = 1 \quad \text{Chọn câu A}$$

12. Điều kiện: $x \neq 0, x \neq 6$.

$$\frac{36 - x(x + 6)}{x(x + 6)} = \frac{x^2 + 7x + 78}{x(x + 6)} = \frac{x^2 - 6x + 13x + 78}{x(x + 6)} = \frac{(x + 6)(13 - x)}{x(x + 6)} = \frac{13 - x}{x} = 0 \Rightarrow x = 13$$

Biểu thức bằng 0 khi tử bằng 0 và mẫu khác 0 hay: $13 - x = 0 \Rightarrow x = 13$ (thỏa điều kiện). Chọn câu C

PHẦN HÌNH HỌC

Chương I.

TỨ GIÁC

§1. TỨ GIÁC

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. Định nghĩa: Tứ giác ABCD là hình gồm bốn đoạn thẳng AB, BC, CD, DA, trong đó bất kỳ hai đoạn thẳng nào cũng không cùng nằm trên một đoạn thẳng.



a)



b)



c)



d)

2. Tứ giác lồi: Tứ giác lồi là tứ giác luôn nằm trong một nửa mặt phẳng mà bờ là đường thẳng chứa bất kỳ cạnh nào của tứ giác.
Tứ giác ABCD ở hình a) gọi là tứ giác lồi.

3. Tổng các góc của một tứ giác:

Định lý: Tổng bốn góc của một tứ giác bằng 360° .

GT	Tứ giác ABCD
KL	$\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} + \hat{D} = 360^\circ$



II. BÀI TẬP

A. Bài tập mẫu

Chứng minh rằng tổng bốn góc của tứ giác bằng 360°

Giải

Trong tứ giác $ABCD$, ta có đường chéo AC .
Tổng số đo bốn góc của tứ giác $ABCD$ bằng
tổng số đo các góc của hai tam giác ABC
và ADC là bằng


$$180^\circ + 180^\circ = 360^\circ$$

$$\text{Vậy } \hat{A} + \hat{B} + \hat{C} + \hat{D} = 360^\circ$$




B. Bài tập căn bản

1. Tìm giá trị x ở hình 5 (hình 6)



Hình 5



Hình 6

Giải

Tìm giá trị x

Hình 5a

Trong tứ giác $ABCD$, ta có

$$\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} + \hat{D} = 360^\circ$$

$$\text{Hay } 110^\circ + 120^\circ + 80^\circ + x = 360^\circ$$

$$\Rightarrow x = 360^\circ - (110^\circ + 120^\circ + 80^\circ) = 360^\circ - 310^\circ = 50^\circ$$

$$\text{Vậy } x = 50^\circ$$

Hình 5b

Trong tứ giác $HEFG$, ta có

$$\hat{H} + \hat{E} + \hat{F} + \hat{G} = 360^\circ$$

$$\text{Hay } 90^\circ + 90^\circ + 90^\circ + x = 360^\circ$$

$$\Rightarrow x = 360^\circ - (90^\circ + 90^\circ + 90^\circ) = 360^\circ - 270^\circ = 90^\circ$$

$$\text{Vậy } x = 90^\circ$$



• Hình 5c:

Trong tứ giác ABDE, ta có: $\widehat{A} + \widehat{B} + \widehat{D} + \widehat{E} = 360^\circ$

$$\text{hay } 65^\circ + 90^\circ + x + 90^\circ = 360^\circ$$

$$\Rightarrow x = 360^\circ - (65^\circ + 90^\circ + 90^\circ) = 115^\circ$$

Vậy $x = 115^\circ$.



• Hình 5d:

Ta có \widehat{I}_1 và \widehat{I}_2 là hai góc kề bù nên:

$$\widehat{I}_1 + \widehat{I}_2 = 180^\circ$$

$$\Rightarrow \widehat{I}_2 = 180^\circ - \widehat{I}_1 = 180^\circ - 90^\circ = 90^\circ$$

Ta có \widehat{K}_1 và \widehat{K}_2 là 2 góc kề bù nên

$$\widehat{K}_1 + \widehat{K}_2 = 180^\circ$$

$$\Rightarrow \widehat{K}_2 = 180^\circ - \widehat{K}_1 = 180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$$

Ta có \widehat{M}_1 và \widehat{M}_2 là hai góc kề bù nên:

$$\widehat{M}_1 + \widehat{M}_2 = 180^\circ \Rightarrow \widehat{M}_2 = 180^\circ - \widehat{M}_1 = 180^\circ - 105^\circ = 75^\circ$$

Trong tứ giác IKMN, ta có: $\widehat{I}_2 + \widehat{K}_2 + \widehat{M}_2 + \widehat{N} = 360^\circ$

$$\text{Hay } 90^\circ + 120^\circ + 75^\circ + x = 360^\circ$$

$$\Rightarrow x = 360^\circ - (90^\circ + 120^\circ + 75^\circ) = 360^\circ - 285^\circ = 75^\circ$$

Vậy $x = 75^\circ$



• Hình 6a:

Trong tứ giác PQRS, ta có:

$$\widehat{P} + \widehat{Q} + \widehat{R} + \widehat{S} = 360^\circ$$

$$\text{Hay } x + x + 95^\circ + 65^\circ = 360^\circ$$

$$\Rightarrow 2x = 360^\circ - (95^\circ + 65^\circ)$$

$$2x = 360^\circ - 160^\circ = 200^\circ \Rightarrow x = 100^\circ$$

Vậy $x = 100^\circ$



• Hình 6b:

Xét tứ giác MNPQ, ta có:

$$\widehat{M} + \widehat{N} + \widehat{P} + \widehat{Q} = 360^\circ$$

$$\Rightarrow 3x + 4x + x + 2x = 360^\circ$$

$$\Rightarrow 10x = 360^\circ \Leftrightarrow x = 36^\circ$$

Vậy $x = 36^\circ$.



2. Góc kề bù với một góc của tứ giác gọi là góc ngoài của tứ giác

a) Tính các góc ngoài của tứ giác ở hình 7a.

b) Tính tổng các góc ngoài của tứ giác ở hình 7b (tại mỗi đỉnh của tứ giác chỉ chọn một góc ngoài): $\widehat{A}_1 + \widehat{B}_1 + \widehat{C}_1 + \widehat{D}_1 = ?$

c) Có nhận xét gì về tổng các góc ngoài của tứ giác?



a)



b)

Hình 7

Giải

a) Xét tứ giác $ABCD$, ta có

$$\hat{A}_2 + \hat{B}_2 + \hat{C}_2 + \hat{D}_2 = 360^\circ$$

$$\text{hay } 75^\circ + 90^\circ + 120^\circ + \hat{D}_2 = 360^\circ$$

$$\hat{D}_2 = 360^\circ - (75^\circ + 90^\circ + 120^\circ)$$

$$\hat{D}_2 = 360^\circ - 285^\circ = 75^\circ$$

Ta có \hat{A}_1 và \hat{A}_2 là hai góc kề bù nên $\hat{A}_1 + \hat{A}_2 = 180^\circ$

$$\text{hay } 75^\circ + \hat{A}_1 = 180^\circ \Rightarrow \hat{A}_1 = 180^\circ - 75^\circ = 105^\circ$$

$$\text{Vậy } \hat{A}_1 = 105^\circ$$

Ta có \hat{B}_1 và \hat{B}_2 là hai góc kề bù nên

$$\hat{B}_1 + \hat{B}_2 = 180^\circ \text{ hay } \hat{B}_1 = 180^\circ - \hat{B}_2 = 180^\circ - 90^\circ = 90^\circ$$

$$\text{Vậy } \hat{B}_1 = 90^\circ$$

Ta có \hat{C}_1 và \hat{C}_2 là hai góc kề bù nên

$$\hat{C}_1 + \hat{C}_2 = 180^\circ \text{ hay } 120^\circ + \hat{C}_1 = 180^\circ \Rightarrow \hat{C}_1 = 180^\circ - 120^\circ = 60^\circ$$

$$\text{Vậy } \hat{C}_1 = 60^\circ$$

Ta có \hat{D}_1 và \hat{D}_2 là hai góc kề bù nên

$$\hat{D}_1 + \hat{D}_2 = 180^\circ \text{ hay } 75^\circ + \hat{D}_1 = 180^\circ \Rightarrow \hat{D}_1 = 180^\circ - 75^\circ = 105^\circ$$

$$\text{Vậy } \hat{D}_1 = 105^\circ$$

b) Xét tứ giác $ABCD$, ta có $\hat{A}_2 + \hat{B}_2 + \hat{C}_2 + \hat{D}_2 = 360^\circ$ (1)

Ta có \hat{A}_2 và \hat{A}_1 ; \hat{B}_2 và \hat{B}_1 ; \hat{C}_2 và \hat{C}_1 ; \hat{D}_2 và \hat{D}_1 là các cặp góc kề bù nên

$$\hat{A}_1 + \hat{A}_2 = 180^\circ$$

$$\hat{B}_1 + \hat{B}_2 = 180^\circ$$

$$\hat{C}_1 + \hat{C}_2 = 180^\circ$$

$$\hat{D}_1 + \hat{D}_2 = 180^\circ$$

$$(\hat{A}_1 + \hat{B}_1 + \hat{C}_1 + \hat{D}_1) + (\hat{A}_2 + \hat{B}_2 + \hat{C}_2 + \hat{D}_2) = 4 \cdot 180^\circ = 720^\circ \quad (2)$$



Thế (1) vào (2) ta được: $(\hat{A}_1 + \hat{B}_1 + \hat{C}_1 + \hat{D}_1) + 360^\circ = 720^\circ$

$$\Rightarrow \hat{A}_1 + \hat{B}_1 + \hat{C}_1 + \hat{D}_1 = 720^\circ - 360^\circ = 360^\circ$$

Vậy $\hat{A}_1 + \hat{B}_1 + \hat{C}_1 + \hat{D}_1 = 360^\circ$.

c) Nhận xét: Tổng các góc ngoài của một tứ giác bằng 360°

3. Ta gọi tứ giác ABCD trên hình 8 có $AB = AD$, $CB = CD$ là hình "cái đều"

a) Chứng minh rằng AC là đường trung trực của BD.

b) Tính B, D biết rằng $\hat{A} = 100^\circ$, $\hat{C} = 60^\circ$



Hình 8



Lời giải

a) Ta có $CB = CD$ (gt). Vậy C nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng BD (1). Tương tự, ta có $AB = AD$ (gt)

Vậy A nằm trên đường trung trực của BD (2)

Từ (1) và (2) ta suy ra AC là đường trung trực của BD (đpcm)

b) Xét hai tam giác CBA và CDA ta có:

$$\left. \begin{array}{l} CB = CD \text{ (gt)} \\ AB = AD \text{ (gt)} \\ AC : \text{cạnh chung} \end{array} \right\} \text{Vậy } \triangle CBA = \triangle CDA$$

Suy ra $\hat{B} = \hat{D}$

Xét tứ giác ABCD, ta có:

$$\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} + \hat{D} = 360^\circ$$

$$\text{Hay } \hat{A} + \hat{B} + \hat{C} + \hat{B} = 360^\circ \text{ (vì } \hat{B} = \hat{D})$$

$$\Rightarrow 2\hat{B} = 360^\circ - (\hat{A} + \hat{C})$$

$$2\hat{B} = 360^\circ - (100^\circ + 60^\circ) = 360^\circ - 160^\circ = 200^\circ$$

$$\Rightarrow \hat{B} = 100^\circ$$

$$\text{Vậy } \hat{B} = \hat{D} = 100^\circ$$



4. Dựa vào cách vẽ các tam giác đã học, hãy vẽ lại các tứ giác ở hình a, hình b vào vở.



a)



b)

Giải

Hướng dẫn: Dùng thước đo góc và compa để vẽ.

a) Hình a)

Dùng thước đo độ dài vẽ đoạn $AC = 3\text{cm}$.

Lấy A làm tâm, trên hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ AC ta vẽ cung tròn có bán kính bằng 2cm và cung tròn có bán kính bằng 1,5cm.

Tương tự, lấy C làm tâm, trên hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ AC ta vẽ cung tròn có bán kính bằng 2cm và cung tròn có bán kính bằng 1,5cm.

Chung các nhau tại B và D.

Nối 4 điểm A, B, C, D lại với nhau ta vẽ được tứ giác đã cho.

b) Hình b)

Dùng thước đo góc ta vẽ góc $\widehat{xAy} = 70^\circ$.

Trên cạnh Ax ta lấy đoạn $AB = 2\text{cm}$,

trên cạnh Ay ta lấy đoạn $AD = 1,5\text{cm}$.

Nối B với D.

Trên nửa mặt phẳng bờ BD không

chứa điểm A, lấy B làm tâm vẽ cung tròn có bán kính bằng 1,5cm và dựng D làm tâm vẽ cung tròn có bán kính bằng 2cm, chúng cắt nhau tại C. Nối B với C và D với C.


Ta vẽ được tứ giác ABCD như hình đã cho.



5. **Đố** Đố em tìm thấy vị trí của "kho báu" trên hình bên, biết rằng kho báu nằm tại giao điểm các đường chéo của tứ giác ABCD, trong đó các đỉnh của tứ giác có tọa độ như sau:

A(3, 2), B(2, 7), C(6, 8), D(8, 5)

Giải



Hướng dẫn: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, ta xác định được tọa độ các điểm A(3, 2), B(2, 7), C(6, 8), D(8, 5). Vẽ tứ giác ABCD và hai đường chéo. Tọa độ giao điểm hai đường chéo chính là vị trí của "kho báu".

Học sinh tự làm.

§2. HÌNH THANG

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. **Định nghĩa:** Hình thang là một tứ giác có hai cạnh đối song song.

- Hai cạnh song song gọi là hai đáy.
- Hai cạnh còn lại gọi là hai cạnh bên.

2. **Nhận xét:**

Nếu một hình thang có hai cạnh bên song song thì hai cạnh bên đó bằng nhau và hai cạnh đáy cũng bằng nhau.

$$\left. \begin{array}{l} ABCD \text{ là hình thang} \\ AD \parallel BC \end{array} \right\}$$

$$\Rightarrow AD = BC \text{ và } AB = CD$$

Nếu một hình thang có hai cạnh đáy bằng nhau thì hai cạnh bên song song và bằng nhau.

$$\left. \begin{array}{l} ABCD \text{ là hình thang} \\ AB = CD \end{array} \right\} \Rightarrow AB \parallel BC \text{ và } AD = BC$$

3. **Hình thang vuông:**

- a) **Định nghĩa:** Hình thang vuông là hình thang có một cạnh bên vuông góc với hai đáy.
b) **Dấu hiệu nhận biết:** Hình thang có một góc vuông là hình thang vuông.

$$\left. \begin{array}{l} ABCD \text{ là hình thang} \\ \hat{A} = 90^\circ \end{array} \right\} \Rightarrow ABCD \text{ là hình thang vuông.}$$



II. BÀI TẬP

A. Bài tập mẫu

Tứ giác ABCD có $BC = CD$ và BD là tia phân giác của góc D. Chứng minh rằng ABCD là hình thang.

Giải

Xét ABCD ta có: $BC = CD$

Vậy ABCD cân tại C.

$$\Rightarrow \hat{B}_1 = \hat{D}_1$$

Theo giả thiết ta có: $\hat{D}_2 = \hat{D}_1 \Rightarrow \hat{B}_1 = \hat{D}_2$

Hơn nữa \hat{B}_1 và \hat{D}_2 là hai góc so le trong

Vậy $BC \parallel AD$.



Sử dụng thước và êke ta có $IM \parallel CD$

Vậy ABCD là hình thang (đpcm)

B. Bài tập căn bản

6. Dùng thước và êke, ta có thể kiểm tra được hai đường thẳng có song song với nhau hay không (xem hình a). Trên hình b, có những tư góc là hình thang, có những tư góc không là hình thang. Bằng cách nêu trên, hãy kiểm tra xem trong các tư góc ở hình b, tư góc nào là hình thang.




a)



Hướng dẫn

Kiểm tra kiểm tra được tư góc ABCD và INMK là hình thang.

7. Tìm x và y trên hình, biết rằng ABCD là hình thang có đáy là AB và CD.



Giải

- Hình a)

Vì $AB \parallel CD$ (gt)

Đường thẳng AD cắt hai đường thẳng song song AB và CD tạo ra hai góc trong cùng phía bù nhau

Ta có: $\hat{A} + \hat{D} = 180^\circ$

hay $x + 80^\circ = 180^\circ \Rightarrow x = 180^\circ - 80^\circ = 100^\circ$

Vậy $x = 100^\circ$



Tương tự: $\hat{B} + \hat{C} = 180^\circ$ hay $40^\circ + y = 180^\circ \Rightarrow y = 180^\circ - 40^\circ = 140^\circ$

Vậy $y = 140^\circ$

• Hình b)

Áp dụng tính chất: Một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song để tìm x, y .

Ta có: $\left. \begin{array}{l} AB \parallel CD \text{ (gt)} \\ \hat{B}_2 \text{ so le trong với } \hat{C} \end{array} \right\} \Rightarrow \hat{C} = \hat{B}_2 = 50^\circ$

Vậy $y = 50^\circ$

Ta có: $\left. \begin{array}{l} AB \parallel CD \text{ (gt)} \\ \hat{A} \text{ và } \hat{D}_2 \text{ là hai góc đồng vị} \end{array} \right\} \Rightarrow \hat{A} = \hat{D}_2 = 70^\circ$

Vậy $x = 70^\circ$

• Hình c)

Ta có: $\left. \begin{array}{l} AB \parallel CD \text{ (gt)} \\ \hat{C} \text{ và } \hat{B} \text{ là hai góc trong cùng phía} \end{array} \right\}$

Vậy $\hat{B} + \hat{C} = 180^\circ \Rightarrow \hat{B} = 180^\circ - \hat{C}$

$\hat{B} = 180^\circ - 90^\circ = 90^\circ$ hay $x = 90^\circ$

Ta có: $\left. \begin{array}{l} AB \parallel CD \text{ (gt)} \\ \hat{A} \text{ và } \hat{D} \text{ là hai góc trong cùng phía} \end{array} \right\}$

Vậy $\hat{A} + \hat{D} = 180^\circ \Rightarrow \hat{D} = 180^\circ - \hat{A}$

$\hat{D} = 180^\circ - 65^\circ = 115^\circ$ hay $y = 115^\circ$.



8. Hình thang ABCD ($AB \parallel CD$) có $\hat{A} = \hat{D} = 20^\circ$, $\hat{B} = 2\hat{C}$. Tính các góc của hình thang.

Giải

Vì $AB \parallel CD$ (gt) $\left\{ \begin{array}{l} \text{ suy ra } \hat{A} + \hat{D} = 180^\circ \\ \hat{A} \text{ và } \hat{D} \text{ là hai góc trong cùng phía} \end{array} \right.$

Ta có: $\left\{ \begin{array}{l} \hat{A} + \hat{D} = 180^\circ \\ \hat{A} = \hat{D} = 20^\circ \text{ (gt)} \end{array} \right. \Rightarrow 2\hat{A} = 200^\circ \Rightarrow \hat{A} = 100^\circ$

Mà $\hat{A} = \hat{D} = 20^\circ \Rightarrow \hat{D} = \hat{A} = 20^\circ = 100^\circ - 20^\circ = 80^\circ$

Tương tự, ta có $\left\{ \begin{array}{l} \hat{B} + \hat{C} = 180^\circ \\ \hat{B} = 2\hat{C} \text{ (gt)} \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \hat{C} + \hat{B} = 180^\circ \\ 2\hat{C} = \hat{B} \text{ (gt)} \end{array} \right.$

$\Rightarrow 3\hat{C} = 180^\circ \Rightarrow \hat{C} = 60^\circ$

Vì $\hat{B} = 2\hat{C} = 2 \cdot 60^\circ = 120^\circ$

Vậy: $\hat{A} = 100^\circ$; $\hat{B} = 120^\circ$; $\hat{C} = 60^\circ$; $\hat{D} = 80^\circ$



9. Tứ giác ABCD có $AB \parallel BC \parallel AC$ là tổng quát của góc A. Chứng minh rằng ABCD là hình thang?

Giải

Xét tam giác ABC có $\widehat{A_1} + \widehat{B_1} + \widehat{C_1} = 180^\circ$

Vậy $\widehat{A_1} + \widehat{B_1} = 180^\circ - \widehat{C_1}$

Suy ra $\widehat{A_1} = \widehat{C_1}$

Mà $\widehat{A_1} = \widehat{A_2}$ (đối đỉnh) $\widehat{C_1} = \widehat{C_2}$ (đối đỉnh)

Vì $\widehat{A_2}$ và $\widehat{C_2}$ là hai góc so le trong $\widehat{A_2} = \widehat{C_2}$ nên suy ra $BC \parallel AD$

Trong tứ giác ABCD, ta có $BC \parallel AD$. Vậy tứ giác ABCD là hình thang (đpcm)

10. **Đề** Hình bên là hình vẽ một chiếc thang.
Hãy hình vẽ có bao nhiêu hình thang?

Giải

Vì tất cả sáu hình thang là

ABDC, CDFE, EFHG, ABFE, CDHG, ABHG



§3. HÌNH THANG CÂN

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. Định nghĩa

Hình thang cân là hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau

ABCD là hình thang cân $\Leftrightarrow \begin{cases} \widehat{A} = \widehat{B} \\ \widehat{C} = \widehat{D} \end{cases}$
(AB, CD là đáy)



2. Tính chất

a) Định lý 1: Trong hình thang cân, hai cạnh bên bằng nhau.

GT $\begin{cases} \text{ABCD là hình thang cân} \\ \text{(đáy AB // CD)} \end{cases}$
KL $AD = BC$

b) Định lý 2: Trong hình thang cân, hai đường chéo bằng nhau

GT $\begin{cases} \text{ABCD là hình thang} \\ \text{(đáy AB // CD)} \end{cases}$
KL $AC = BD$



3. Dấu hiệu nhận biết hình thang cân. Để chứng minh một hình thang là cân, ta phải chứng minh hình thang đó có một trong các tính chất sau:
- Hai góc ở một đáy bằng nhau (định nghĩa)
 - Hai đường chéo bằng nhau.

II. BÀI TẬP

A. Bài tập mẫu

Nếu các cạnh bên của một tam giác cân bị cắt bởi một đường thẳng song song với cạnh đáy thì tứ giác thu được có phải là hình thang cân hay không? Chứng minh?

Giải

Nếu cắt các cạnh bên của một tam giác cân bởi một đoạn thẳng song song với cạnh đáy thì tứ giác thu được là hình thang cân vì nó thỏa mãn định nghĩa (hình thang cân)

Ta có $BCEF$ là hình thang cân



B. Bài tập cơ bản

11. Tính độ dài các cạnh của hình thang cân $ABCD$ trên giấy kẻ ô vuông (Hình bên, độ dài của cạnh ô vuông là 1cm).

Giải

Vì độ dài của cạnh ô vuông là 1cm nên độ dài của cạnh:

$$AB = 2 \text{ (cm)}; DC = 4 \text{ (cm)}$$

Áp dụng định lý Py-ta-go trong tam giác vuông EAD , ta có:

$$AD^2 = AE^2 + ED^2 = 3^2 + 1^2 = 9 + 1 = 10$$

$$AD^2 = 10 \Rightarrow AD = \sqrt{10} \text{ (cm)}$$

Vì tứ giác $ABCD$ là hình thang cân nên:

$$BC = AD = \sqrt{10} \text{ (cm)}$$

Vậy độ dài các cạnh của hình thang $ABCD$ là

$$AB = 2\text{cm}; DC = 4\text{cm}; AD = BC = \sqrt{10} \text{ cm}$$



12. Cho hình thang cân $ABCD$ ($AB \parallel CD$, $AB < CD$). Kẻ các đường cao AE , BF của hình thang. Chứng minh rằng $DE = CF$.

Giải

Vì $ABCD$ là hình thang cân nên ta có:

$$AD = BC; \hat{D} = \hat{C}$$

Xét hai tam giác vuông EAD và FBC ta có:



$$AD = BC' \quad (1) \quad 4^{\circ}$$

Vậy $\triangle EAD = \triangle FBC$ (cđg). Suy ra $DE = CF$ (đpcm).

- 13** Cho hình thang cân $ABCD$ ($AB \parallel CD$), E là giao điểm của hai đường chéo. Chứng minh rằng $EA = EB$, $EC = ED$.

Giải

Vì $ABCD$ là hình thang cân nên ta có:

$$AD = BC, \quad \widehat{A} = \widehat{B}, \quad \widehat{C} = \widehat{D}$$

Xét hai tam giác ADC và BDC ta có:

$$\overline{AD} = \overline{BC}$$

$$\text{Vây } \triangle ADC = \triangle BDC \text{ (g.c.g.)}$$

$$\overline{AC} = \overline{BD}$$

$$\widehat{D} = \widehat{C} \text{ (cạnh chung)} \quad \Rightarrow \quad \widehat{CAD} = \widehat{DBC} \quad (1)$$



Xét hai tam giác DAB và CBA , ta có:

$$\overline{DA} = \overline{CB}$$

$$\text{Vây } \triangle DAB = \triangle CBA$$

$$\overline{AB} = \overline{BA}$$

$$\widehat{AB} = \widehat{BA} \text{ (cạnh chung)} \quad \Rightarrow \quad \widehat{ADB} = \widehat{BCA} \quad (2)$$

Xét hai tam giác EAD và EBC , ta có:

$$\widehat{EAD} = \widehat{EBC} \text{ (do (1))}$$

$$\overline{AD} = \overline{BC} \text{ (gt)}$$

$$\widehat{ADE} = \widehat{BCE} \text{ (do (2))}$$

$$\text{Vây } \triangle EAD = \triangle EBC \text{ (g.g.g.)}$$

Suy ra $EA = EB$, $EC = ED$ (đpcm).


- 14. Đố** Cho tứ giác $ABCD$ và $EFGH$ trên giấy kẻ ô vuông (hình bên), tứ giác nào là hình thang cân? Vì sao?

Giải

Quan sát và nhận xét ta thấy:

Tứ giác $ABCD$ là hình thang cân.

Tứ giác $EFGH$ là hình thang nhưng không là hình thang cân vì $EF > GH$.



- 15** Cho tam giác ABC cân tại A . Trên các cạnh bên AB , AC lấy theo thứ tự các điểm D và E sao cho $AD = AE$.
- Chứng minh rằng $BDEC$ là hình thang cân.
 - Tính các góc của hình thang cân đó, biết rằng $\widehat{A} = 50^\circ$.

Giải

a) Chứng minh BDEC là hình thang cân

$$\text{Vì } \triangle ABC \text{ cân tại } A \text{ nên: } \hat{B} = \frac{180^\circ - \hat{A}}{2} \quad (1)$$

$$\text{và } \hat{B} = \hat{C} \quad (2)$$

– Vì $\triangle ADE$ cân tại A (vì $AD = AE$) nên:

$$\hat{D}_1 = \frac{180^\circ - \hat{A}}{2} \quad (3)$$



Từ (1) và (3) suy ra $\hat{D}_1 = \hat{B}$

Hơn nữa \hat{D}_1 và \hat{B} là 2 góc đồng vị. Vậy $DE \parallel BC$.

Suy ra tứ giác BDEC là hình thang $(**)$

Từ (*) và (**): ta suy ra tứ giác BDEC là hình thang cân

b) Tính các góc của hình thang:

– Thay $\hat{A} = 50^\circ$ vào (1) ta có:

$$\hat{B} = \hat{C} = \frac{180^\circ - \hat{A}}{2} = \frac{180^\circ - 50^\circ}{2} = 65^\circ$$

Vì BDEC là hình thang cân nên:

$$\hat{B} + \hat{C} + \hat{E}_2 + \hat{D}_2 = 360^\circ \text{ hay } 2\hat{B} + 2\hat{E}_2 = 360^\circ$$

$$\Rightarrow \hat{E}_2 = \frac{360^\circ - 2\hat{B}}{2} = \frac{360^\circ - 130^\circ}{2} = 115^\circ$$

Vậy $\hat{B} = \hat{C} = 65^\circ$; $\hat{D}_2 = \hat{E}_2 = 115^\circ$.

Luyện tập

16. Cho tam giác ABC cân tại A, các đường phân giác BD, CE ($D \in AC$, $E \in AB$). Chứng minh rằng BEDC là hình thang cân có đáy nhỏ bằng cạnh bên.

Giải

– Chứng minh BEDC là hình thang cân.

Vì $\triangle ABC$ cân tại A nên ta có $AB = AC$

$$\hat{B} = \hat{C} \Rightarrow \hat{B}_1 = \hat{B}_2 = \hat{C}_1 = \hat{C}_2$$

– Xét hai tam giác ADB và AEC, ta có: \hat{A} : góc chung
 $AB = AC$
 $\hat{C}_1 = \hat{B}_1$

Vậy $\triangle ADB = \triangle AEC$ (g-g). Suy ra $AE = AD$.

Xét $\triangle AED$, ta có: $AE = AD$

Vậy $\triangle AED$ cân ở A. Suy ra $\hat{E}_2 = \hat{D}_2$

Xét $\triangle AED$ và $\triangle ABC$, ta có:



$$\widehat{A} = \widehat{B} = \widehat{D} = \widehat{C} \Rightarrow \widehat{A} = \widehat{D} \Rightarrow \widehat{D} = \widehat{B} \Rightarrow \widehat{A} = \widehat{B}$$

$$\widehat{B} = \widehat{D} \Rightarrow \widehat{A} = \widehat{B} = \widehat{D} = \widehat{C} \Rightarrow \widehat{A} = \widehat{C} \Rightarrow \widehat{A} = \widehat{B} = \widehat{C} = \widehat{D}$$

Hình thang thong AB với BC và AD là 2 đường thẳng song song tạo ra hai góc đồng vị bằng nhau ($\widehat{B}_1 = \widehat{C}_1 = \widehat{A}_2 = \widehat{D}_2$). Kết quả ra từ góc \widehat{BCD} là hình thang.

Trong hình thang BCD và $\widehat{B} = \widehat{C}$ (gt). Vì BCD là hình thang cân. Chứng minh $ED = EB$.

Vì $ED = DC$ theo chứng minh trên.

D sẽ là với B , thì $ED = EB$.

Suy ra $ED = EB$.

Xét $\triangle EBD$ ta có $ED = EB$.

Vậy $\triangle EBD$ cân tại E . Suy ra $\widehat{EDC} = \widehat{EBD}$ (p/q).

- 1°. Hình thang $ABCD$ ($AB \parallel CD$) có $\widehat{ACD} = \widehat{BDC}$. Chứng minh rằng $ABCD$ là hình thang cân.

Giải

Giao O là giao điểm của hai đường chéo AC và BD .

Xét $\triangle BOC$, ta có $\widehat{B}_1 = \widehat{C}_1$.

Vậy $\triangle BOC$ cân tại $O \Rightarrow OB = OC$ (1).

Vì $AB \parallel CD$ (gt) $\Rightarrow \widehat{B}_1 = \widehat{D}_1$

\widehat{D}_1 sẽ bằng với \widehat{B}_1 .

Vì $AB \parallel CD$ (gt) $\Rightarrow \widehat{A}_2 = \widehat{C}_2$

\widehat{A}_2 sẽ bằng với \widehat{C}_2 $\Rightarrow \widehat{A}_1 = \widehat{C}_1$

Mà $\widehat{C}_1 = \widehat{D}_1$ (gt) $\Rightarrow \widehat{A}_1 = \widehat{B}_1$

Vậy $\triangle OAB$ cân ở O . Suy ra $OA = OB$ (2).

Từ (1) và (2) ta có $OA + OC = OB + OD \Rightarrow AC = BD$.

Hình thang $ABCD$ có bằng chéo $AC = BD$. Vậy $ABCD$ là hình thang cân.

- 1°. Chứng minh định lý "Hình thang có hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân" qua bài toán sau:

Cho hình thang $ABCD$ ($AB \parallel CD$) có $AC = BD$. Qua B kẻ đường thẳng song song với AC , cắt đường thẳng DC tại E . Chứng minh rằng:

a) $\triangle BDE$ là tam giác cân.

b) $\triangle ACD = \triangle BDC$.

c) Hình thang $ABCD$ là hình thang cân.

Giải

a) Vì $AB \parallel DC$ (gt) $\Rightarrow AB \parallel DE$ và $AC \parallel BE$ (gt).

Đoạn thẳng song song song $(AB \parallel DE)$ chứa hai đường thẳng song song $(AC \parallel BE) \Rightarrow AC = BE$.

Mà $AC = BD$ (gt)

Suy ra $BD = BE$

Xét $\triangle BDE$, ta có: $BD = BE$

Vậy $\triangle BDE$ cân tại B (đpcm)

b) Chứng minh $\triangle ACD = \triangle BCD$



Vì $\triangle BDE$ cân tại B nên ta có: $\hat{D}_1 = \hat{E}$ (1)

Vì $AC \parallel BE$ (gt)

và \hat{E} và \hat{C}_1 là hai góc đồng vị $\Rightarrow \hat{C}_1 = \hat{E}$ (2)

Từ (1) và (2) suy ra: $\hat{D}_1 = \hat{C}_1$

Xét hai tam giác $\triangle ACD$ và $\triangle BCD$ ta có:

$AC = BD$ (gt); $\hat{C}_1 = \hat{D}_1$ (cm); DC : cạnh chung

Vậy $\triangle ACD = \triangle BCD$ (đpcm)

c) Chứng minh $ABCD$ là hình thang cân:

Vì $ABCD$ là hình thang (gt)

Và $\hat{A} = \hat{B}$ (vì $\triangle ACD = \triangle BCD$)

Vậy $ABCD$ là hình thang cân (đpcm).

19. **Đố.** Cho ba điểm A, D, K trên giấy kẻ ô vuông (hình bên). Hãy tìm điểm thứ tư M là giao điểm của các dòng kẻ sao cho nó cùng với ba điểm đã cho là bốn đỉnh của một hình thang cân.



Giải

Học sinh tự làm.

Gợi ý: Điểm được xác định như hình vẽ bên. Em hãy trình bày cách xác định vị trí điểm M.



§4. ĐƯỜNG TRUNG BÌNH CỦA TAM GIÁC, ĐƯỜNG TRUNG BÌNH CỦA HÌNH THANG

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. Đường trung bình của tam giác

- a) Định nghĩa: Đường trung bình của tam giác là đoạn thẳng nối trung điểm hai cạnh của tam giác

$$DA = DB$$

$$EA = EC$$

DE là đường trung bình của tam giác ABC



b) Các định lý

- Định lý 1: Đường thẳng đi qua trung điểm một cạnh của tam giác và song song với cạnh thứ hai thì đi qua trung điểm cạnh thứ ba

$$\begin{array}{l|l} \text{GT} & \triangle ABC \\ & DA = DB, DE \parallel BC \\ \hline \text{KL} & EA = EC \end{array}$$



- Định lý 2: Đường trung bình của hai tam giác thì song song với cạnh thứ ba và bằng nửa cạnh ấy

$$\begin{array}{l|l} \text{GT} & \triangle ABC \\ & DA = DB, EA = EC \\ \hline \text{KL} & DE \parallel BC, DE = \frac{1}{2} BC \end{array}$$

2. Đường trung bình của hình thang

- a) Định nghĩa: Đường trung bình của hình thang là đoạn thẳng nối trung điểm của hai cạnh bên

$$EA = ED$$

$$FB = FC$$

EF là đường trung bình của hình thang



b) Các định lý

- Định lý 1: Đường thẳng đi qua trung điểm một cạnh bên của hình thang và song song với hai đáy thì đi qua trung điểm cạnh bên thứ hai.

$$\begin{array}{l|l} \text{GT} & ABCD \text{ là hình thang (đáy } AB, CD) \\ & EA = ED, EF \parallel AB \parallel DC \\ \hline \text{KL} & FB = FC \end{array}$$

- Định lý 2: Đường trung bình của hình thang thì song song với hai đáy và bằng nửa tổng hai đáy.

GT	ABCD là hình thang (đáy AB, CD) EA = ED, FB = FC
KL	$EF \parallel AB, EF \parallel CD, EF = \frac{AB + CD}{2}$


II. BÀI TẬP

A. Bài tập mẫu

Đường cao xuất phát từ đỉnh góc tù của một hình thang cân chia đáy lớn thành hai đoạn thẳng có độ dài 6cm và 30cm. Tính độ dài đường trung bình của hình thang đó.

Giải

GT	ABCD : hình thang cân AH, DK : đường cao BH = 6cm, HC = 30cm
KL	IJ = ?



- Xét hai tam giác vuông HBA và KCD ta có:

$$\left. \begin{array}{l} AB = CD \\ \widehat{B} = \widehat{C} \end{array} \right\} \text{Vây } \triangle HBA = \triangle KCD$$

Suy ra: $BH = CK = 6\text{cm}$

Ta có: $HK + KC = HC \Rightarrow HK = HC - KC$

$$HK = 30 - 6 = 24\text{ cm}$$

Suy ra: $AD = HK = 24\text{cm}$ (do t/c đoạn chắn).

- Gọi IJ là đường trung bình của hình thang, ta có:

$$IJ = \frac{1}{2} (AD + BC) = \frac{1}{2} (24 + 36) = 30 \text{ (cm)}$$

Vậy $IJ = 30\text{cm}$.

B. Bài tập cần làm

20. Tính x trên hình bên.

Giải



Ta có $KA = KC = 8$ (1)

Ta có đường thẳng AK cắt hai đoạn thẳng KI và CB tạo thành hai góc đối đỉnh $\widehat{K} = \widehat{C} = 50^\circ$. Suy ra $KI \parallel CB$ (2)

Từ (1) và (2) ta có: Đường thẳng KI đi qua trung điểm một cạnh của tam giác và song song với cạnh thứ hai, vậy KI đi qua trung điểm của cạnh thứ ba.

Do đó $IA = IB$ hay $x = 10\text{cm}$.

- 21 Tính khoảng cách AP giữa hai mút của công tơ điện hình bên, biết rằng C là trung điểm của QA , D là trung điểm của QB và $CD = 3\text{cm}$.

Giải

Xét tam giác QAB , ta có:

$$\begin{cases} (C) : CA \\ (D) : DB \end{cases}$$

Vậy CD là đường trung bình của $\triangle QAB$.

Suy ra $CD = \frac{1}{2} AB$ hay $AB = 2CD = 2 \cdot 3 = 6\text{cm}$.

Vậy $AB = 6\text{cm}$.

- 22 Cho hình bên.

Chứng minh rằng $AI = IM$.

Giải

Trong $\triangle BDC$ ta có:

$$\begin{cases} ED = EB \text{ (gt)} \\ MB = MC \text{ (gt)} \end{cases}$$

Vậy EM là đường trung bình của $\triangle BDC$.

Suy ra $EM \parallel DC$ hay $EM \parallel DI$.

Trong $\triangle AEM$, ta có: $DA = DE$ (gt)
 $DI \parallel EM$ (cmt)

Suy ra DI đi qua trung điểm I của AM hay $AI = IM$ (cmt).

- 23 Tính giá trị x trên hình bên.

Giải

Xét tứ giác $MNQP$, ta có:

$$\begin{cases} MP \perp PQ \\ NQ \perp PQ \end{cases} \Rightarrow MP \parallel NQ$$

Vậy $MNQP$ là hình thang.

Trong hình thang $MNQP$, ta có $IM = IN$.

$IK \perp PQ \Rightarrow IK \parallel MP \parallel NQ$

Vậy IK là đường trung bình của hình thang $MNQP$.

Suy ra K là trung điểm của PQ hay $KQ = KP = 5\text{dm}$.

- 24 Hai điểm A và B thuộc một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng xy . Khoảng cách từ điểm A đến xy bằng 12cm , khoảng cách từ điểm B đến xy bằng 20cm . Tính khoảng cách từ trung điểm C của AB đến xy .



Giải

Theo đề bài ta có: $AA' \perp xy$
 $BB' \perp xy$
 $CC' \perp xy$

Vậy $CC' \parallel AA' \parallel BB'$

→ Tứ giác $AA'B'B$ là hình thang.

Ta có: $\left. \begin{array}{l} CA = CB \\ CC' \parallel AA' \parallel BB' \end{array} \right\} \Rightarrow C'A' = C'B'$

Vậy CC' là đường trung bình của hình thang $AA'B'B$.

Suy ra $CC' = \frac{AA' + BB'}{2} = \frac{12 + 20}{2} = 16 \text{ (cm)}$

Vậy $CC' = 16 \text{ cm}$



25. Hình thang $ABCD$ có đáy AB, CD . Gọi E, F, K theo thứ tự là trung điểm AD, BC, BD . Chứng minh ba điểm E, K, F thẳng hàng

Giải

Trong hình thang $ABCD$, ta có: $\left. \begin{array}{l} EA = ED \\ FB = FC \end{array} \right\}$

Vậy EF là đường trung bình của hình thang $ABCD$.

Suy ra $EF \parallel AB$ và $EF \parallel DC$ (1)

Trong $\triangle DAB$, ta có: $\left. \begin{array}{l} EA = ED \\ KB = KD \end{array} \right\}$

Vậy EK là đường trung bình của $\triangle DAB$

Suy ra $EK \parallel AB$ (2)

Từ (1) và (2), ta có: $\left. \begin{array}{l} EF \parallel AB \\ EK \parallel AB \end{array} \right\}$

Vậy $EF = EK$ hay ba điểm E, K, F thẳng hàng (đpcm)



Luyện tập

26. Tính x, y bên hình bên, trong đó $AB \parallel CD \parallel EF \parallel GH$.

Giải

Theo giả thiết của bài toán được chú thích trong hình vẽ, ta có CD là đường trung bình của hình thang $AEFB$.

Do đó $CD = \frac{AB + EF}{2}$ hay $CD = \frac{8 + 16}{2} = 12$

Vậy $CD = 12 \text{ cm}$



Tương tự, EF là đường trung bình của hình thang $CGHD$ (ta có)

$$EF = \frac{CH + GH}{2} \text{ hay } 16 = \frac{12 + y}{2}$$

$$\Rightarrow y = 16 \cdot 2 - 12 = 32 - 12 = 20$$

Vậy $y = 20\text{cm}$

- 27.** Cho tứ giác $ABCD$. Gọi E, F, K theo thứ tự là trung điểm của AD, BC, AC .
a) Vẽ và tính các độ dài EK và CD, KF và AB

- b) Chứng minh rằng $EF = \frac{AB + CD}{2}$

Giải

- a) So sánh EK và CD

Theo giả thiết, ta có $EA = ED$

$$KA = KC$$

Vậy EK là đường trung bình của tam giác ACD

$$\text{Suy ra } EK = \frac{CD}{2}$$

So sánh KF và AB

Tương tự KF là đường trung bình của tam giác CAB :

$$\text{Suy ra } KF = \frac{AB}{2}$$

- b) Chứng minh $EF = \frac{AB + CD}{2}$

Áp dụng tính chất bất đẳng thức trong tam giác EKF , ta có:

$$EF \leq EK + KF \text{ hay } EF \leq \frac{CD}{2} + \frac{AB}{2}$$

$$\text{Vậy } EF \leq \frac{AB + CD}{2} \text{ (đpcm)}$$



- 28.** Cho hình thang $ABCD$ ($AB \parallel CD$). E là trung điểm của AD , F là trung điểm của BC . Đường thẳng EF cắt BD ở I , cắt AC ở K .

- a) Chứng minh rằng $AK = KC, BI = ID$
b) Cho $AB = 6\text{cm}, CD = 10\text{cm}$. Tính các độ dài EI, KF, IK .

Giải

- a) Chứng minh $AK = KC, BI = ID$

Xét tứ giác $ABCD$, ta có $FB = FC$ (gt)

$$EA = ED$$
 (gt)

Vậy EF là đường trung bình

của hình thang $ABCD$

$$\Rightarrow EF \parallel AB \text{ và } EF \parallel CD$$

- Xét $\triangle CKA$, ta có $FB = FC$ (gt)



$$FK \parallel AB \text{ (do } EF \parallel AB).$$

Vậy FK đi qua trung điểm của cạnh AC .

Suy ra $AK = KH$ (QUANG CÁCH).

Tương tự, trong $\triangle ADB$ ta có: $EA = ED$ (gt).

$$EI \parallel BA \text{ (do } EF \parallel AB).$$

Vậy EI đi qua trung điểm của cạnh BD . Suy ra $BI = ID$ (tđpcm).

$$\text{b) Xét } \triangle DAB, \text{ ta có } \begin{cases} EA = ED \\ ID = IB \end{cases}$$

Vậy EI là đường trung bình của $\triangle DAB$. Suy ra $EI = \frac{AB}{2} = \frac{6}{2} = 3\text{cm}$.

Tương tự, KF là đường trung bình của $\triangle ABC$.

$$\text{Suy ra } KF = \frac{AB}{2} = \frac{6}{2} = 3\text{cm}$$

Vì EF là đường trung bình của hình thang $ABCD$ (theo chứng minh

$$\text{trên}), \text{ ta có: } EF = \frac{AB + CD}{2} = \frac{6 + 10}{2} = 8\text{cm}$$

$$\text{Mà } IK = EF - (EI + KF) = 8 - (3 + 3) = 2\text{cm}$$

Vậy $IK = 2\text{cm}$.

§5. DỰNG HÌNH THANG (BẰNG THƯỚC VÀ COMPA)

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

A. Các bước giải một bài toán dựng hình

1. **Phân tích:** Giả sử đã dựng được hình thỏa mãn tất cả các yêu cầu của bài toán. Căn cứ vào đó xét mối liên hệ giữa các bộ phận, các yếu tố của hình để định ra nên dựng bộ phận hoặc yếu tố nào của hình trước sao cho từ đó có thể dựng được hình cần dựng.
2. **Cách dựng:** Dựa vào bước phân tích ở trên, lần lượt nêu rõ các phép dựng và thể hiện các phép dựng trên hình vẽ.
3. **Chứng minh:** Bằng lập luận, chứng tỏ rằng hình đã dựng thỏa mãn các yêu cầu của bài toán.
4. **Điền luận:** Với điều kiện nào của giả thiết thì các phép dựng đã nêu ở trên thực hiện được? Khi đó có bao nhiêu nghiệm hình?

B. Chú ý

Để đơn giản đối với các bài toán dựng hình ở lớp 8, chỉ yêu cầu học sinh trình bày hai phần: Cách dựng và chứng minh.

II. BÀI TẬP

A. Bài tập mẫu

Dựng hình thang $ABCD$ với $\widehat{D} = 40^\circ$, $CD = 4\text{cm}$, đáy nhỏ $AB = 3\text{cm}$, cạnh bên $AD = 2\text{cm}$ và $\widehat{B} = 90^\circ$.

Giải

1. Cách dựng

Dựng $\triangle ACD$ có $\widehat{D} = 40^\circ$, $CD = 4\text{cm}$, $DA = 2\text{cm}$.

Trên nửa mặt phẳng bờ DC ta dựng tia $Ax \perp DC$.

Dựng đường tròn tâm A , bán kính 3cm cắt tia Ax tại B . Nối đoạn thẳng BC .



2. Chứng minh: Thật vậy, tứ giác $ABCD$ là hình thang vì $AB \perp CD$. Hình thang $ABCD$ có $CD = 4\text{cm}$, $\widehat{D} = 40^\circ$, $AD = 2\text{cm}$, $AB = 3\text{cm}$ nên thỏa mãn yêu cầu của bài toán.

B. Bài tập cơ bản

29. Dựng tam giác ABC vuông tại A , biết cạnh huyền $BC = 4\text{cm}$, góc nhọn $\widehat{B} = 65^\circ$.

Giải

Cách dựng:

Dựng góc $\widehat{xBy} = 65^\circ$. Dựng

đường tròn tâm B , bán kính

4cm , cắt tia Bx tại C .

Từ C dựng tia Cx vuông góc với tia Bx tại A .

Ta được tam giác vuông ABC là tam giác cần dựng.



Chứng minh: Thật vậy, $\triangle ABC$ là tam giác vuông tại A có góc $\widehat{B} = 65^\circ$ và cạnh huyền $BC = 4\text{cm}$ thỏa mãn yêu cầu của bài toán đã cho.

30. Dựng tam giác ABC vuông tại B , biết cạnh huyền $AC = 4\text{cm}$, cạnh góc vuông $BC = 2\text{cm}$.

Giải

Cách dựng:

Trước hết ta dựng góc \widehat{xBy} vuông tại B ,

dựng đường tròn tâm B có bán kính bằng

2cm , cắt tia Bx tại C .

Lấy C làm tâm, dựng đường tròn tâm C ,

bán kính 4cm , cắt tia Bx tại A .

Vậy $\triangle ABC$ là tam giác vuông cần dựng.



- ⇒ **Chứng minh:** Thật vậy, $\triangle ABC$ là tam giác vuông tại B, có $BC = 2\text{cm}$ và cạnh huyền $AC = 4\text{cm}$ thỏa mãn yêu cầu của bài toán đã cho.

31. Dụng hình thang ABCD ($AB \parallel CD$), biết $AB = AD = 2\text{cm}$, $AC = DC = 4\text{cm}$.

Giải

- **Cách dựng:**

Dựng tam giác DAC biết độ dài ba cạnh lần lượt là:

$$AD = 2\text{cm}; AC = DC = 4\text{cm}$$

Dựng tia $Ax \parallel DC$.

Dựng đường tròn tâm A bán kính 2cm, nó cắt tia Ax tại B. Nối B với C. Ta được hình thang ABCD là hình thang cân dựng.

- **Chứng minh:**

Tứ giác ABCD là hình thang vì $AB \parallel CD$

Hình thang ABCD có $AB = AD = 2\text{cm}$,

$AC = DC = 4\text{cm}$ nên thỏa mãn yêu cầu

của bài toán.



32. Hãy dựng một góc bằng 30° .

Giải

- **Cách dựng:**

Trước hết ta dựng tam giác đều với ba cạnh có độ dài bất kỳ.

- Dựng đường phân giác của một góc bất kỳ (Ví dụ: Dựng đường phân giác của góc ABC)

Ta được góc $\widehat{ABx} = 30^\circ$ là góc cần dựng.



- **Chứng minh:** Thật vậy, tam giác ABC là tam giác đều nên $\widehat{ABC} = 60^\circ$ và Bx là đường phân giác của góc ABC nên $\widehat{ABx} = 30^\circ$ là góc phải dựng.

33. Dụng hình thang cân ABCD, biết đáy $CD = 3\text{cm}$, đường chéo $AC = 4\text{cm}$, $\widehat{D} = 80^\circ$.

Giải

- **Cách dựng:**

- Dựng $\triangle ADC$ có $\widehat{D} = 80^\circ$, $DC = 3\text{cm}$ và $CA = 4\text{cm}$

Trên nửa mặt phẳng bờ DC, dựng tia Ax song song với tia DC.

- Dựng đường tròn tâm C bán kính AD nó cắt tia Ax tại B. Nối BC.

Ta được hình thang ABCD là hình thang cân phải dựng.



- **Chứng minh:** Thật vậy, tứ giác ABCD là hình thang và $AB \parallel CD$. Hình thang ABCD có $\widehat{D} = 80^\circ$, $DC = 3\text{cm}$; $CA = 4\text{cm}$ và $AD = BC$ nên thỏa mãn yêu cầu của đề bài.

34. Dùng êtêrơ thẳng $ABCD$ (góc $B = 90^\circ$, đáy $AD = 2\text{cm}$, cạnh bên $BC = 3\text{cm}$).

Giải

Coi k đúng:

Dùng êtêrơ góc AD (trung tâm D và $AD = 2\text{cm}$).

Tìm một mặt phẳng (P) đứng tại A .

Dùng êtêrơ trên trục C' bán kính 3cm .

Cắt tại AC tại B và D . Nối B với C' . Ta

được hình thang vuông $ABCD$ hoặc

$ABCD$ cân phải đúng.

- Chứng minh: Thật vậy, tứ giác $ABCD$ là hình thang vì $AB \parallel CD$. Hình thang $ABCD$ có $D = 90^\circ$, $DC = BC = 3\text{cm}$, $AD = 2\text{cm}$ nên thỏa mãn đúng yêu cầu của câu đề bài cho.

Tương tự hình thang $ABCD$ cũng thỏa mãn yêu cầu của đề bài.



§6. ĐỐI XỨNG TRỤC

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

A. Hai hình đối xứng qua một đường thẳng

1. Hai điểm đối xứng qua một đường thẳng

Hai điểm đối xứng với nhau qua đường thẳng d nếu d là đường trung trực của đoạn thẳng nối hai điểm đó.

(Nếu điểm B nằm trên đường thẳng d thì điểm đối xứng với B qua đường thẳng d cũng là điểm B).



2. Hai hình đối xứng qua một đường thẳng

a) Định nghĩa: Hai hình gọi là đối xứng với nhau qua đường thẳng d nếu mỗi điểm thuộc hình này đối xứng qua d với một điểm thuộc hình kia và ngược lại.

Đường thẳng d gọi là trục đối xứng của hai hình đó.

b) Tính chất: Nếu hai đoạn thẳng (góc, tam giác) đối xứng nhau qua một đường thẳng thì chúng bằng nhau.

B. Hình có trục đối xứng

Trục đối xứng của một hình

a) Định nghĩa: Đường thẳng d gọi là trục đối xứng của hình F nếu điểm đối xứng qua d của mỗi điểm thuộc hình F cũng thuộc hình F .

b) Tính chất: Hình thang cân nhận đường thẳng d đi qua trung điểm hai đáy làm trục đối xứng.

II. BÀI TẬP

A. Bài tập mẫu

Cho hình thang cân $ABCD$. Gọi d là đường thẳng đi qua trung điểm của hai đáy hình thang. Chứng minh rằng hai đường chéo cắt nhau tại một điểm trên d .

Giải

GT	$\overline{AB} = \overline{DC}; \overline{AC} = \overline{BD}; \overline{AD} = \overline{BC}$
KL	$\overline{MA} = \overline{MB}; \overline{NC} = \overline{ND}$
KL	AC và BD cắt d tại I

Đường thẳng d đi qua trung điểm M, N của hai cạnh đáy AB, DC của hình thang cân $ABCD$ nên d là trục đối xứng.

$\Rightarrow d$ là đường trung trực của AB .

($d \perp AB$ và $MA = MB$)

Giả sử AC cắt BD tại I . Xét hai tam giác $\triangle IAB$ và $\triangle IAC$, ta có:


$$\left. \begin{array}{l} \overline{AB} \text{ chung} \\ \overline{AD} = \overline{BC} \text{ (gt)} \\ \overline{BD} = \overline{AC} \text{ (gt)} \end{array} \right\} \text{Vây } \triangle ABD = \triangle BAC \Rightarrow \hat{A}_1 = \hat{B}_1.$$

Vậy $\triangle IAB$ cân tại $I \Rightarrow IA = IB$ hay I nằm trên đường trung trực d của đoạn AB .



B. Bài tập cần làm

35. Vẽ hình đối xứng với các hình đã cho qua trục d (hình dưới).



Học sinh tự làm.

36. Cho góc xOy có số đo 50° , điểm A nằm trong góc đó. Vẽ điểm E đối xứng với A qua Ox , vẽ điểm C đối xứng với A qua Oy .

a) So sánh các độ dài OB và OC .

b) Tính số đo góc BOC .

a) Số góc đã cho có 10° là:


\widehat{AOB} là góc đã cho của $\widehat{AOB} = 10^\circ$ là đường trung trực của đoạn thẳng AB

Suy ra $\widehat{OAB} = \widehat{OBA} = 10^\circ$

Vì C là điểm đối xứng của A qua O , nên OC là đường trung trực của đoạn thẳng AC

Suy ra $\widehat{OCA} = \widehat{OCB} = 10^\circ$

Tại O và C ta có $\widehat{AOB} = \widehat{BOC}$



b) Tính số đo góc BOC

Xét $\triangle OAB$, ta có $\widehat{OAB} = \widehat{OBA}$. Vậy $\triangle OAB$ cân tại O

Suy ra đường cao OH cũng là đường phân giác của $\angle AOB$

Do đó $\widehat{BOH} = 2\widehat{HOA} = 10^\circ$

Xét $\triangle OAC$ ta có $\widehat{OCA} = \widehat{OCB}$. Vậy $\triangle OAC$ cân tại O

Suy ra đường cao OK cũng là đường phân giác góc $\angle AOC$

Do đó $\widehat{AOK} = 2\widehat{OKC} = 10^\circ$

Cộng (1) và (2) ta được ta có

$$\widehat{BOA} + \widehat{AOC} = 2\widehat{HOA} + 2\widehat{OKC}$$

$$\text{hay } \widehat{BOC} = 2(\widehat{HOA} + \widehat{OKC})$$

$$\text{hay } \widehat{BOC} = 2 \times 10^\circ = 20^\circ = 100^\circ$$

$$\text{Vậy } \widehat{BOC} = 100^\circ$$

37) Tìm các hình có trục đối xứng trên hình bên dưới



a)



b)



c)



d)



e)



g)



h)



i)

Giải ý

Hình a), b), c), d), e), h), i) có trục đối xứng

Giải thích: Học sinh tự làm

38) Thực hành, cắt một tấm bìa hình tam giác cân, một tấm bìa hình thang cân.

Hãy cho biết đường nào là trục đối xứng của mỗi hình, sau đó gấp mỗi tấm bìa để kiểm tra lại điều đó

Hướng dẫn: Học sinh tự làm

Giải ý

Đối với tam giác ABE' cân tại A , trục đối xứng là đường vào AB (1) + (BC)

Đối với hình thang cân: Trục đối xứng là đường thẳng nối trung điểm hai cạnh đáy của hình thang.

Luyện tập

39. a) Cho hai điểm A, B thuộc cùng một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng d (hình bên). Gọi C là điểm đối xứng với A qua d . Gọi D là giao điểm của đường thẳng d và đoạn thẳng BC . Gọi E là điểm bất kỳ của đường thẳng d (E khác D). Chứng minh rằng $AD + DB < AE + EB$.



- b) Bạn Tú đang ở vị trí A , cần đến bờ sông d lấy nước rồi đi đến vị trí B (hình vẽ). Con đường ngắn nhất mà bạn Tú nên đi là con đường nào?

Giải

- a) Gọi B' là điểm đối xứng của B qua đường thẳng (d) .

Ta có: $DB = DB'$

Khi đó: $AD + DB = AD + DB' = AB'$ (1)

(Vì hình đối xứng của đoạn thẳng CDB qua (d) là đoạn thẳng $AD'B'$ nên ADB' thẳng hàng và $AD + D'B' = AB'$)

Vì (d) là đường (trung) trực của BB' nên ta có: $EB = EB'$

$\Rightarrow AE + EB = AE + EB'$ (Đo cùng 2 vế với AE)

Áp dụng tính chất bất đẳng thức trong $\triangle AEB'$, ta có:

$$AB' < AE + EB'$$

hay $AD + DB < AE + EB$ (do (1) và (2))

Vậy ta có điều phải chứng minh.

- b) Theo câu a) $AD + DB < AE + EB$. Điều này chứng tỏ rằng $AD + DB$ là nhỏ nhất. Vậy bạn Tú muốn đi đến bờ sông lấy nước rồi đến B , con đường ngắn nhất mà bạn Tú đi là từ A đi thẳng đến D , lấy nước rồi đi thẳng đến B (như hình vẽ).



40. Trong các biển báo giao thông sau đây, biển nào có trục đối xứng?

- Biển nguy hiểm: đường hẹp hai bên (hình a);
- Biển nguy hiểm: đường giao với đường sắt có rào chắn (hình b);
- Biển nguy hiểm: đường ưu tiên gặp đường không ưu tiên bên phải (hình c);
- Biển nguy hiểm khác (hình d)



a)



b)



c)



d)

Đáp án

Câu a), b), c) đúng

Câu d) sai

Vì mỗi đoạn thẳng có 2 trục đối xứng, đường trung trực của nó và chính nó

41. Các câu sau đúng hay sai?

- a) Nếu ba điểm thẳng hàng thì ba điểm đối xứng với chúng qua một trục cũng thẳng hàng.
- b) Hai tam giác đối xứng với nhau qua một trục thì có chu vi bằng nhau.
- c) Mọi đường tròn có vô số trục đối xứng.
- d) Mọi đoạn thẳng chỉ có một trục đối xứng.

Đáp án

- a) Đúng.
- b) Đúng, vì hai tam giác đối xứng nhau qua một trục thì bằng nhau nên chúng có chu vi bằng nhau.
- c) Đúng. Mọi đường thẳng đi qua tâm của đường tròn đều là trục đối xứng của đường tròn đó.
- d) Sai, vì ngoài đường trung trực của đoạn thẳng trên còn đường thẳng chứa đoạn thẳng trên cũng là trục đối xứng.

42. Đồ

- a) Hãy tập cắt chữ D (hình a) bằng cách gấp đôi tờ giấy. Kể tên một vài chữ cái khác (kiểu chữ in hoa) có trục đối xứng.
- b) Vì sao ta có thể gấp tờ giấy làm tư để cắt chữ H (hình b).



a)



b)

Học sinh tự làm.

§7. HÌNH BÌNH HÀNH

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. Định nghĩa: Hình bình hành (h.b.h) là một tứ giác có các cạnh đối song song.

$$ABCD \text{ là h.b.h } \Leftrightarrow \begin{cases} AB \parallel CD \\ AD \parallel BC \end{cases}$$

Hình bình hành là một hình thang có hai cạnh bên song song.



2. Tính chất

Định lý. Trong hình bình hành:

- a) Các cạnh đối bằng nhau.
- b) Các góc đối bằng nhau.
- c) Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

GT	$ABCD$ là h.b.h AC cắt BD tại O a) $AB = CD; AD = BC$
KL	b) $\hat{A} = \hat{C}; \hat{B} = \hat{D}$ c) $OA = OC; OB = OD$



3. Các dấu hiệu nhận biết một tứ giác là hình bình hành:

- 1) Tứ giác có các cạnh đối song song là hình bình hành.
- 2) Tứ giác có các cạnh đối bằng nhau là hình bình hành.
- 3) Tứ giác có các góc đối bằng nhau là hình bình hành.
- 4) Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường là hình bình hành.
- 5) Tứ giác có hai cạnh đối vừa song song vừa bằng nhau là hình bình hành.

II. BÀI TẬP

A. Bài tập mẫu

Cho hình bình hành $ABCD$, đường phân giác của góc \hat{D} cắt AB tại M

- a) Chứng minh $AM = AD$.

- b) Phân giác của góc \hat{B} cắt CD tại N . Chứng minh rằng $MBND$ là hình bình hành.

Giải

GT	$\hat{B}, \hat{D}, \hat{A}, \hat{C}, AB \parallel CD$ $\hat{D}_1, \hat{D}_2, \hat{B}_1, \hat{B}_2$
KL	a) $AM = AD$ b) $MBND$ là h.b.h



a) Chứng minh $AM = MD$

$$\begin{aligned} & \text{Ta có } \frac{AB}{AM} = \frac{CD}{MD} \quad \text{Mà } \frac{AB}{AM} = \frac{CD}{MD} \\ & \text{Mà } AB \parallel CD \text{ suy ra } D \text{ là trung điểm của } AD \end{aligned}$$

Suy ra $AM = MD$ (đpcm)

b) Chứng minh $AD = AM$ (đpcm)

c) Chứng minh $MBND$ là hình bình hành

$$\begin{aligned} & \text{Ta có } \frac{BM}{BN} = \frac{MD}{DN} \quad \text{Mà } \frac{BM}{BN} = \frac{MD}{DN} \\ & \text{Mà } BM \parallel DN \text{ suy ra } D \text{ là trung điểm của } BD \end{aligned} \quad (1)$$

$$\text{Ta có } \frac{DM}{DN} = \frac{AM}{AN} \quad \text{Mà } \frac{DM}{DN} = \frac{AM}{AN} \quad \text{Mà } DM \parallel AN \text{ suy ra } D \text{ là trung điểm của } DN \quad (2)$$

Ta có D là trung điểm của BD

$$\begin{aligned} & \text{Mà } \frac{DM}{DN} = \frac{AM}{AN} \quad \text{Mà } \frac{DM}{DN} = \frac{AM}{AN} \\ & \text{Mà } DM \parallel AN \text{ suy ra } D \text{ là trung điểm của } DN \end{aligned}$$

Suy ra $MBND$ là hình bình hành (đpcm)

B. Bài tập cơ bản

43. Các tứ giác $ABCD$, $EFGH$, $MNPQ$ trên giấy kẻ ô vuông ở hình bên có là hình bình hành hay không?

Hướng dẫn

Gọi α . Nhìn hình vẽ trên giấy kẻ ô vuông, ta nhận thấy ba tứ giác $ABCD$, $EFGH$ và $MNPQ$ đều có ít nhất một cặp cạnh đối song song và bằng nhau. Vậy chúng đều là hình bình hành.



44. Cho hình bình hành $ABCD$. Gọi E là trung điểm của AD , F là trung điểm của BC . Chứng minh rằng $BE = DF$.

Giải

Vì $ABCD$ là hình bình hành nên ta có

$$AD = BC \Rightarrow EA = ED = FB = FC$$

và $AD \parallel BC \Rightarrow ED \parallel BF$

Xét tứ giác $EBFD$, ta có $ED \parallel BF$

$$ED = BF$$

Vậy tứ giác $EBFD$ là hình bình hành. Suy ra $BE = DF$ (đpcm).



45. Cho hình bình hành $ABCD$ ($AB > BC$). Tia phân giác của góc D cắt AB ở E , tia phân giác của góc B cắt CD ở F .

- a) Chứng minh rằng $DE \parallel BF$.
 b) Tứ giác $DEBF$ là hình gì? Vì sao?

Giải

- a) Chứng minh $DE \parallel BF$:

- Vì $ABCD$ là hình bình hành nên:

$$AB \parallel CD$$

$$\left. \begin{array}{l} \hat{B}_2 \text{ so le trong với } \hat{F}_1 \\ AB \parallel CD \end{array} \right\} \text{ suy ra: } \hat{F}_1 = \hat{B}_2 = \frac{\hat{B}}{2}$$

- Vì DE là tia phân giác của \hat{D} nên:

$$\hat{D}_2 = \frac{\hat{D}}{2} = \frac{\hat{B}}{2} = \hat{F}_1 \text{ (vì } ABCD \text{ là hình bình hành nên } \hat{B} = \hat{D} \text{)}$$

Mà \hat{D}_2 và \hat{F}_1 là hai góc đồng vị.

Suy ra $DE \parallel BF$ (đpcm)

- b) Xét tứ giác $DEBF$, ta có: $\left. \begin{array}{l} DE \parallel BF \\ EB \parallel DF \end{array} \right\}$

Vậy tứ giác $DEBF$ là hình bình hành



Luyện tập

46. Các câu sau đúng hay sai?

- a) Hình thang có hai cạnh đáy bằng nhau là hình bình hành.
 b) Hình thang có hai cạnh bên song song là hình bình hành.
 c) Tứ giác có hai cạnh đối bằng nhau là hình bình hành.
 d) Hình thang có hai cạnh bên bằng nhau là hình bình hành.

Hướng dẫn

Gợi ý: Câu a, b : Đúng ; Câu c, d : Sai

Dựa vào các dấu hiệu nhận biết một tứ giác là hình bình hành em hãy tự chứng minh.

47. Cho hình bên, trong đó $ABCD$ là hình bình hành.

- a) Chứng minh rằng $AHCK$ là hình bình hành.
 b) Gọi O là trung điểm của HK . Chứng minh rằng ba điểm A, O, C thẳng hàng.



Giải

- a) Xét $\triangle AHB$ và $\triangle CKD$

$$\text{Ta có: } \widehat{AHB} = \widehat{CKD} = 90^\circ$$

$$\hat{B}_1 = \hat{D}_1 \text{ (so le trong)}$$

$$AB = DC \text{ (gt)}$$

$$\Rightarrow \triangle AHB = \triangle CKD \text{ (g-c-g)}$$



$$\begin{aligned} & \text{MH} = \text{CK} \quad (\text{định nghĩa}) \\ & \text{AH} = \text{BK} \quad (\text{định nghĩa}) \\ & \text{CK} = \text{BH} \quad (\text{MH} = \text{CK} \Rightarrow \text{CK} = \text{BH}) \end{aligned}$$

Từ (1) và (2) suy ra: MHCK là hình bình hành.

- b) MHCK là hình bình hành nên hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường nên M' đi qua trung điểm HK, hay M' đi qua O. Vậy A, O, C thẳng hàng.

48. Tứ giác ABCD có E, F, G, H theo thứ tự là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA. Tứ giác EFGH là hình gì? Vì sao?

Giải

Trong $\triangle ABC$ có EF là đường trung bình nên


$$EF \parallel AC \text{ và } EF = \frac{1}{2}AC \quad (1)$$

Trong $\triangle ADC$ có GH là đường trung bình nên

$$GH \parallel AC \text{ và } GH = \frac{1}{2}AC \quad (2)$$

Từ (1) và (2) ta có: $EF \parallel GH$ và $EF = GH$.

Vậy tứ giác EFGH là hình bình hành.



49. Cho hình bình hành ABCD. Gọi I, K theo thứ tự là trung điểm của CD, AB. Đường chéo BD cắt AI, CK theo thứ tự ở M và N. Chứng minh rằng:

- a) $AI \parallel CK$.
b) $DM = MN = NB$.

Giải

- a) Chứng minh $AI \parallel CK$.

Vì ABCD là hình bình hành (giả thiết) nên ta có:

$$AB \parallel CD \Rightarrow AK \parallel CI$$

$$AB = CD \Rightarrow AK = CI$$

$$\left. \begin{array}{l} AK \parallel CI \\ AK = CI \end{array} \right\} \text{ Xét tứ giác AKCI, ta có}$$

Vậy AKCI là hình bình hành.

Suy ra $AI \parallel CK$ (đpcm).



- b) Chứng minh $DM = MN = NB$.

Xét $\triangle DCN$, ta có: $ID = IC$ và $IM \parallel CN$ (do $AI \parallel CK$).

Vậy M là trung điểm của cạnh DN hay $DM = MN$ (1).

Tương tự, xét $\triangle BAM$, ta có: $KA = KB$

$$KN \parallel AM \text{ (do } AI \parallel CK)$$

Vậy N là trung điểm của BM hay $MN = NB$ (2).

Từ (1) và (2) ta có: $DM = MN = NB$ (đpcm).

§8. ĐỐI XỨNG TÂM

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. Hai điểm đối xứng qua một điểm

Định nghĩa: Hai điểm gọi là đối xứng với nhau qua điểm O nếu O là trung điểm của đoạn thẳng nối hai điểm đó.

Điểm O gọi là tâm đối xứng của hai điểm A và A' . Điểm O đối xứng với chính nó.



2. Hai hình đối xứng qua một điểm

a) Định nghĩa: Hai hình gọi là đối xứng với nhau qua điểm O nếu mỗi điểm thuộc hình này đối xứng qua O với một điểm thuộc hình kia và ngược lại.

Điểm O gọi là tâm đối xứng của hai hình đó.

b) Định lý: Nếu hai đoạn thẳng (góc, tam giác) đối xứng với nhau qua một điểm thì chúng bằng nhau.

3. Tâm đối xứng của một hình

Định nghĩa: Điểm O gọi là tâm đối xứng của hình F nếu điểm đối xứng qua O của mỗi điểm thuộc hình F cũng thuộc hình F .

II. BÀI TẬP

A. Bài tập mẫu

Các điểm A' , B' và M' đối xứng với các điểm A , B và M qua điểm O . Tính $A'M'$, biết rằng điểm M nằm giữa các điểm A và B , $MB = 3,4\text{cm}$, $AB' = 4,6\text{cm}$.

Giải

Theo định lý về hai đoạn thẳng đối xứng với nhau qua điểm O ta có

$$AM = A'M', MB = M'B'$$

Do $M \in AB$ nên $AM + MB = AB$

$$\text{Vậy } A'M' + M'B' = A'B' \rightarrow M' \in A'B'$$

$$\text{Ta có: } A'M' + M'B' = A'B' \rightarrow A'M' = A'B' - M'B'$$

$$\text{Với } \begin{cases} A'B' = 4,6\text{cm} \\ M'B' = MB = 3,4\text{cm} \end{cases}$$

$$A'M' = 4,6 - 3,4$$

$$A'M' = 1,2\text{ (cm)}$$

$$\text{Vậy } A'M' = 1,2\text{cm.}$$



B. Bài tập cơ bản

50. Vẽ điểm A' đối xứng với A qua B.
 B' đối xứng C' qua trung điểm B của C, qua B.
 B' trùng với A'.



Giải

Kẻ đoạn AB (phải B)
 chọn điểm A' sao cho B là
 trung điểm AA'

Kẻ đoạn CB (phải B) chọn
 điểm C' sao cho B là trung
 điểm CC'

Ta được điểm A', C' như
 hình vẽ

Trên mặt phẳng tọa độ Oxy
 ta xác định điểm

H(3; 2). Ta xác định điểm K
 đối xứng của điểm H qua O.
 Khi đó điểm K có tọa độ là
 (-3; -2)



51. Trong mặt phẳng tọa độ, cho điểm H có tọa độ (3; 2). Hãy vẽ điểm K đối
 xứng với H qua gốc tọa độ và tìm tọa độ của K.

Đáp số: (-3; -2)

52. Cho hình bình hành ABCD. Gọi E là điểm đối xứng với D qua điểm A, gọi F
 là điểm đối xứng với D qua điểm C. Chứng minh rằng điểm E đối xứng với
 điểm F qua điểm B.

Giải

Xét hai tam giác AEB và BCF

$$\left. \begin{array}{l} AB = BC \\ \widehat{B} = \widehat{B} \end{array} \right\} \Rightarrow AB = CF \quad (a)$$

$$\left. \begin{array}{l} DC = CF \\ \widehat{C} = \widehat{C} \end{array} \right\} \Rightarrow DC = BF \quad (b)$$

$$\left. \begin{array}{l} AE = DA \\ \widehat{A} = \widehat{A} \end{array} \right\} \Rightarrow AE = CB \quad (c)$$

$$\left. \begin{array}{l} \widehat{A} = \widehat{D} \text{ (đối đỉnh)} \\ \widehat{D} = \widehat{C} \text{ (đối đỉnh)} \end{array} \right\} \Rightarrow \widehat{A} = \widehat{C} \quad (d)$$

$$\left. \begin{array}{l} \widehat{D} = \widehat{C} \text{ (đối đỉnh)} \\ \widehat{C} = \widehat{B} \text{ (đối đỉnh)} \end{array} \right\} \Rightarrow \widehat{D} = \widehat{B} \quad (e)$$

Từ (a), (d), (e) : $\triangle AEB = \triangle BCF \Rightarrow BE = BF$ (1)



$$\begin{array}{rcl} \text{Ta có:} & \hat{P} & \hat{B}_2 \text{ (do } \angle KAB = \angle BCF) \\ & + & \hat{C} & \hat{B}_2 \text{ (do } \hat{C}_1 = \hat{D} = \hat{B}_2) \\ & & \hat{B}_2 = \hat{B}_2 \end{array}$$

$$\frac{\hat{P} + \hat{C}_1 + \hat{B}_1}{180^\circ} = \frac{\hat{B}_1 + \hat{B}_2 + \hat{B}_2}{180^\circ}$$

Vậy E, B, F thẳng hàng (2)

Từ (1) và (2) suy ra điểm E đối xứng với điểm F qua điểm B (đpcm)

53. Cho hình bên, trong đó $MD \parallel AB$, $ME \parallel AC$.

Chứng minh rằng điểm A đối xứng với điểm M qua điểm I

Giải

Vì $MD \parallel AB$
và $ME \parallel AC$ nên tứ giác AE MD là hình bình hành.

Vì I là trung điểm của đường chéo ED suy ra đường chéo AM cũng đi qua I và $IA = IM$

Vậy A là điểm đối xứng của M qua I (đpcm)



Luyện tập

54. Cho góc vuông xOy , điểm A nằm trong góc đó. Gọi B là điểm đối xứng với A qua Ox , C là điểm đối xứng với A qua Oy . Chứng minh rằng điểm B đối xứng với điểm C qua O.

Giải

Vì B là điểm đối xứng của A qua Ox , do đó Ox là đường trung trực của $AB \Rightarrow Ox \perp AB$ và $KA = KB$

Vì C là điểm đối xứng của A qua Oy , do đó Oy là đường trung trực của $AC \Rightarrow Oy \perp AC$ và $IA = IC$.

Tứ giác OIAK có hai cặp cạnh đối song song. Vậy OIAK là hình bình hành

Suy ra $IA = OK = IC$ và $KA = OI = KB$

Xét hai tam giác vuông IOK và KBO , ta có:

$$IC = OK \text{ (cm)}$$

$$OI = KB \text{ (cm)}$$

Vậy $\triangle IOK = \triangle KBO$

Suy ra: $OC = OB$ (1)

$$\text{và } \hat{C}_1 = \hat{O}_2$$

Trong tam giác vuông IOK , ta có:

$$\hat{O}_1 + \hat{C}_1 = 90^\circ \text{ hay } \hat{O}_1 + \hat{O}_2 = 90^\circ$$

$$\Rightarrow \hat{O}_1 + \hat{O}_2 + \hat{O}_3 = 90^\circ + 90^\circ = 180^\circ$$

Vậy ba điểm C, O, B thẳng hàng (2)

Từ (1) và (2) chứng tỏ rằng điểm B đối xứng với điểm C qua O



54. Cho hình bình hành $ABCD$. O là giao điểm của hai đường chéo. Một đường thẳng đi qua O cắt các cạnh AB và CD theo thứ tự ở M và N . Chứng minh rằng điểm M đối xứng với điểm N qua O .

Giải

Ta chứng minh tứ giác $AMCN$ là hình bình hành.

Vì $ABCD$ là hình bình hành nên

$$\widehat{MAO} = \widehat{NCO} \quad (1)$$

$$\widehat{ONA} = \widehat{OMC} \quad (2)$$

$$OA = OC \quad (3)$$

$$\widehat{O_1} = \widehat{O_2} \quad (\text{đối đỉnh})$$



$$\widehat{BCA} = \widehat{BAC}$$

Vì hai tam giác OMN và AMC có

$$OA = OC$$

$$\widehat{O_1} = \widehat{O_2}$$


Vậy $\triangle OMN = \triangle OMC \Rightarrow ON = OM$ (1)

Vì $ABCD$ là hình bình hành nên $AM = CN$ (2)

Từ (1), (2) suy ra tứ giác $AMCN$ là hình bình hành và MN là đường chéo. Vậy điểm M đối xứng với điểm N qua O (đpcm).

55. Trong các hình sau, hình nào có tâm đối xứng?

- a) Đoạn thẳng AB (hình a)
 b) Tam giác đều ABC (hình b)
 c) Biển cấm đi ngược chiều (hình c)
 d) Biển chỉ hướng đi vòng tránh chướng ngại vật (hình d)



Giải

- a) Đoạn thẳng AB có tâm đối xứng. Tâm đối xứng chính là trung điểm của AB .
 b) Tam giác đều ABC không có tâm đối xứng.
 c) Biển cấm đi ngược chiều (hình c) có tâm đối xứng. Tâm đối xứng đó chính là tâm của đường tròn.
 d) Hình d) không có tâm đối xứng.

57. Các câu sau đúng hay sai?

- a) Tâm đối xứng của một đường thẳng là điểm bất kì của đường thẳng đó.
 b) Tổng tâm của một tam giác là tâm đối xứng của tam giác đó.

c) Hai tam giác đối xứng với nhau qua một điểm thì có chu vi bằng nhau

Hướng dẫn

Câu a) và c) : Đúng .

Câu b) : Sai

§9. HÌNH CHỮ NHẬT

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. Định nghĩa

Hình chữ nhật là một tứ giác có 4 góc vuông.

$$ABCD \text{ là hình chữ nhật} \Leftrightarrow \begin{cases} ABCD \text{ là tứ giác} \\ \hat{A} = \hat{B} = \hat{C} = \hat{D} = 90^\circ \end{cases}$$

* Nhận xét: Hình chữ nhật cũng là một hình bình hành, cũng là một hình thang cân.



2. Tính chất

a) Hình chữ nhật có tất cả các tính chất của hình bình hành, của hình thang cân.

b) Định lý: Trong hình chữ nhật, hai đường chéo bằng nhau.

$$ABCD \text{ là hình chữ nhật} \Rightarrow AC = BD$$



3. Dấu hiệu nhận biết một tứ giác là hình chữ nhật:

- 1) Tứ giác có ba góc vuông là hình chữ nhật.
- 2) Hình thang cân có một góc vuông là hình chữ nhật.
- 3) Hình bình hành có một góc vuông là hình chữ nhật.
- 4) Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật.

4. Áp dụng vào tam giác

Định lý:

a) Trong một tam giác vuông, đường trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng nửa cạnh huyền.

b) Nếu một tam giác có trung tuyến ứng với một cạnh và bằng nửa cạnh ấy thì tam giác đó là tam giác vuông.

$$\triangle ABC \text{ là tam giác vuông} \Leftrightarrow \begin{cases} MB = MC \\ AM = \frac{BC}{2} \end{cases}$$



II. BÀI TẬP

A. Bài tập mẫu

Tứ giác cân tại A, AH là đường cao, HM và CN là các trung tuyến. Gọi G là trọng tâm của ΔABC . Trên tia đối của tia MG ta lấy điểm D sao cho $MG = MD$. Trên tia đối của tia NG ta lấy điểm E sao cho $NG = NE$. Chứng minh tứ giác BCDE là hình chữ nhật.

Giải

- AB = AC
 GT: MA = MC, NA = NB
 NG = NE, MG = MD
 KL: BCDE là hình



1. $\Delta GAC \sim \Delta GNB$ (tính chất của trọng tâm Δ)

$\Rightarrow GN = 2GB$ (tính chất điểm trọng tâm)

$$\Rightarrow GN = GE \quad (1)$$

$$\text{Tương tự } \begin{cases} GB = 2GM \\ \text{và } GB = 2GM \end{cases} \Rightarrow GB = GD \quad (2)$$

Từ (1) và (2) suy ra BCDE là hình bình hành (tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường) (3)

$$\Delta ABC \text{ cân nên } BG = GC \text{ hay } BD = CE \quad (4)$$

Từ (3) và (4) suy ra tứ giác BCDE là hình chữ nhật

B. Bài tập căn bản

58. Điền vào chỗ trống, biết rằng a, b là độ dài các cạnh, d là độ dài đường chéo của một hình chữ nhật:

a	5		$\sqrt{13}$
b	12	$\sqrt{6}$	
d		$\sqrt{10}$	7

Hướng dẫn

a	5	2	$\sqrt{13}$
b	12	$\sqrt{6}$	6
d	13	$\sqrt{10}$	7

Áp dụng định lý Py-ta-go trong các tam giác vuông có liên quan độ dài các cạnh còn lại của tam giác đó.

59. Chứng minh rằng:

- Điểm giao hai đường chéo của hình chữ nhật là tâm đối xứng của hình chữ nhật đó.
- Hai đường thẳng đi qua trung điểm hai cặp cạnh đối của hình chữ nhật là hai trục đối xứng của hình chữ nhật đó.



Giải

- a) Ta biết rằng hình bình hành có tâm đối xứng là giao điểm của hai đường chéo. Do hình chữ nhật là một hình bình hành đặc biệt. Vậy giao điểm O của hai đường chéo AC và BD là tâm đối xứng của hình chữ nhật.



- b) Theo tính chất của hình chữ nhật ta suy ra được $\triangle OAB$ và $\triangle OCD$ là hai tam giác cân.

Gọi IK là đường thẳng qua O và vuông góc với AB nên cũng vuông góc với CD. Do $OA = OB$ và $OC = OD$ nên IK đi qua trung điểm của AB và CD.

Suy ra IK là trục đối xứng của hình chữ nhật ABCD (1).

- Tương tự đường thẳng MN cũng là trục đối xứng của hình chữ nhật ABCD (2).

Từ (1) và (2) ta kết luận: Trong hình chữ nhật, hai đường thẳng đi qua trung điểm của hai cặp cạnh đối là hai trục đối xứng của hình chữ nhật đó.



60. Tính độ dài trung tuyến ứng với cạnh huyền của một tam giác vuông có các cạnh góc vuông bằng 7cm và 24cm.

Giải

Áp dụng định lý Py-ta-go trong tam giác vuông ABC, ta có:

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 = 7^2 + 24^2 = 625$$

$$\Rightarrow BC = \sqrt{625} = 25 \text{ (cm)}$$

Vì $\triangle ABC$ vuông tại A, trung tuyến AM sẽ bằng:

$$AM = \frac{BC}{2} = \frac{25}{2} = 12,5 \text{ (cm)}$$

Vậy $AM = 12,5\text{cm}$.



61. Cho tam giác ABC, đường cao AH. Gọi I là trung điểm của AC, E là điểm đối xứng với H qua I. Tứ giác AHCE là hình gì? Vì sao?

Giải

Xét tứ giác AHCE ta có: $IA = IC$; $IH = IE$

Vậy tứ giác AHCE là hình bình hành.

- Hơn nữa, hình bình hành AHCE có $\hat{H} = 90^\circ$.

Vậy tứ giác AHCE là hình chữ nhật.



Luyện tập

62. Các câu sau đúng hay sai?

- a) Nếu tam giác ABC vuông tại C thì điểm C thuộc đường tròn có đường kính là AB (hình a).

hình); điểm C thuộc đường tròn có đường kính là AB (C khác A và B) thì tam giác ABC vuông tại C (hình b)



a)



b)

Hướng dẫn

Chau ai, họ đều dùng

Học sinh tự chứng minh

63. Tìm giá trị x trên hình bên

Giải

Từ B vẽ $BK \perp DC$ ($K \in DC$)

Tứ giác ABKD có 3 góc vuông ($\hat{A} = \hat{D} = \hat{K} = 90^\circ$)

nên ABKD là hình chữ nhật

$$\Rightarrow AB = DK = 10$$

$$\text{và } BK = AD = x$$

Từ đó K nằm giữa D và C nên

$$DK + KC = DC$$

$$\Rightarrow KC = DC - DK = 15 - 10 = 5$$

Áp dụng định lý Py-ta-go trong tam giác vuông KCB, ta có:

$$BC^2 = KB^2 + KC^2 \Rightarrow KB^2 = BC^2 - KC^2$$

$$\text{hay } KB^2 = 13^2 - 5^2 = 169 - 25 = 144 = 12^2$$

$$\text{Suy ra } KB = 12$$

$$\text{Mà } x = AD = KB = 12. \text{ Vậy } x = 12.$$

64. Cho hình bình hành ABCD. Các tia phân giác của các góc A, B, C, D cắt nhau như trên hình bên. Chứng minh rằng EFGH là hình chữ nhật

Giải

Vì ABCD là hình bình hành nên

$$\hat{A} = \hat{C}, \hat{B} = \hat{D}$$

$$\text{và } \hat{A} + \hat{B} = \hat{C} + \hat{D} = 180^\circ$$

$$\hat{A} + \hat{D} = \hat{B} + \hat{C} = 180^\circ$$

$$\text{Xét } \triangle DHG, \text{ ta có } \hat{D}_H + \hat{G}_1 = \frac{\hat{D} + \hat{C}}{2} = \frac{180^\circ}{2} = 90^\circ$$



$$\text{Ta có: } \hat{D}_1 + \hat{C}_1 + \hat{E} = 180^\circ \Rightarrow \hat{E} = 180^\circ - (\hat{D}_1 + \hat{C}_1) = 180^\circ - 90^\circ = 90^\circ \quad (1)$$

$$\text{Tương tự, xét } \triangle AHD, \text{ ta có: } \hat{A}_2 + \hat{D}_2 = \frac{\hat{A} + \hat{D}}{2} = \frac{180^\circ}{2} = 90^\circ$$

$$\text{Và } \hat{A}_2 + \hat{D}_2 + \hat{H}_2 = 180^\circ \Rightarrow \hat{H}_2 = 180^\circ - (\hat{A}_2 + \hat{D}_2) = 180^\circ - 90^\circ = 90^\circ$$

$$\text{Mà } \hat{H}_1 = \hat{H}_2 \text{ (dd)} \Rightarrow \hat{H}_1 = 90^\circ \quad (2)$$

$$\text{Tương tự, xét } \triangle AGB, \text{ ta có: } \hat{A}_1 + \hat{B}_1 = \frac{\hat{A} + \hat{B}}{2} = 90^\circ$$

$$\text{và } \hat{A}_1 + \hat{B}_1 + \hat{G} = 180^\circ \Rightarrow \hat{G} = 180^\circ - (\hat{A}_1 + \hat{B}_1) = 180^\circ - 90^\circ = 90^\circ \quad (3)$$

$$\text{Xét tứ giác } EFGH, \text{ ta có: } \hat{E} = \hat{H} = \hat{G} = 90^\circ$$

Vậy tứ giác EFGH là hình chữ nhật

65. Tứ giác ABCD có hai đường chéo vuông góc với nhau. Gọi E, F, G, H theo thứ tự là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA.

Tứ giác EFGH là hình gì? Vì sao?

Giải

- Xét $\triangle ABC$, ta có: $EA = EB$
 $FB = FC$

Vậy EF là đường trung bình của $\triangle ABC$

$$\text{Suy ra } EF \parallel AC \text{ và } EF = \frac{AC}{2} \quad (1)$$

- Tương tự ta có: HG là đường trung bình của $\triangle ADC$

$$\text{Suy ra } HG \parallel AC \text{ và } HG = \frac{AC}{2} \quad (2)$$

Từ (1) và (2) suy ra $EF \parallel HG$ và $EF = HG$

Suy ra tứ giác EFGH là hình bình hành (*)

Tương tự, ta có: EH là đường trung bình của $\triangle ABD$. Suy ra $EH \parallel BD$ (3)

$$\text{Ta có: } \left. \begin{array}{l} EF \parallel AC \\ EH \parallel BD \\ AC \perp BD \end{array} \right\} \Rightarrow EF \perp EH \text{ hay } \hat{E} = 90^\circ \quad (**)$$

Từ (*) và (**), ta suy ra tứ giác EFGH là hình chữ nhật

66. Đố. Một đội công nhân đang

trồng cây trên đoạn đường

AB thì gặp chướng ngại vật

che lấp tầm nhìn (hình bên).

Đội đã dựng các điểm C, D,


E như trên hình vẽ rồi trồng

cây tiếp trên đoạn đường EF

vuông góc với DE. Vì sao AB

và EF cũng nằm trên một

đường thẳng?



c) Giải

3. Hai đường thẳng AB và CD cùng nằm trên một đường thẳng.

Tính các đoạn thẳng: BD , CD , AD , ED .

Tính tổng $BD + DE$ và AD , BD , ED và AD , ED .

Suy ra $BD + DE$ là tổng hai đoạn và có giá trị bằng.

Suy ra AD bằng $BD + DE$ là hình chiếu của.

Suy ra A , B , E và D , F , E thẳng hàng tại E , F cũng như vậy với đường thẳng.

§10. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VỚI MỘT ĐƯỜNG THẲNG CHO TRƯỚC

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. Khoảng cách giữa hai đường thẳng song song

a) Định nghĩa: Khoảng cách giữa hai đường thẳng song song là khoảng cách từ mọi điểm tùy ý trên đường thẳng này đến đường thẳng kia.



b) Định lý (về đường thẳng song song cách đều):

Các đường thẳng song song cách đều chắn trên một đường thẳng bất kỳ các đoạn thẳng liên tiếp bằng nhau.



2. Tính chất đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước

a) Tính chất 1: Nếu đường thẳng a song song với đường thẳng d và b cách đường thẳng d bằng h thì mọi điểm thuộc đường thẳng a đều cách d một khoảng bằng h .



b) Tính chất 2: Các điểm có khoảng cách bằng h đến đường thẳng d có định nghĩa nên hai đường thẳng song song với d và cách d một khoảng bằng h .

II. BÀI TẬP

A. Bài tập mẫu

Tìm tập hợp (quỹ tích) các điểm cách đều hai đường thẳng song song cho trước

Giải

a) Thuận: Giả sử đường thẳng $d_1 \parallel d_2$ và khoảng cách giữa hai đường thẳng là l .

Giả sử M là điểm cách đều hai đường thẳng d_1 và d_2 ; MM_1 và MM_2 là khoảng cách từ điểm M đến d_1, d_2 .

Ta có $MM_1 = l$ và $MM_2 = \frac{l}{2}$ (không đổi).

Vậy điểm M nằm trên đường thẳng d cách đường thẳng d_1 một khoảng $\frac{l}{2}$ (có thể nói M nằm trên đường thẳng d song song cách đều hai đường thẳng d_1, d_2).

b) Đảo: Ngược lại, lấy điểm P bất kỳ thuộc đường thẳng d và vẽ $PP_1 \perp d_1$, $PP_2 \perp d_2$.

Tứ giác MM_2P_1P và MPP_1M_2 là hình chữ nhật nên: $PP_1 = \frac{l}{2}$; $PP_2 = \frac{l}{2}$

Do đó P cách đều hai đường thẳng song song d_1, d_2 .

Vậy tập hợp tất cả các điểm cách đều hai đường thẳng song song d_1, d_2 là đường thẳng d song song và cách đều hai đường thẳng d_1, d_2 .



B. Bài tập căn bản

67. Cho đoạn thẳng AB . Kẻ tia Ax bất kỳ. Trên tia Ax lấy các điểm C, D, E sao cho $AC = CD = DE$ (hình bên). Kẻ đoạn thẳng EB . Qua C, D kẻ các đường thẳng song song với EB . Chứng minh rằng đoạn thẳng AB bị chia ra ba phần bằng nhau.



Giải

Xét $\triangle ADE$, ta có: $CA = CD$, CC' đi qua trung điểm của cạnh AE của $\triangle ADE$

Suy ra: $C'A = C'D'$ (1)

Vì $CC' \parallel EB$ Vậy tứ giác $CC'BE$ là hình thang

Ta còn có $DC = DE$ và $DD' \parallel EB$

Vậy DD' đi qua trung điểm của cạnh CE của hình thang $CC'BE$

Suy ra $C'D' = D'B$ (2)

Từ (1) và (2), ta có: $C'A = C'D' = D'B$ (đpcm)

- 68 Cho điểm A nằm ngoài đường thẳng d và có khoảng cách đến d bằng 2cm. Lấy điểm B bất kì thuộc đường thẳng d . Gọi C là điểm đối xứng với điểm A qua điểm B. Khi điểm B di chuyển trên đường thẳng d thì điểm C di chuyển trên đường nào?

Giải

Vì $AH \perp d$, khi đó AH gọi là khoảng cách từ A đến d và $AH = 2\text{cm}$.

Tương tự $CK \perp d$

Xét hai tam giác vuông HAB và KCB, ta có

$$BA = BC \text{ (gt)}$$

$$\widehat{B} = \widehat{B} \text{ (cđh)}$$

Vậy $\triangle HAB = \triangle KCB$ (ch-gn)

Suy ra $AH = CK = 2 \text{ (cm)} = \text{không đổi}$

Vì điểm C cách đường thẳng d có định một đoạn không đổi bằng 2cm. Vậy khi B di chuyển trên đường thẳng d thì điểm C di chuyển trên đường thẳng d' song song với d và cách d một khoảng không đổi bằng 2cm.



- 69 Grep mỗi ý (1), (2), (3), (4) với một trong các ý (5), (6), (7), (8) để được mô hình chính đúng:

(1) Tập hợp các điểm cách điểm A cố định một khoảng 3cm.

(2) Tập hợp các điểm cách đều hai đầu của đoạn thẳng AB cố định

(3) Tập hợp các điểm nằm trong góc xOy và cách đều hai cạnh của góc đó

(4) Tập hợp các điểm cách đều đường thẳng a cố định một khoảng 3cm

(5) a đường trung trực của đoạn thẳng AB.

(6) a hai đường thẳng song song với a và cách a một khoảng 3cm.

(7) a đường tròn tâm A bán kính 3cm.

(8) a tia phân giác của góc xOy .

Gặp ý (1) - (7), (2) - (5), (3) - (8), (4) - (6)

Nên kết quả như những bài tập. Em hãy tự chứng minh

Luyện tập

70. Cho góc vuông xOy , điểm A thuộc tia Oy sao cho $OA = 2\text{cm}$. Lấy B là một điểm bất kì thuộc tia Ox . Gọi C là trung điểm của AB. Khi điểm B di chuyển trên tia Ox thì điểm C di chuyển trên đường nào?

Giải

Trung tâm giác vuông OAB là trung

điểm C của cạnh AB ta kẻ $CK \perp Ox$.

Khi đó $CK \parallel OA$.

Vậy CK là đường trung bình của tam

giác OAB. Suy ra $CK = \frac{OA}{2} = 1 \text{ (cm)}$



Vậy điểm C cách đường thẳng cố định Ox một khoảng không đổi bằng 1cm. Vậy khi điểm B di chuyển trên tia Ox thì điểm C di chuyển trên đường thẳng d song song với tia Ox và cách Ox một khoảng không đổi bằng 1cm.

71. Cho tam giác ABC vuông tại A. Lấy M là một điểm bất kì thuộc cạnh BC. Gọi MD là đường vuông góc kẻ từ M đến AB, ME là đường vuông góc kẻ từ M đến AC, O là trung điểm của DE.

- Chứng minh rằng ba điểm A, O, M thẳng hàng.
- Khi điểm M di chuyển trên cạnh BC thì điểm O di chuyển trên đường nào?
- Điểm M ở vị trí nào trên cạnh BC thì AM có độ dài nhỏ nhất?

Giải

- a) Theo giả thiết bài toán, ta có

$$\hat{A} = \hat{D} = \hat{E} = 90^\circ$$

Vậy tứ giác ADME là hình chữ nhật có đường chéo DE.

Vì O là trung điểm của đường chéo DE và AM là đường chéo thứ hai của hình chữ nhật ADME nên AM phải đi qua O.

Vậy ba điểm A, O, M thẳng hàng.


- b) Vẽ AH và OK cùng vuông góc với BC và đặt $AH = h$ (không đổi). Trong tam giác AHM thì OK là đường trung bình nên:

$$OK = \frac{AH}{2} = \frac{h}{2} \text{ (không đổi)}$$

Vậy khi M di chuyển trên cạnh BC thì điểm O di chuyển trên đoạn thẳng d đoạn nằm trong $\triangle ABC$ và cách cạnh huyền BC một khoảng $\frac{h}{2}$.

- c) Khi điểm M trùng với điểm H, nghĩa là $AM = AH$ thì khi đó AM có độ dài nhỏ nhất (vì đường cao bao giờ cũng ngắn hơn các đường xiên cùng phát xuất từ một điểm đến đường thẳng).

72. **Bố.** Để vạch một đường thẳng song song với mép gỗ AB và cách mép gỗ 10cm, bác thợ mộc đặt đoạn bút chì CD dài 10cm vuông góc với ngón tay trở lẩy làm cũ (hình bên), rồi đưa ngón trở chạy dọc theo mép gỗ AB. Căn cứ vào kiến thức nào mà ta kết luận được rằng dấu chì C vạch nên đường thẳng song song với AB và cách AB là 10cm?



Giải

Điểm C cách mép gỗ AB cố định một khoảng không đổi bằng 10cm. Vậy khi tay di chuyển thì dấu bút chì C vạch nên đường thẳng song song với AB và cách AB một khoảng 10cm.

§11. HÌNH THOI

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. Định nghĩa

Hình thoi là một tứ giác có bốn cạnh bằng nhau

$ABCD$ là hình thoi

$ABCD$ là tứ giác

$|AB| = |BC| = |CD| = |DA|$



2. Tính chất

a) Hình thoi có tất cả các tính

chất của hình bình hành

b) Định lý Trong hình thoi

Hai đường chéo vuông góc với nhau

Hai đường chéo là đường phân

giác các góc của hình thoi



GT: $ABCD$ là hình thoi

a) $AC \perp BD$

b) • AC là phân giác của \hat{A} ,

CA là phân giác của \hat{C}

• BD là phân giác của \hat{B} ; DB là phân giác của \hat{D}

KL

3. Dấu hiệu nhận biết một tứ giác là hình thoi

1) Tứ giác có bốn cạnh bằng nhau là hình thoi

2) Hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau là hình thoi

3) Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc là hình thoi

4) Hình bình hành có một đường chéo vừa là đường phân giác của một góc là hình thoi

II. BÀI TẬP

A. Bài tập mẫu

Cho tam giác cân ABC ($AB = AC$), M là trung điểm của cạnh BC . Qua M vẽ đoạn thẳng song song với cạnh AB, AC và cắt các cạnh này theo thứ tự tại E, D . Chứng minh rằng tam giác $ADME$ là hình thoi.

Giải

GT: $AB = AC, \hat{B} = \hat{C}, MB = MC$

$Mx \parallel AC, My \parallel AB$

KL: $ADME$ là hình thoi



Trong tam giác cân ABC ta có: $\left. \begin{array}{l} MB = MC \\ MD \parallel AC \end{array} \right\}$

Vậy MD là đường trung bình của $\triangle ABC$

Suy ra: $DM = \frac{AC}{2}$ và $DA = BD$ (1)

Tương tự, $\left. \begin{array}{l} MB = MC \\ ME \parallel AB \end{array} \right\}$. Vậy ME là đường trung bình của $\triangle ABC$

Suy ra: $ME = \frac{AC}{2}$ và $EA = EC$ (2)

Từ (1) và (2) suy ra $DM = ME = EA = AD$

Vậy tứ giác $ADME$ là hình thoi (dpcm)

B. Bài tập căn bản

73. Tìm các hình thoi trên hình a, b, c, d, e.



a)



b)



c)



d)



e)

Giải

Các tứ giác sau đây là hình thoi:

- Hình a) (dấu hiệu 1)

- Hình b) (dấu hiệu 1)

- Hình c) (dấu hiệu 3)

- Hình d) (dấu hiệu 1)

- Hình e) không là hình thoi (vì 4 cạnh không bằng nhau).

74. Hai đường chéo của một hình thoi bằng 8cm và 10cm. Cạnh của hình thoi bằng giá trị nào trong các giá trị sau:

(A) 6cm;

(B) $\sqrt{41}$ cm;

(C) $\sqrt{164}$ cm;

(D) 9cm?

Giải

P có hai đường chéo của hình thoi vuông góc với nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

b) do $AO \perp BO$

$$OB = OD = 4 \text{ cm}$$

$$OA = OC = 5 \text{ cm}$$

$$AB = BC = CD = DA$$



3) dùng định lý Py-ta-go

$$BO' = OB' + OC' = 4 + 5 = 16 + 25 = 41 \Rightarrow BO' = \sqrt{41} \text{ (cm)}$$

Vậy $BO' = \sqrt{41}$ cm. Các em tham câu (b)

75. Chứng minh rằng trung điểm bốn cạnh của một hình chữ nhật là các đỉnh của một hình thoi.

Giải

Vì $ABCD$ là hình chữ nhật nên $AB = CD$

$$\Rightarrow AF = FB = CH = HD \text{ và } AD = BC$$

$$\Rightarrow AE = ED = CG = GB$$

$$\text{Ta có } \triangle AEF = \triangle BGF = \triangle CGH = \triangle DEH \text{ (c.g.c)}$$

$$\text{Suy ra } EF = FG = GH = HE$$

$$\text{Xét tứ giác } EFGH \text{ ta có } EF = FG = GH = HE$$

Vậy tứ giác $EFGH$ là hình thoi (đpcm)



76. Chứng minh rằng trung điểm các cạnh của một hình thoi là các đỉnh của một hình chữ nhật.

Giải

Theo giả thiết cho, ta có MN là đường trung bình của $\triangle ABC$ nên:

$$MN \parallel AC \text{ và } MN = \frac{AC}{2} \quad (1)$$

Tương tự, PQ là đường trung bình của $\triangle DAC$ nên:

$$PQ \parallel AC \text{ và } PQ = \frac{AC}{2} \quad (2)$$

Xét tứ giác $MNPQ$ ta có:

$$MN \parallel PQ \text{ và } MN = PQ \text{ (do (1) và (2))}$$

Vậy tứ giác $MNPQ$ là hình bình hành. (*)

Hơn nữa, $MN \parallel AC$, $MQ \parallel BD$ mà $AC \perp BD$ nên $MN \perp MQ$ (**)

Từ (*) và (**), suy ra hình bình hành $MNPQ$ có một góc vuông nên nó là hình chữ nhật (đpcm).



77. Chứng minh rằng:

- Giao điểm hai đường chéo của hình thoi là tâm đối xứng của hình thoi
- Hai đường chéo của hình thoi là hai trục đối xứng của hình thoi.

Giải

- a) Ta biết rằng hình thoi là một hình bình hành đặc biệt, mà hình bình hành có tâm đối xứng là giao điểm hai đường chéo. Do đó giao điểm của hai đường chéo là tâm đối xứng của hình thoi.




b) Ta có:

- A đối xứng với chính nó qua AC, B đối xứng với D qua AC.
 - \Rightarrow AB và AD đối xứng với nhau qua AC
 - Tương tự, các cạnh CB và CD đối xứng với nhau qua AC.
- Do đó AC là trục đối xứng của hình thoi.

Chứng minh tương tự, BD là trục đối xứng của hình thoi

78. **Đố.** Hình vẽ biểu diễn một phần của cửa xếp, gồm những thanh kim loại dài bằng nhau và được liên kết với nhau bởi các chốt tại hai đầu và tại trung điểm. Vì sao tại mỗi vị trí của cửa xếp, các từ góc trên hình vẽ đều là hình thoi, các điểm chốt I, K, M, N, O nằm trên một đường thẳng?



Giải

Kí hiệu như trên hình vẽ.

Tứ giác ABDC có các đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường nên ABDC là hình chữ nhật.

Do đó $DC \parallel AB$.

Tứ giác IDKC có 4 cạnh bằng nhau nên nó là hình thoi.

$$\Rightarrow IK \perp DC \Rightarrow IK \perp AB \text{ (vì } DC \parallel AB) \quad (1)$$

Chứng minh tương tự $KM \perp AB$ (2)

Từ (1) và (2) suy ra I, K, M thuộc cùng một đường thẳng vuông góc với AB. Chứng minh tương tự và suy ra các chốt I, K, M, N, O luôn nằm trên một đường thẳng vuông góc với AB (đpcm).

§12. HÌNH VUÔNG

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. Định nghĩa: Hình vuông là tứ giác có bốn góc vuông và bốn cạnh bằng nhau.

$ABCD$ là hình vuông

$ABCD$ là hình vuông

$A = B = C = D = 90^\circ$

$AB = BC = CD = DA$



Ta định nghĩa hình vuông là tứ giác

hình vuông là hình có bốn góc vuông và bốn cạnh bằng nhau

Hình vuông là hình đặc biệt của hình chữ nhật

Hình vuông vừa là hình chữ nhật vừa là hình thoi

2. Tính chất: Hình vuông có tất cả tính chất của hình chữ nhật và hình thoi
3. Dấu hiệu nhận biết một tứ giác là hình vuông

Một tứ giác có một trong các dấu hiệu sau đây là hình vuông

Một hình chữ nhật có hai cạnh kề bằng nhau

Một hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc

Hình chữ nhật có một đường chéo là đường phân giác của một góc

Hình thoi có một góc vuông

Hình thoi có hai đường chéo bằng nhau

II. BÀI TẬP

A. Bài tập mẫu

Cho hình vuông $ABCD$. Trên các cạnh AB, BC, CD, DA đặt các đoạn thẳng bằng nhau $AA' = BB' = CC' = DD'$. Chứng minh rằng tứ giác $A'B'C'D'$ là hình vuông

Giải

GT: $AB = BC = CD = DA$

$AA' = BB' = CC' = DD'$

KL: $A'B'C'D'$ là hình vuông

Ta có: $ABCD$ là hình vuông nên

$AB = BC = CD = DA$

Vì $AA' = BB' = CC' = DD'$ (gt) nên

$AB - AA' = BC - BB' = CD - CC' = DA - DD'$

hay $BA' = CB' = DC' = AD'$

Do đó $\triangle BAA' = \triangle CBB' = \triangle DCC' = \triangle AAD'$ (g.c.g)

1. $\angle A'B' = \angle B'C' = \angle C'D' = \angle D'A'$



Vậy tứ giác $A'B'C'D'$ là hình thoi (1)

Trong tam giác vuông $AA'D'$ có:

$$\widehat{A_1} + \widehat{D_1} = 90^\circ \text{ hay } \widehat{A_1} + \widehat{A'_1} = 90^\circ \text{ (vì } \angle AA'D' = \angle BB'A')$$

$$\Rightarrow \widehat{D'A'B'} = 90^\circ \text{ (2)}$$

Từ (1) và (2) suy ra tứ giác $A'B'C'D'$ là hình vuông.

B. Bài tập căn bản

79. a) Một hình vuông có cạnh bằng 3cm. Đường chéo của hình vuông đo bằng 6cm, $\sqrt{18}$ cm, 5cm hay 4cm?

b) Đường chéo của một hình vuông bằng 2dm. Cạnh của hình vuông đo bằng 1dm, $\frac{3}{2}$ dm, $\sqrt{2}$ dm hay $\frac{4}{3}$ dm?

Giải

a) Áp dụng định lý Py-ta-go trong tam giác vuông ABC , ta có

$$AC^2 = AB^2 + BC^2 = 3^2 + 3^2 = 18$$

$$\Rightarrow AC = \sqrt{18} \text{ cm}$$

$$\text{Vậy } AC = \sqrt{18} \text{ cm}$$

b) Tương tự:

$$AC^2 = AD^2 + DC^2 = 2AD^2 \text{ (vì } AD = DC)$$

$$\Rightarrow AD^2 = \frac{AC^2}{2} = \frac{2^2}{2} = 2 \Rightarrow AD = \sqrt{2} \text{ (dm)}$$

$$\text{Vậy } AD = \sqrt{2} \text{ (dm).}$$



80. Hãy chỉ rõ tâm đối xứng của hình vuông, các trục đối xứng của hình vuông.

Giải

— Giao điểm hai đường chéo của hình vuông là tâm đối xứng của nó.

Hình vuông có bốn trục đối xứng: d_1 , d_2 , AC , BD . (Em hãy tự chứng minh)



81. Cho hình bên

Tứ giác AEDF là hình gì?

Vì sao?



Giải

Số đo góc $\widehat{AEDF} = \widehat{A} + \widehat{F} + \widehat{E} = 180^\circ$

Vậy tứ giác $AEDF$ là hình chữ nhật.

Tỉ lệ góc $\widehat{EAD} = \widehat{DAF} = 45^\circ$. Nếu vẽ tia phân giác của góc \widehat{A}

Từ (1) và (2) ta suy ra tứ giác $AEDF$ là hình vuông.

82. Cho hình bên. Trong đó $ABCD$ là hình vuông. Chứng minh rằng tứ giác $EFGH$ là hình vuông.



Hướng dẫn

Từ 4 tam giác vuông bằng nhau, ta chứng minh $EF = FG = GH = HE$ do suy ra từ góc $EFGH$ là hình thoi (1).

Sau đó chứng minh $\widehat{AEH} + \widehat{BEF} = 90^\circ$. Từ đó suy ra $\widehat{HEF} = 90^\circ$ (2).

Từ (1) và (2) suy ra $EFGH$ là hình vuông.

Luyện tập

83. Các câu sau đây đúng hay sai?

- Tứ giác có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình thoi.
- Tứ giác có hai đường chéo vuông góc với nhau tại trung điểm của mỗi đường là hình thoi.
- Hình thoi là tứ giác có tất cả các cạnh bằng nhau.
- Hình chữ nhật có hai đường chéo bằng nhau là hình vuông.
- Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình vuông.

Hướng dẫn

Chú ý các câu “Dấu hiệu nhận biết” và kết luận.

Câu b), c), e) Đúng.

Câu a), d) Sai.

84. Cho tam giác ABC , D là một điểm nằm giữa B và C . Qua D kẻ các đường thẳng song song với AB và AC , chúng cắt các cạnh AC và AB theo thứ tự ở E và F .

- Tứ giác $AEDF$ là hình gì? Vì sao?
- Điểm D ở vị trí nào trên cạnh BC thì tứ giác $AEDF$ là hình thoi?
- Nếu tam giác ABC vuông tại A thì tứ giác $AEDF$ là hình gì? Điểm D ở vị trí nào trên cạnh BC thì tứ giác $AEDF$ là hình vuông?

Giải

- a) Theo giả thiết ta có $DE \parallel AB$; $DF \parallel AC$.

Vậy tứ giác $AEDF$ là hình bình hành.

- b) Vì $AEDF$ là hình bình hành nên nếu AD là đường phân giác của \widehat{A} thì hình bình hành $AEDF$ là hình thoi.



Vậy khi đó D là giao điểm của đường phân giác A với cạnh BC của $\triangle ABR$ (Vì hình bình hành có một đường chéo vừa là đường phân giác thì nó là hình thoi).

- c) Vì $ADDF$ là hình bình hành (chứng minh ở câu a) và $\hat{A} = 90^\circ$ nên tứ giác $AEDF$ là hình chữ nhật.

Đề cho hình chữ nhật $AEDF$ là hình vuông thì điểm D là giao điểm của đường phân giác góc A với cạnh huyền BC (Xem dấu hiệu nhận biết).



- 85.** Cho hình chữ nhật $ABCD$ có $AB = 2AD$. Gọi E, F theo thứ tự là trung điểm của AB, CD . Gọi M là giao điểm của AF và DE . N là giao điểm của BF và CE

- a) Tứ giác $ADFE$ là hình gì? Vì sao?
b) Tứ giác $EMFN$ là hình gì? Vì sao?

Giải

- a) Vì $ABCD$ là hình chữ nhật nên $AB = CD \Rightarrow \frac{AB}{2} = \frac{CD}{2}$ hay $AE = DF$

Và $AB \parallel CD$ nên $AE \parallel DF$

Suy ra tứ giác $ADFE$ là hình bình hành

Hơn nữa $\hat{A} = 90^\circ$

Suy ra tứ giác $ADFE$ là hình chữ nhật.

Ta cũng có $AE = AD$

Vậy tứ giác $ADFE$ là hình vuông



- b) Vì $ADFE$ là hình vuông nên $DE \perp FA$

- Vì $ADFE$ và $BCFE$ là hình vuông nên DE và CE đều là đường chéo các hình vuông trên nên: $\hat{D}_1 = \hat{C}_1 = \frac{90^\circ}{2} = 45^\circ$

Xét $\triangle BEC$ ta có: $\hat{D}_1 + \hat{C}_1 = 45^\circ + 45^\circ = 90^\circ$. Suy ra $\hat{E} = 90^\circ$

- Từ góc \hat{EMN} có ba góc vuông. Vậy $EMFN$ là hình chữ nhật. (1)

Hơn nữa hai hình vuông $ADFE$ và $BCFE$ bằng nhau nên $ME = NE$. (2)

- Hình chữ nhật $EMFN$ có hai cạnh liên tiếp bằng nhau.

Vậy $EMFN$ là hình vuông.

- 86. Đố** Lấy một tờ giấy gấp làm tư rồi cắt chéo theo một cắt AB (hình bên). Tứ giác nhận được là hình gì? Vì sao? Nếu ta có $OA = OB$ thì tứ giác nhận được là hình gì?

Hướng dẫn

Khi cắt tờ giấy gấp làm tư theo cạnh AB thì

khi mở ra ta được một tứ giác có 4 cạnh bằng

nhau và có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường và vuông góc với nhau. Vậy tứ giác đó là một hình thoi

Nếu có thêm $OA = OB$ thì hình thoi đó sẽ có hai đường chéo bằng nhau. Vậy tứ giác đó trở thành hình vuông




ÔN TẬP CHƯƠNG I

Các nội dung chính

1. Tứ giác
2. Hình thang (hình thang cân)
3. Hình bình hành (hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông)

Sơ đồ nhận biết các loại tứ giác



Chú thích:

- (1) Hai góc kề một đáy bằng nhau
Hai đường chéo bằng nhau
- (2) Một góc vuông
Hai đường chéo bằng nhau
- (3) Hai cạnh kề bằng nhau
Hai đường chéo vuông góc với nhau
Một đường chéo là đường phân giác của một góc
- (4) Các cạnh đối song song
Các cạnh đối bằng nhau
Các góc đối bằng nhau
Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường
Hai cạnh đối song song và bằng nhau

BÀI TẬP

87. Sơ đồ ở hình 110 biểu thị quan hệ giữa các tập hợp hình thang, hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông. Dựa vào sơ đồ đó, hãy điền vào chỗ trống:

- Tập hợp các hình chữ nhật là tập hợp con của tập hợp các hình
- Tập hợp các hình thoi là tập hợp con của tập hợp các hình
- Giao của tập hợp các hình chữ nhật và tập hợp các hình thoi là tập hợp các hình



Giải

Dựa vào sơ đồ và lý thuyết đã học, ta có thể điền vào chỗ trống các nội dung như sau:

- Tập hợp các hình chữ nhật là tập hợp con của tập hợp các hình: hình bình hành, hình thang
- Tập hợp các hình thoi là tập hợp con của tập hợp các hình: Hình bình hành, hình thang.
- Giao của tập hợp các hình chữ nhật và tập hợp các hình thoi là tập hợp các hình: hình vuông.

88. Cho tứ giác ABCD. Gọi E, F, G, H theo thứ tự là trung điểm của AB, BC, CD, DA. Các đường chéo AC, BD của tứ giác ABCD có điều kiện gì thì EFGH là:

- hình chữ nhật?
- hình thoi?
- hình vuông?

Giải

- EFGH là hình chữ nhật khi $AC \perp BD$
(Vì khi đó EFGH là hình bình hành có một góc vuông)
- EFGH là hình thoi khi $AC = BD$
(Khi đó EFGH là hình bình hành có hai cạnh liên tiếp bằng nhau)
- EFGH là hình vuông khi $AC = BD$ và $AC \perp BD$.
(Khi đó EFGH là hình thoi và có hai đường chéo bằng nhau)



89. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường trung tuyến AM. Gọi F là trung điểm của AH, E là điểm đối xứng với M qua D.
- Chứng minh rằng điểm E đối xứng với M qua AB.
 - Chứng minh tứ giác AEMC, AEHM là hình gì? Vì sao?
 - Cho $BC = 4\text{cm}$, tính chu vi tứ giác AEBM.
 - Tam giác vuông ABC có điều kiện gì thì AEHM là hình vuông?

Giải

a) Vì $MH \perp MC$

$\Rightarrow MH \perp DH$

Vì \therefore MD là đường trung bình của $\triangle HMC$

$MD \parallel AC$

Mà $AC \perp AB \Rightarrow MD \perp AB$ (1)



Hơn nữa E là điểm đối xứng của M qua D

Suy ra $DE = DM$ (2)

Từ (1) và (2) suy ra AB là đường trung trực của EM hay E là điểm đối xứng của M qua AB (đpcm)

- b) Tứ giác AEBM là hình gì?

Vì AB là đường trung trực của EM nên $AE = AM$

$BE = BM$

Hơn nữa AM là đường trung tuyến của $\triangle ABC$ nên

$$AM = MB = \frac{BC}{2} \Rightarrow AE = AM = BE = BM$$

Xét tứ giác AEBM ta có $AE = AM = BE = BM$

Vậy tứ giác AEBM là hình thoi

Tứ giác AEMC là hình gì?

Xét tứ giác AEMC, ta có $ME \perp CA$ (vì cung vuông góc với AB) (1)

Vì MD là đường trung bình của $\triangle ABC$ nên $\angle A' = 2\angle MD = ME$ (2)

Từ (1) và (2), ta có tứ giác AEMC là hình bình hành

- c) Tính chu vi tứ giác AEBM biết $BC = 4\text{cm}$

Ta có $BM = \frac{BC}{2} = 2\text{ (cm)}$

Vì AEBM là hình thoi, vậy chu vi tứ giác AEBM bằng

$4BM = 4 \cdot 2 = 8\text{cm}$

- d) Để hình thoi AEBM trở thành hình vuông thì hai đường chéo của nó phải bằng nhau, nghĩa là $AB = ME$

Mà $AC = ME$ (cm)


Suy ra $AB = AC$

Vậy khi đó tam giác vuông ABC phải trở thành tam giác vuông cân

99. **Đố.** Tìm trục đối xứng và tâm đối xứng của:

a) Hình a (sơ đồ một sân quần vợt).

b) Hình b



a)



b)

Hướng dẫn

Các em thử gấp đôi từng hình lại và kiểm tra trục đối xứng của chúng. Có gấp đôi lần nữa để tìm tâm đối xứng của chúng.

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG I

- Chọn câu trả lời đúng. Trong tứ giác ABCD có $\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} + \hat{D} = ?$
(A) 180° (B) 360° (C) 360° (D) 720°
- Cho tứ giác ABCD có $\hat{A} = 80^\circ$, $\hat{B} = 90^\circ$. Các tia phân giác của các góc C và D cắt nhau tại I. Số đo của góc CID là:
(A) 75° (B) 85° (C) 95° (D) 58°
- Chọn câu trả lời đúng. Cho hình thang ABCD ($AB \parallel CD$) có $AB = 7$ cm, $BC = 9$ cm và $DC = 11$ cm. Các điểm H, K lần lượt là trung điểm các cạnh AD, BC. Ta có:
(A) $HK = 8$ cm (B) $HK = 10$ cm (C) $HK = 9$ cm (D) $HK = 7$ cm
- Tìm câu trả lời sai. Với thước và compa, có thể dựng được:
(A) Tam giác ABC cân tại A, biết $BC = 5$ cm, $BH = 4$ cm (BH là đường cao của $\triangle ABC$, $H \in AC$)
(B) Hình thang cân ABCD ($AB \parallel DC$), biết $CD = 3$ cm, $AC = 4$ cm, $\hat{D} = 70^\circ$
(C) Đường $\triangle ABC$ vuông tại A, biết $AB = 8$ cm, $BC = 6$ cm.
(D) Đường $\triangle ABC$ vuông tại A, biết cạnh huyền $BC = 5$ cm và $\hat{B} = 35^\circ$
- Tìm câu trả lời sai.
(A) Tứ giác có các cạnh đối bằng nhau là hình bình hành
(B) Tứ giác có các cạnh đối song song là hình bình hành
(C) Hình thang có hai cạnh bên song song là hình bình hành
(D) Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường là hình bình hành

6. *Chọn câu trả lời đúng:*
- (A) Hai điểm A và B gọi là trục đồng trục nếu qua O qua O trung tuyến AB, trung trực AB
- (B) Hai điểm A và B gọi là trục đồng trục nếu qua O qua O là trung điểm của đoạn thẳng AB
- (C) Hai điểm A và B gọi là trục đồng trục nếu qua O qua A là trung điểm của đoạn thẳng OB
- (D) Hai điểm A và B gọi là trục đồng trục nếu qua O qua B là trung điểm của đoạn thẳng OA
7. *Chọn câu trả lời đúng:*
- (A) Nếu một tam giác có đường trung tuyến ứng với một cạnh bằng nửa cạnh ấy thì tam giác đó là tam giác vuông.
- (B) Trong tam giác vuông, đường trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng $\frac{1}{2}$ cạnh huyền
- (C) Trong tam giác vuông, đường trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng cạnh huyền
- (D) Trong tam giác vuông, đường trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng nửa cạnh huyền
8. *Chọn câu trả lời đúng:* Cho tam giác vuông OI A, đường cao AH. Góc K, I lần lượt là chân đường cao kẻ từ H đến AB, AC. Điểm M là trung điểm của HK. Số đo góc KIM là
- (A) 60° (B) 30° (C) 45° (D) 90°
9. *Chọn câu trả lời đúng:* Tập hợp các điểm cách điểm O có bằng một khoảng 5 cm là
- (A) đường trung trực AB đi qua điểm O
- (B) hai đường thẳng song song với a và cách a một khoảng 5 cm
- (C) đường thẳng cách điểm O một khoảng 5 cm
- (D) đường tròn tâm O bán kính bằng 5 cm
10. *Chọn câu trả lời đúng:* Cho tam giác ABC. Góc P là điểm di chuyển trên BC. Q là trung điểm của AP. Điểm Q di chuyển trên đường nào?
- (A) Đường thẳng qua Q và song song với BA
- (B) Đường thẳng qua Q và song song với AC
- (C) Đường thẳng qua Q và song song với AB
- (D) Đường trung trực của đoạn thẳng BC
11. *Chọn câu trả lời sai:*
- (A) Trong hình thoi có hai đường chéo bằng nhau
- (B) Trong hình thoi, hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường
- (C) Trong hình thoi hai đường chéo vuông góc với nhau
- (D) Trong hình thoi có hai cạnh bên bằng nhau

12. *Chọn câu trả lời đúng.* Cho hình thoi ABCD có $\hat{A} = 60^\circ$. Trên cạnh AB lấy điểm M, trên cạnh DC lấy điểm N sao cho $AM = DN$. Số đo của góc MBN là:
- (A) 30° (B) 60° (C) 60° (D) 45°
13. *Tìm câu trả lời sai.*
- (A) Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau và bằng nhau là hình vuông
 (B) Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình vuông
 (C) Hình chữ nhật có hai cạnh kề bằng nhau là hình vuông
 (D) Hình chữ nhật có một đường chéo là đường phân giác của một góc là hình vuông
14. *Chọn câu trả lời đúng.* Cho hình vuông ABCD. Điểm M tùy ý trên đường chéo AC. Gọi N, P lần lượt là hình chiếu của M trên các cạnh DC và BC. Tứ giác CPMN là hình gì?
- (A) Hình vuông (B) Hình bình hành
 (C) Hình chữ nhật (D) Hình thoi.

ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG I

1. *Chọn câu C.*

2. Ta có $\hat{D} + \hat{C} = 360^\circ$ $\hat{A} + \hat{B} = 180^\circ$

$$\text{Mà } \hat{D}_1 + \hat{C}_1 = \frac{\hat{D} + \hat{C}}{2} = \frac{180^\circ}{2} = 95^\circ$$

ABCD có $\hat{C}_1\hat{D} = 180^\circ - (\hat{D}_1 + \hat{C}_1) = 85^\circ$. Chọn câu B.



3. HK // AB // DC

$$HK = \frac{AB + DC}{2} = \frac{7 + 11}{2} = 9 \text{ cm. Chọn câu C.}$$

4. ABC vuông tại A nên $BC > AB$. Chọn câu C.

5. Chọn câu B.

6. Chọn câu B.

7. Chọn câu A

8. Ta có : AIHK là hình chữ nhật

$$\Rightarrow OI = OH \Rightarrow \Delta OIH \text{ cân} \Rightarrow \hat{I}_1 = \hat{H}_1$$

mà ΔHIC vuông tại I (AIHK là hình chữ nhật)

IM là đường trung tuyến ứng với cạnh huyền

$$\Rightarrow IM = HM \Rightarrow \Delta IMH \text{ cân tại M} \Rightarrow \hat{I}_2 = \hat{H}_2$$

$$\text{Mặt khác : } \hat{AHM} = 90^\circ \Rightarrow \hat{H}_1 + \hat{H}_2 = 90^\circ$$

$$\text{Suy ra : } \hat{KIM} = \hat{I}_1 + \hat{I}_2 = 90^\circ. \text{ Chọn câu D}$$



9. Chọn câu D

10. Gọi K, L là trung điểm AB, AC

Ta có $KQ \parallel BP$ ($AK = KB, AQ = QP$)

$QI \parallel PC$ ($AI = IC, AQ = QP$) $\Rightarrow KI \parallel BC$

Vì $\triangle ABC$ có đỉnh A , K, L có đỉnh

Vậy điểm Q di chuyển trên đoạn thẳng KL

Chọn câu A

11. Chọn câu A

12. $AB = AD, A = 60^\circ$

$\triangle ABD$ đều $\Rightarrow \angle B = \angle D = 60^\circ$

$AB = BD$

$\triangle ABM \cong \triangle BDN$ (c-g-c)

$\Rightarrow \angle B_1 = \angle B_2, BM = BN$

Mà $\angle ABD = 60^\circ$

$\Rightarrow \angle B_1 + \angle B_2 = 60^\circ$

$\Rightarrow \angle B_1 + \angle B_2 = 60^\circ \Rightarrow \angle MBN = 60^\circ$

Chọn câu C

13. Chọn câu B

14. Ta có $\angle MNC = \angle NCP = \angle CPM = 90^\circ$

\Rightarrow tứ giác CPMN là hình vuông

Chọn câu A



ĐA GIÁC – DIỆN TÍCH ĐA GIÁC

§1. ĐA GIÁC - ĐA GIÁC ĐỀU

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. *Khái niệm về đa giác*

Định nghĩa: Đa giác lồi là đa giác luôn nằm trong một nửa mặt phẳng mà bờ là đường thẳng chứa bất kỳ cạnh nào của đa giác đó.

2. *Đa giác đều*

Định nghĩa: Đa giác đều là đa giác có tất cả các cạnh bằng nhau và tất cả các góc bằng nhau



3. Tổng số đo các góc của hình n - giác là $(n - 2).180^\circ$

Suy ra số đo một số góc của đa giác đều n cạnh là: $\frac{(n - 2).180^\circ}{n}$

4. Số đường chéo của hình n - giác là: $\frac{n(n - 3)}{2}$

II. BÀI TẬP

A. Bài tập mẫu

- Cho ví dụ về đa giác không đều: a) Có tất cả các cạnh bằng nhau.
b) Có tất cả các góc bằng nhau.

Giải

- a) Hình thoi có 4 cạnh bằng nhau, nhưng các góc không bằng nhau. Vậy hình thoi không phải là đa giác đều.
b) Hình chữ nhật là một tứ giác có 4 góc bằng nhau nhưng các cạnh không bằng nhau. Vậy hình chữ nhật không phải là đa giác đều

B. Bài tập căn bản

1. Hãy vẽ phác một lục giác lồi.

Hãy nêu cách nhận biết một đa giác lồi.

Hướng dẫn

Dùng định nghĩa đa giác lồi để vẽ cho đúng lục giác lồi.

2. Cho tam giác cân $\triangle ABC$ cân tại A . Trên cạnh AB lấy điểm D và trên cạnh AC lấy điểm E sao cho $AD = AE$. Chứng minh rằng tứ giác $BDEC$ là hình bình hành.

Giải

- a) Hình vẽ là như sau (không cần vẽ hai tam giác bằng nhau)



- b) Hình vẽ như là tam giác cân không cần vẽ hai tam giác bằng nhau



3. Cho hình thoi $ABCD$ có $A = 60^\circ$. Gọi E, F, G, H lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA . Chứng minh rằng tứ giác $EBFGDH$ là lục giác đều.

Giải

Vì $ABCD$ là hình thoi nên

$$AB = BC = CD = DA$$

$$EB = BF = FG = GD = DH = HE$$

Ta có $\triangle ABD$ là tam giác cân tại A và $\angle A = 60^\circ$

Vậy $\triangle ABD$ là tam giác đều

$$\Rightarrow AB = BD = DA$$

và EH, GF là đường trung bình của $\triangle ABD, \triangle CBD$ nên

$$EH = FG = \frac{BD}{2} \quad (*)$$

Tương tự và $(*)$ ta có $EB = BF = FG = GD = DH = HE$ $(**)$

Ta còn có các tam giác $\triangle ABD, \triangle CBD, \triangle AHD$ và $\triangle BFC$ là các tam giác đều nên

$$\angle BEF = \angle HDG = 120^\circ$$

$$\text{Và } \angle HEB = \angle BFG = \angle FGD = \angle DHE = 120^\circ$$

(Vì đó là các góc ngoài của hai tam giác đều $\triangle AHD$ và $\triangle BFC$)

Vậy tứ giác $EBFGDH$ có 6 góc bằng nhau $(= 120^\circ)$

Tại $(*)$ và $(**)$ suy ra tam giác $EBFGDH$ là hình lục giác đều (đpcm)



4. Điền số thích hợp vào các ô trống trong bảng sau:

				Đa giác: n cạnh
Số cạnh	4			
Số đường chéo xuất phát từ một đỉnh		2		
Số tam giác được tạo thành			4	
Tổng số đo các góc của đa giác			4.180° $= 720^\circ$	

Hướng dẫn

Áp dụng các công thức để tính và điền vào ô trống.

				Đa giác: n cạnh
Số cạnh	4	5	6	n
Số đường chéo xuất phát từ một đỉnh	1	2	3	$n - 3$
Số tam giác được tạo thành	2	3	4	$n - 2$
Tổng số đo các góc của đa giác	2.180° $= 360^\circ$	3.180° $= 540^\circ$	4.180° $= 720^\circ$	$(n - 2).180^\circ$

5. Tính số đo mỗi góc của ngũ giác đều, lục giác đều, n-giác đều.

Giải

Ta có hình n-giác đều có n-góc ở n-đỉnh và các góc này bằng nhau.

Tổng số đo các góc của đa giác đều n-cạnh bằng $(n - 2).180^\circ$

Vậy số đo của mỗi góc tại đỉnh là: $\frac{(n - 2).180^\circ}{n}$

+ Với hình ngũ giác đều: $n = 5$

$$\text{Số đo góc tại mỗi đỉnh là: } \frac{(5 - 2).180^\circ}{5} = \frac{3.180^\circ}{5} = 108^\circ$$

+ Với hình lục giác đều: $n = 6$

$$\text{Số đo góc tại mỗi đỉnh là: } \frac{(6 - 2).180^\circ}{6} = \frac{4.180^\circ}{6} = 120^\circ$$

§2. DIỆN TÍCH HÌNH CHỮ NHẬT

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. Khái niệm diện tích đa giác

Biên độ của một phần mặt phẳng giới hạn bởi một đa giác được gọi là diện tích của đa giác đó.

• Mỗi đa giác có một diện tích xác định

Diện tích đa giác là một số dương

hai tam giác bằng nhau thì có diện tích bằng nhau

Nếu một đa giác được chia thành những đa giác không có điểm trong chung thì diện tích của nó bằng tổng diện tích của những đa giác đó

2. Công thức tính diện tích hình chữ nhật

Hình 1. Diện tích hình chữ nhật bằng tích hai kích thước của nó

$$S = a \cdot b$$



3. Công thức tính diện tích hình vuông

Hình tam giác vuông

Diện tích hình vuông bằng bình phương cạnh của nó

$$S = a^2$$

Diện tích tam giác vuông bằng nửa tích hai cạnh của góc vuông.

$$S = \frac{1}{2} ab$$




II. BÀI TẬP

A. Bài tập mẫu

Cho tam giác vuông cân. Chứng minh rằng tổng diện tích của hai hình vuông dựng trên hai cạnh góc vuông bằng diện tích của hình vuông dựng trên cạnh huyền.

Giải

Tam giác ABC vuông cân tại A , hình vuông $HCEF$ dựng trên cạnh huyền BC có hai đường chéo BE và CF giao nhau tại O .



$$\angle CHE = \angle C'F'F = 45^\circ$$

$$\text{Vậy } \triangle BHC' \sim \triangle BAC' \text{ (g.g.c)} \Rightarrow S_{BHC'} = 4S_{BAC'} \quad (1)$$

$$\text{Tương tự ta có } \left. \begin{array}{l} S_{AHF} = 2S_{AH'} \\ S_{AC'H} = 2S_{AH'} \end{array} \right\} \Rightarrow S_{AHF} + S_{AC'H} = 4S_{AH'} \quad (2)$$

$$\text{Từ (1) và (2) suy ra, } S_{BCH'} = S_{BHC'} + S_{AC'H} \text{ (dpcm)}$$

B. Bài tập căn bản

6. Diện tích hình chữ nhật thay đổi như thế nào nếu:

- Chiều dài tăng 2 lần, chiều rộng không đổi?
- Chiều dài và chiều rộng tăng 3 lần?
- Chiều dài tăng 4 lần, chiều rộng giảm 4 lần?

Giải

Gọi ABCD là hình chữ nhật có chiều dài là a và chiều rộng là b .

Khi đó diện tích $S = a \cdot b$

a) Khi chiều dài tăng hai lần và chiều rộng không đổi, ta có:

$$S_1 = 2a \cdot b = 2ab = 2S.$$

Vậy khi chiều dài tăng lên 2 lần và chiều rộng không đổi thì diện tích hình chữ nhật ABCD tăng lên gấp 2 lần.

b) Khi chiều dài và chiều rộng tăng 3 lần ta có:

$$S_2 = (3a) \cdot (3b) = 9ab = 9S$$

Vậy khi chiều dài và chiều rộng tăng 3 lần thì diện tích hình chữ nhật ABCD tăng lên 9 lần

c) Khi chiều dài tăng 4 lần và chiều rộng giảm 4 lần, ta có

$$S_3 = (4a) \cdot \frac{b}{4} = ab = S$$

Vậy khi chiều dài tăng 4 lần và chiều rộng giảm 4 lần thì diện tích hình chữ nhật ABCD không thay đổi.

7. Một gian phòng có nền hình chữ nhật với kích thước là 4,2m và 5,4m, có một cửa sổ hình chữ nhật kích thước là 1m và 1,6m và một cửa ra vào hình chữ nhật kích thước 1,2m và 2m.

Ta coi một gian phòng đạt mức chuẩn về ánh sáng nếu diện tích các cửa bằng 20% diện tích nền nhà. Hỏi gian phòng trên có đạt mức chuẩn về ánh sáng hay không?

Giải

$$\text{Ta có diện tích của nền nhà là: } S = 4,2 \cdot 5,4 = 22,68 \text{ (m}^2\text{)}$$

Ta có diện tích cửa sổ và cửa ra vào là:

$$S' = 1 \cdot 1,6 + 1,2 \cdot 2 = 1,6 + 2,4 = 4 \text{ (m}^2\text{)}$$



Tỉ số diện tích của hai cửa ra vào có diện tích của nền gạch phẳng là:

$$\frac{S_1}{S} = \frac{1}{92,68} = 0,174 = 17,4\% \quad 18\%$$

Vậy có $S_1 = 18\%S$

Điều này chứng tỏ rằng gạch phẳng không đạt mức chuẩn về ánh sáng

8. Cho cạnh (đơn vị mm) rồi tính diện tích hình tam giác vuông dưới đây

Hướng dẫn

Học sinh sử dụng thước đo đoạn thẳng và áp dụng công thức tính diện tích tam giác vuông để tính.

Đáp số: $S = \frac{1}{2} \cdot 30 \cdot 25 = 375 \text{ mm}^2$



Luyện tập

9. ABCD là một hình vuông cạnh 12cm, AE = x (cm). Tính x sao cho diện tích tam giác ABE bằng $\frac{1}{3}$ diện tích hình vuông ABCD.



Giải

Ta có diện tích hình vuông ABCD là:

$$S_{ABCD} = 12 \cdot 12 = 144 \text{ (cm}^2\text{)}$$

Diện tích tam giác vuông ABE là:

$$S_{ABE} = \frac{1}{2} \cdot 12 \cdot x = 6x$$

Theo đề bài ta có: $S_{ABE} = \frac{1}{3} S_{ABCD}$

$$\text{hay } 6x = \frac{1}{3} \cdot 144 \Rightarrow x = \frac{48}{6} = 8 \text{ (cm)}$$

Vậy $x = 8\text{cm}$.

10. Cho một tam giác vuông. Hãy so sánh tổng diện tích của hai hình vuông dựng trên hai cạnh góc vuông với diện tích hình vuông dựng trên cạnh huyền.
Gợi ý: Sử dụng định lý Py-ta-go.

Giải

Giả sử a, b, c lần lượt là độ dài ba cạnh AB, AC và BC của tam giác vuông ABC. Khi đó:

– Diện tích của hình vuông $ABMJ$ là: $S_{ABMJ} = a^2$


– Diện tích của hình vuông $ACGH$ là: $S_{ACGH} = b^2$

Diện tích hình vuông $BCRF$ là: $S_{BCRF} = c^2$

Áp dụng định lý Py-ta-go trong tam giác vuông ABC , ta có: $c^2 = a^2 + b^2$

$$\text{hay } S_{BCRF} = S_{ABMJ} + S_{ACGH}$$

Vậy tổng diện tích của hai hình vuông dựng trên hai cạnh góc vuông bằng diện tích của hình vuông dựng trên cạnh huyền.



11. Cắt hai tam giác vuông bằng nhau từ một tấm bia. Hãy ghép hai tam giác đó để tạo thành:

- Một tam giác cân.
- Một hình chữ nhật.
- Một hình bình hành.

Diện tích của các hình này có bằng nhau không? Vì sao?

Hướng dẫn

Diện tích các hình trên là bằng nhau vì cùng bằng diện tích hai tam giác vuông bằng nhau được cắt từ tấm bia.

12. Tính diện tích các hình dưới đây (mỗi ô vuông là một đơn vị diện tích)



Hướng dẫn

Áp dụng bài 11 bằng cách cắt, ghép hình để tính diện tích các hình:

- $S_{\text{hình (a)}} = 6$ (đơn vị diện tích)
 - $S_{\text{hình (b)}} = 6$ (dvdt)
 - $S_{\text{hình (c)}} = 6$ (dvdt)
13. Cho hình 125, trong đó $ABCD$ là hình chữ nhật, E là một điểm bất kì nằm trên đường chéo AC , $FG \parallel AD$ và $HK \parallel AB$. Chứng minh rằng hai hình chữ nhật $EFBK$ và $EGDH$ có cùng diện tích.



Giải

– Vì $ABCD$ là hình chữ nhật, AC là đường chéo nên ta có:

$$\triangle ABC = \triangle DCA \Rightarrow S_{\triangle BEC} = S_{\triangle DEA}$$

$$N_1, P_1 \in \text{Mặt } \alpha \cap \text{Mặt } \beta \Rightarrow \text{Mặt } \alpha \text{ và } \text{Mặt } \beta$$

Đúng! Vì tất cả các điểm thuộc mặt α và

$$\text{Mặt } \beta \Rightarrow \text{Mặt } \alpha = \text{Mặt } \beta \Rightarrow \text{Mặt } \alpha$$

$$\text{Mặt } \alpha \text{ và } \text{Mặt } \beta \text{ khác } \Rightarrow \text{Mặt } \alpha \neq \text{Mặt } \beta$$

$$\text{Ta có: } (2), (3), (4) \Rightarrow S_{\text{Mặt } \alpha} = (S_{\text{Mặt } \beta} + S_{\text{Mặt } \gamma}) + S_{\text{Mặt } \delta} \\ S_{\text{Mặt } \alpha} = S_{\text{Mặt } \beta} + S_{\text{Mặt } \gamma} + S_{\text{Mặt } \delta} \text{ (đpcm)}$$

14. Một đám đất hình chữ nhật có chiều rộng 400m. Hãy tính diện tích đám đất đó theo đơn vị m², km² và ha.

Giải

Diện tích đám đất hình chữ nhật đã cho là $S = 700 \cdot 400 = 280 \cdot 000 \text{ (m}^2\text{)}$

$$\Rightarrow 1 \text{ km}^2 = 1 \cdot 000 \cdot 000 \text{ m}^2 \text{ nên } S = 0,28 \text{ km}^2$$

$$\Rightarrow 1 \text{ ha} = 10 \cdot 000 \text{ m}^2 \text{ nên } S = 28 \text{ ha}$$

$$\Rightarrow 1 \text{ a} = 100 \text{ m}^2 \text{ nên } S = 2800 \text{ a}$$

15. **Đ:** Vẽ hình chữ nhật ABCD có AB = 5cm, BC = 3cm.

- a) Hãy vẽ mỗi hình chữ nhật có diện tích nhỏ hơn nhưng có chu vi lớn hơn hình chữ nhật ABCD. Vẽ được mấy hình như vậy?
b) Hãy vẽ hình vuông có chu vi bằng chu vi hình chữ nhật ABCD. Vẽ được mấy hình vuông như vậy? So sánh diện tích hình chữ nhật với diện tích hình vuông có cùng chu vi vừa vẽ. Tại sao trong các hình chữ nhật có cùng chu vi thì hình vuông có diện tích lớn nhất?

Giải

- a) Hình chữ nhật có kích thước 5cm và 3cm thì

$$S_{\text{hình chữ nhật}} = 5 \cdot 3 = 15 \text{ (cm}^2\text{)}$$

$$CV_{\text{hình chữ nhật}} = 2(5 + 3) = 16 \text{ (cm)}$$

Ta có thể vẽ được vô số hình chữ nhật có diện tích bé hơn nhưng chu vi lớn hơn hình chữ nhật ABCD cho trước.
Ví dụ: Hình chữ nhật có (chiều dài; chiều rộng) như sau:
Đ: 7cm; R: 2cm; (8, 1).



- b) Ta có cạnh hình vuông bằng chu vi hình chữ nhật là $\frac{(3+5) \cdot 2}{4} = 4 \text{ (cm)}$

hình vuông AMNP có cạnh dài 4cm.
Ví dụ hình vuông có chu vi bằng hình chữ nhật ABCD.

$$CV_{\text{hình vuông}} = 4 \cdot 4 = 16 \text{ (cm)}$$

Ta vẽ được nhiều hình vuông thỏa mãn điều kiện trên (Xem chứng minh sau)



Ta có: $S_{\text{AMNH}} = 5,3 = 15 \text{ (cm}^2\text{)}$

Và $S_{\text{AMNP}} = 4,4 = 16 \text{ (cm}^2\text{)}$

Vậy $S_{\text{AMMNP}} > S_{\text{AMMNTN}}$

- Trong các hình chữ nhật có cùng chu vi thì hình vuông có diện tích lớn nhất.

Thật vậy, ta có: $(a + b)^2 = 4ab + (a - b)^2 = k^2 \quad (1)$

Với $a + b = 1$: không đổi và là nửa chu vi hình chữ nhật ABCD

Vì $(a - b)^2 \geq 0$, với mọi a, b nên từ (1) suy ra: $ab \leq \frac{k^2}{4}$


Tích ab lớn nhất bằng $\frac{k^2}{4}$ khi và chỉ khi $a = b$

Do đó diện tích hình chữ nhật có chu vi không đổi và đạt giá trị lớn nhất khi nó là hình vuông

Hình vẽ bên chứng tỏ rằng hình chữ nhật cạnh a, b

($a > b$) có diện tích nhỏ hơn

diện tích hình vuông cạnh $\frac{a+b}{2}$.



§3. DIỆN TÍCH TAM GIÁC

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. Định lý

Diện tích của tam giác bằng nửa tích một cạnh với chiều cao ứng với cạnh đó.

$$S = \frac{1}{2} a.h$$



2. Hệ quả

Diện tích tam giác vuông bằng nửa tích số hai cạnh góc vuông.

$$S = \frac{1}{2} b.c$$



H. BÀI TẬP

A. Bài tập mẫu

- a) Chứng minh rằng trung tuyến AM (là một trục) của tam giác chia tam giác thành hai phần có diện tích bằng nhau.
 b) Cho $\triangle ABC$ với ba đường cao AA', BB', CC' . Gọi H là trực tâm của tam giác ABC . Chứng minh rằng:

$$\frac{HA'}{AA'} + \frac{HB'}{BB'} + \frac{HC'}{CC'} = 1$$

Giải

$$\begin{array}{l} \text{GT: } BM = MC \\ \text{KL: } S_{AMB} = S_{AMC} \end{array}$$

- a) Chứng minh $S_{AMB} = S_{AMC}$

$$\text{Ta có: } S_{AMB} = \frac{1}{2} BM \cdot AH \quad (1)$$

$$S_{AMC} = \frac{1}{2} MC \cdot AH \quad (2)$$

$$\text{Mà } BM = MC = \frac{BC}{2} \quad (3)$$

Từ (1), (2), (3) suy ra: $S_{AMB} = S_{AMC}$ (đpcm)

- b) Gọi S là diện tích $\triangle ABC$

$$\text{Ta có: } S_{ABC} = S_{AMB} + S_{AMC} + S_{AMB} \quad (1)$$

$$\text{Mà } S = \frac{1}{2} AA' \cdot BC = \frac{1}{2} BB' \cdot AC = \frac{1}{2} CC' \cdot AB$$

$$\Rightarrow BC = \frac{2S}{AA'}, AC = \frac{2S}{BB'}, AB = \frac{2S}{CC'}$$

$$\text{Do đó: } S_{AMB} = \frac{1}{2} BC \cdot HA' = \frac{S \cdot HA'}{AA'} \quad (2)$$

$$S_{AMC} = \frac{1}{2} AC \cdot HB' = \frac{S \cdot HB'}{BB'} \quad (3)$$

$$S_{AMB} = \frac{1}{2} AB \cdot HC' = \frac{S \cdot HC'}{CC'} \quad (4)$$

Cộng (2), (3), (4) về với về ta được:

$$S = S_{AMB} + S_{AMC} + S_{AMB} = S \left(\frac{HA'}{AA'} + \frac{HB'}{BB'} + \frac{HC'}{CC'} \right)$$

$$\text{Suy ra: } \frac{HA'}{AA'} + \frac{HB'}{BB'} + \frac{HC'}{CC'} = 1 \text{ (đpcm)}$$



B. Bài tập căn bản

16. Giải thích vì sao diện tích của các tam giác được tô đậm trong các hình a), b), c) bằng nửa diện tích của tam giác bằng nửa diện tích hình chữ nhật tương ứng:



a)



b)



c)

Giải

Các cạnh của hình chữ nhật ở hình a), b), c) có chiều dài là a và chiều rộng là h . Vậy diện tích của các hình chữ nhật đó là:

$$S = a.h \quad (1)$$

Các tam giác ở các hình a), b), c) có cạnh đáy là a và chiều cao tương ứng là h . Vậy diện tích của các tam giác đó là:

$$S_1 = \frac{1}{2} a.h \Rightarrow 2.S_1 = a.h \quad (2)$$

So sánh (1) và (2) ta có: $2S_1 = S \Rightarrow S_1 = \frac{1}{2} S$

Điều này chứng tỏ rằng diện tích của tam giác bằng nửa diện tích của hình chữ nhật tương ứng.

17. Cho tam giác AOB vuông tại O với đường cao OM (hình bên). Hãy giải thích vì sao ta có đẳng thức: $AB.OM = OA.OB$



Giải

Nếu lấy cạnh AB và đường cao tương ứng với nó là OM thì diện tích tam giác OAB là:

$$S = \frac{1}{2} AB.OM \quad (1)$$

Vì tam giác OAB vuông tại O nên diện tích tam giác OAB là:

$$S = \frac{1}{2} OA.OB \quad (2)$$

Từ (1) và (2) suy ra: $AB.OM = OA.OB$ (đpcm).

18. Cho tam giác ABC và đường trung tuyến AM (hình bên). Chứng minh: $S_{AMB} = S_{AMC}$



Giải

Ta dựng các AH ứng với cạnh BC của $\triangle ABC$. Vì AM là trung tuyến của $\triangle ABC$ nên $MC = MB$.

$$\text{Ta có: } S_{\triangle AMB} = \frac{1}{2} BM \cdot AH$$


$$\text{và: } S_{\triangle AMC} = \frac{1}{2} MC \cdot AH = \frac{1}{2} BM \cdot AH = S_{\triangle AMB}$$

$$\text{Vậy: } S_{\triangle ABC} = S_{\triangle AMB} + S_{\triangle AMC}$$



Luyện tập

19. a) Xem hình dưới đây, hãy chỉ ra các tam giác có cùng diện tích (lấy ô vuông làm đơn vị diện tích):



- b) Hai tam giác có diện tích bằng nhau thì có bằng nhau hay không?

Giải

$$\text{a) Ta có: } S_1 = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 3 = 3 \text{ (đvdt)}$$

$$S_2 = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 3 = 3 \text{ (đvdt)}$$

$$S_3 = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 3 = 3 \text{ (đvdt)}$$

$$S_4 = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 5 = 5 \text{ (đvdt)}$$

$$S_5 = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 3 = 4,5 \text{ (đvdt)}$$

$$S_6 = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 4 = 4 \text{ (đvdt)}$$

$$S_7 = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 7 = 3,5 \text{ (đvdt)}$$

$$S_8 = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 3 = 3 \text{ (đvdt)}$$

Vậy tam giác ở hình 1, 3, 6 có cùng diện tích, hình 2 và 8 có cùng diện tích.

- b) Nói chung thì hai tam giác có diện tích bằng nhau thì không bằng nhau.

20. Vẽ hình chữ nhật có một cạnh bằng một cạnh của một tam giác cho trước và có diện tích bằng diện tích của tam giác đó. Từ đó suy ra một cách chứng minh khác về công thức tính diện tích tam giác.

Giải

Ta dựng hình chữ nhật có một cạnh là cạnh của $\triangle ABC$, cạnh đối diện thuộc đường thẳng đi qua trung điểm của hai cạnh còn lại.

Để chứng minh diện tích $\triangle ABC$ bằng diện tích hình chữ nhật $BCDE$, ta kẻ $AK \perp ED$.

Ta có: $\triangle EIB = \triangle KIA \Rightarrow S_{EIB} = S_{KIA}$

và $\triangle KJA = \triangle DJC \Rightarrow S_{KJA} = S_{DJC}$

Như vậy: $S_{\triangle ABC} = S_{EIBDK} = BC \cdot KH = \frac{1}{2} BC \cdot AH$

Kết quả này cho chúng ta một cách chứng minh công thức tính diện tích tam giác.

21. Tính x sao cho diện tích hình chữ nhật $ABCD$ gấp ba lần diện tích tam giác ADE (hình vẽ).



Giải

Ta có: $S_{ABCD} = AB \cdot BC = 5x$ (cm)

và $S_{\triangle ADE} = \frac{AD \cdot EF}{2} = \frac{1}{2} \cdot 2,5 = 5$ (cm)

Theo đề bài ta có:

$$S_{ABCD} = 3 \cdot S_{\triangle ADE}$$

hay $5x = 3 \cdot 5 \Rightarrow x = 3$ (cm)

Vậy $x = 3$ cm

22. Tam giác PAF được vẽ trên giấy kẻ ô vuông (hình vẽ)

Hãy chỉ ra:

- Một điểm I sao cho $S_{PIF} = S_{PAF}$.
- Một điểm O sao cho $S_{POF} = 2 \cdot S_{PAF}$.
- Một điểm N sao cho $S_{PNI} = \frac{1}{2} S_{PAF}$.



Giải

- a) Có vô số điểm I nằm trên đường thẳng đi qua A và song song với PF sẽ thỏa mãn điều kiện: $S_{PIF} = S_{PAF}$.

- b) Vì điểm A cách PF một khoảng bằng 4 đơn vị. Do đó điểm O thỏa mãn điều kiện: $S_{POF} = 2 \cdot S_{PAF}$ thì điểm O phải cách PF một khoảng bằng 8 đơn vị. Có vô số điểm như thế.

- c) Vì điểm A cách PF một khoảng bằng 4 đơn vị. Do đó điểm N thỏa mãn điều kiện: $S_{PNI} = \frac{1}{2} S_{PAF}$ thì điểm N phải cách PF một khoảng bằng 2 đơn vị.

23. Cho tam giác ABC . Hãy chia nó một cách bất kỳ và điểm M nằm trong tam giác ABC cho:
- $$S_{AMB} + S_{BMC} = S_{AMC}.$$

Giải

Đưa giả thiết thành M nằm trong $\triangle ABC'$ (xem hình)

$$S_{AMB} + S_{BMC} = S_{AMC}.$$

$$\text{Tức là } S_{AMB} + S_{BMC} + S_{AMC} = S_{AMC} + S_{AMC} = \frac{1}{2} S_{ABC}$$

$$\text{Và } \triangle MAC \text{ và } \triangle ABC \text{ có chung đáy } MC \text{ nên } MK = \frac{1}{2} BH.$$

Vậy điểm M nằm trên đường (trung bình) EF của $\triangle ABC$.



24. Tính diện tích của một tam giác cân có cạnh đáy bằng a và cạnh bên bằng b .

Giải

Cho tam giác ABC cân tại A .

Vẽ đường cao AH

$$\text{Khi đó } AH \text{ cũng là đường trung tuyến và } BH = HC = \frac{BC}{2} = \frac{a}{2}$$

Áp dụng định lý Py-ta-go trong tam giác vuông HAB , ta có:

$$AB^2 = AH^2 + HB^2$$

$$\Rightarrow AH^2 = AB^2 - HB^2$$

$$\Rightarrow AH = \sqrt{b^2 - \frac{a^2}{4}} = \sqrt{\frac{4b^2 - a^2}{4}} = \frac{1}{2} \sqrt{4b^2 - a^2}$$

Ta có diện tích tam giác cân ABC :

$$S = \frac{1}{2} AH \cdot BC$$

$$S = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \sqrt{4b^2 - a^2} \cdot a$$

$$S = \frac{a}{4} \sqrt{4b^2 - a^2} \text{ (đvdt)}$$



25. Tính diện tích của một tam giác đều có cạnh bằng a .

Giải

Vì đường cao AH , tương tự bài 24 ta tính được

$$AH = \frac{a\sqrt{3}}{2}$$

$$\text{Khi đó } S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} BC \cdot AH = \frac{1}{2} a \cdot \frac{a\sqrt{3}}{2} = \frac{a^2\sqrt{3}}{4}$$

$$\text{Vậy } S_{\triangle ABC} = \frac{a^2\sqrt{3}}{4} \text{ (đvdt)}$$



§4. DIỆN TÍCH HÌNH THANG

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. Công thức diện tích hình thang

Diện tích hình thang bằng nửa tích của tổng hai đáy với chiều cao.

$$S = \frac{1}{2}(a + b) \cdot h$$



2. Công thức tính diện tích hình bình hành

Diện tích hình bình hành bằng tích của một cạnh với chiều cao tương ứng của nó.

$$S = a \cdot h$$



II. BÀI TẬP

A. Bài tập mẫu

Tính diện tích của một hình thang vuông biết hai đáy có độ dài 2cm và 4cm, góc tạo bởi một cạnh bên với đáy lớn có độ đo bằng 45° .

Giải

Ta có $\triangle EBC$ vuông cân, suy ra: $EB = EC$

mà $EC = DC - DE = 4 - 2 = 2$ (cm)

$\Rightarrow EB = EC = 2$ (cm)

Vậy $S_{ABCD} = \frac{1}{2}(AB + DC) \cdot EB$

$$S_{ABCD} = \frac{1}{2}(2 + 4) \cdot 2 = 6 \text{ (cm}^2\text{)}$$



B. Bài tập cần làm

26. Tính diện tích mảnh đất hình thang $ABED$ theo các độ dài đã cho trên hình bên và biết diện tích hình chữ nhật $ABCD$ là 828 m^2 .

Giải

Ta có: $S_{ABCD} = AB \cdot AD = 828 \text{ (m}^2\text{)}$

$$\Rightarrow AD = \frac{828}{AB} = \frac{828}{23} = 36 \text{ (m)}$$




Vậy diện tích hình thang ABED là:

$$S_{ABED} = \frac{1}{2} (AB + DE) \cdot h = \frac{1}{2} (22 + 10) \cdot 9 = 972 \text{ (m}^2\text{)}.$$

Vậy $S_{ABED} = 972 \text{ m}^2$.


27. Vì sao hình chữ nhật ABCD và hình bình hành AGEF (hình dưới) lại có cùng diện tích? Suy ra cách vẽ một hình chữ nhật có cùng diện tích với một hình bình hành cho trước.



Giải

- Vì hình chữ nhật ABCD và hình bình hành AGEF có đáy chung là AB và có chiều cao bằng nhau. Vậy diện tích của chúng bằng nhau.
- Cách vẽ hình chữ nhật có cùng một diện tích với hình bình hành cho trước, ta vẽ như sau:
Trước hết ta vẽ hình bình hành AGEF. Ta kéo dài cạnh EF. Từ A và B ta vẽ hai đường thẳng cùng vuông góc với đường thẳng EF nối dài các nó lần lượt tại C và D, ta có hình chữ nhật ABCD là hình cần dựng.

28. Xem hình bên (IG // FU). Hãy đọc tên một số hình có cùng diện tích với hình bình hành FIGE.



Giải

Xét các hình bình hành FIGE, IGRE, IGUR và các tam giác IPR, GER ta có

Chú ý các hình bình hành và các tam giác trên bằng nhau (do IG // FU)

Đáy của tam giác gấp đôi đáy của các hình bình hành.

Dựa vào công thức tính diện tích hình bình hành và diện tích hình tam giác ta được: $S_{FIGE} = S_{IGRE} = S_{IGUR} = S_{IPR} = S_{GER}$.

29. Khi nối trung điểm của hai đáy hình thang, ta sao ta được hai hình thang có diện tích bằng nhau?

Giải

Xét hai hình thang: AEFD và BEFC ta có

— Chúng cùng chiều cao,

Có các đáy bằng nhau: $AE = EB$

$DF = FC$



Vậy diện tích của chúng bằng nhau: $S_{AEFD} = S_{BEFC}$.

30. Trên hình bên ta có hình thang $ABCD$ với đường trung bình EF và hình chữ nhật $GHIK$. Hãy so sánh diện tích hai hình này, từ đó suy ra một cách chứng minh khác về công thức diện tích hình thang.



Giải

Cho hình thang $ABCD$ ($AB \parallel CD$) ta dựng hình chữ nhật $GHIK$ có một cạnh bằng đường trung bình của hình thang và có diện tích bằng diện tích hình thang (như hình bên).

Ta dễ dàng chứng minh: $\triangle AEG = \triangle DEK$; $\triangle BFH = \triangle CFI$

Suy ra $S_{\triangle AEG} = S_{\triangle DEK} = S_{\triangle BFH} = S_{\triangle CFI}$


$$\text{Mà } EF = \frac{AB + CD}{2} \Rightarrow S_{ABCD} = \frac{1}{2}(AB + CD) \cdot GK$$

Ở đây ta gặp lại công thức tính diện tích hình thang đã học nhưng bằng một phương pháp khác, đó là:

Diện tích hình thang bằng tích đường trung bình với đường cao của nó.



31. Xem hình vẽ dưới. Hãy chỉ ra các hình có cùng diện tích (lấy ô vuông làm đơn vị diện tích)



Giải

Các hình 2, 6, 9 có cùng diện tích là 6 (ô vuông)

Các hình 1, 5, 8 có cùng diện tích là 8 (ô vuông)

Các hình 3, 7 có cùng diện tích là 9 (ô vuông)

§5. DIỆN TÍCH HÌNH THOI

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

- Công thức tính diện tích hình thoi:
Diện tích hình thoi bằng nửa tích hai đường chéo

$$S_{\text{hình thoi}} = \frac{1}{2} AC \cdot BD$$



II. BÀI TẬP

A. Bài tập mẫu

Tính diện tích hình thoi biết cạnh của nó dài 6,2cm và một trong các góc của nó có số đo 30°

Giải

Cho hình thoi ABCD. Từ B kẻ $BH \perp AD$. Xét tam giác vuông HBA có $\widehat{A} = 30^\circ$ do đó có thể xem $\triangle HBA$ là nửa tam giác đều cạnh AB

$$\Rightarrow BH = \frac{1}{2} AB = \frac{1}{2} \cdot 6,2 = 3,1 \text{ (cm)}$$

Ta có

$$S_{\text{hình thoi}} = \frac{1}{2} AD \cdot BH = \frac{1}{2} \cdot 6,2 \cdot 3,1 = 9,61 \text{ (cm}^2\text{)}$$

$$\text{Mà } S_{\triangle ABD} = 2S_{\text{hình thoi}} = 2 \cdot 9,61 = 19,22 \text{ (cm}^2\text{)}$$

$$\text{Đáp số: } S_{\triangle ABD} = 19,22 \text{ (cm}^2\text{)}$$



B. Bài tập cơ bản


32. a) Hãy vẽ một tứ giác có độ dài hai đường chéo là: 3,6cm, 6cm và hai đường chéo đó vuông góc với nhau. Có thể vẽ được bao nhiêu tứ giác như vậy? Hãy tính diện tích mỗi tứ giác vừa vẽ.
b) Hãy tính diện tích hình vuông có độ dài đường chéo là d.

Giải

- a) Tứ giác ABCD có độ dài hai đường chéo là

$$AC = 6\text{cm}; BD = 3,6\text{cm}$$

và $AC \perp BD$.



Ta vẽ được vô số tứ giác thỏa mãn điều kiện trên (hàng cách đều \perp tại BD trên AC)

$$\text{Ta có } S_{\Delta BDE} = \frac{1}{2} \cdot AC \cdot BD = \frac{1}{2} \cdot 6,3,6 = 10,8 \text{ (cm}^2\text{)}$$

$$\text{Vậy } S_{\Delta BDE} = 10,8 \text{ cm}^2$$

b) Hình vuông có hai đường chéo vuông góc với nhau $\Rightarrow S_{\text{vuông}} = \frac{1}{2} d^2$

Vậy diện tích hình vuông có đường chéo là d là nửa bình phương độ dài đường chéo đó.

33. Vẽ hình chữ nhật có một cạnh bằng đường chéo của một hình thoi cho trước và có diện tích bằng diện tích của hình thoi đó. Từ đó suy ra cách tính diện tích hình thoi.

Giải

Giả sử cho hình thoi DECF.

Vẽ hình chữ nhật có một cạnh là CD,

cạnh kia bằng IE với $IE = \frac{EF}{2}$.

Ta dễ dàng nhận thấy rằng:

$$S_{\text{DECF}} = S_{\text{ABED}} = CD \cdot IE = \frac{1}{2} CD \cdot EF$$



Vậy diện tích hình thoi bằng diện tích hình chữ nhật có một cạnh là độ dài một đường chéo và cạnh kia bằng độ dài nửa đường chéo còn lại của hình thoi.

34. Cho một hình chữ nhật. Vẽ tứ giác có các đỉnh là trung điểm các cạnh của hình chữ nhật. Vì sao tứ giác này là một hình thoi? So sánh diện tích hình thoi và diện tích hình chữ nhật, từ đó suy ra cách tính diện tích hình thoi

Giải

Ta vẽ hình chữ nhật ABCD với M, N, P, Q lần lượt là trung điểm các cạnh DA, AB, BC và CD, vẽ tứ giác MNPQ

Tứ giác MNPQ là hình thoi vì:

$$MN = NP = PQ = QM = \frac{BD}{2} \text{ (tính chất đường trung bình của tam giác),}$$

Ta có $\Delta IMN = \Delta INM$ (ch. g.c)

$$\Rightarrow S_{\Delta IMN} = S_{\Delta INM}$$

$$\Rightarrow S_{\Delta IMN} = \frac{1}{2} S_{\Delta INM} \quad (1)$$

$$\text{Tương tự } S_{\Delta INP} = \frac{1}{2} S_{\Delta INP} \quad (2)$$

$$S_{\Delta IPQ} = \frac{1}{2} S_{\Delta IPQ} \quad (3)$$



$$S_{\Delta ADE} = \frac{1}{2} S_{\Delta ABC} \quad (1)$$

Cộng (1), (2), (3), (4) và hiệu vế trái được $S_{\Delta ADE} = \frac{1}{2} S_{\Delta ABC}$.

Vậy diện tích hình thoi MNPQ bằng một nửa (1/2) hình chữ nhật ABCE.

$$\text{Ta có } S_{\Delta ADE} = \frac{1}{2} S_{\Delta ABC} = \frac{1}{2} AB \cdot BE = \frac{1}{2} MN \cdot NQ.$$

Vậy diện tích hình thoi bằng nửa tích hai đường chéo của nó.

- 35.** Tính diện tích hình thoi có cạnh dài 6cm và một trong các góc của nó có số đo là 60° .

Giải

Cho tứ giác thoi ABCD có cạnh AB = 6cm và $\angle A = 60^\circ$.

Vẽ đường cao BH.

Ta có ΔABD cân tại D (vì AB = AD).

Và $\angle A = 60^\circ$.

Vậy ΔABD là tam giác đều nên đường cao

$$BH = \frac{AB \sqrt{3}}{2} = \frac{6\sqrt{3}}{2} = 3\sqrt{3} \text{ (cm)}$$

$$\text{Suy ra } S_{\Delta ABD} = \frac{1}{2} AD \cdot BH = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 3\sqrt{3} = 9\sqrt{3} \text{ (cm}^2\text{)}$$

$$\text{Mà } S_{ABCD} = 2S_{\Delta ABD} = 2 \cdot 9\sqrt{3} = 18\sqrt{3} \text{ (cm}^2\text{)}$$

$$\text{Vậy } S_{ABCD} = 18\sqrt{3} \text{ (cm}^2\text{)}$$

* Cách khác: ΔABD là tam giác đều nên BD = 6cm

Vì AI là đường cao của tam giác đều ABD nên

$$AI = \frac{6\sqrt{3}}{2} = 3\sqrt{3} \text{ (cm)} \Rightarrow AC = 2AI = 6\sqrt{3} \text{ (cm)}$$

$$\text{Ta có } S_{ABCD} = \frac{1}{2} AC \cdot BD = \frac{1}{2} \cdot 6\sqrt{3} \cdot 6 = 18\sqrt{3} \text{ (cm}^2\text{)}$$



- 36.** Cho một hình thoi và một hình vuông có cùng chu vi. Hỏi hình nào có diện tích lớn hơn? Vì sao?

Giải

Giả sử ta vẽ hình thoi ABCD có cạnh là a và hình vuông MNPQ cũng có cạnh là a. Suy ra $CV_{ABCD} = CV_{MNPQ} = 4a$.



- Ta có $S_{ABHQ} = a^2$
- Từ đỉnh B của hình thoi ABCD ta vẽ đường cao BH có độ dài BH = h
- Ta có $S_{ABH} = \frac{1}{2} ah \Rightarrow S_{ABCD} = 2S_{ABH} = 2 \cdot \frac{1}{2} ah = ah$
- Trong $\triangle ABD$ ta có đường cao BH ngắn hơn cạnh AB (do đường vuông góc nhỏ hơn đường xiên) hay $h < a$.
 $\Rightarrow ah < a^2$ (nhân hai vế với $a > 0$) hay $S_{ABCD} < S_{ABHQ}$
 Vậy diện tích hình vuông lớn hơn hoặc bằng hình thoi khi hai hình có chu vi bằng nhau. Dấu "=" xảy ra khi hình thoi trở thành hình vuông

§6. DIỆN TÍCH ĐA GIÁC

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

*** Phương pháp chung:**

Để có thể tính diện tích của một đa giác bất kỳ ta thường chia các đa giác thành các tam giác hoặc tạo ra một tam giác nào đó có chứa đa giác. Do đó, việc tính diện tích của một đa giác bất kỳ thường được quy về tính diện tích các tam giác.



a)



b)



c)

- Trong một số trường hợp, để tính toán thuận lợi ta có thể chia đa giác thành nhiều tam giác vuông và hình thang vuông.

II. BÀI TẬP

A. Bài tập căn bản

37. Thực hiện các phép đo cần thiết (chính xác đến mm) để tính diện tích hình ABCDE (hình bên).


Hướng dẫn

Ta chia đa giác ABCDE thành $\triangle ABC$, hai tam giác vuông AHE và DKC, hình thang vuông HKDE.


Ta đo các đoạn thẳng AC, AH, HK, KC, EH, KD và BG.

Ta tính diện tích các tam giác: S_{ABC} , S_{AHE} , S_{DKC} , S_{HKDE} .

Tính tổng bốn diện tích trên ta được S_{ABCDE} .



38. Một con đường cắt một thửa đất hình chữ nhật, và các thửa đất được cho trên hình bên. Hãy tính diện tích phần con đường FBGF (EF // BG) và diện tích phần còn lại của thửa đất.



Giải:

Con đường là một hình bình hành FBGF

Ta có: FBGF là hình bình hành có chiều cao BC' và đáy là FG

$$\Rightarrow S_{FBGF} = BC' \cdot FG = 120 \cdot 50 = 6000 \text{ (m}^2\text{)}$$

$$\text{Vậy } S_{FBGF} = 6000 \text{ m}^2$$

$$ABCD \text{ là hình chữ nhật nên } S_{ABCD} = AB \cdot CD = 120 \cdot 60 = 18000 \text{ (m}^2\text{)}$$

$$\text{Diện tích phần trống rỗng của thửa đất là: } 18000 - 6000 = 12000 \text{ (m}^2\text{)}$$

39. Thực hiện các phép vẽ và phép đo cần thiết để tính diện tích một thửa đất có dạng như hình bên, trong đó $AB \parallel CE$ và được vẽ với tỉ lệ $\frac{1}{5000}$



Hướng dẫn:

Ta chia thửa đất ABCDE thành hình thang ABCE và tam giác ECD.

Ta vẽ thêm đường cao CH của hình thang ABCE và đường cao DK của ΔECD

Ta đo các đoạn thẳng AB, CE, CH, DK.


Ta tính S_{ABCE} và $S_{\Delta ECD}$

Cộng hai diện tích trên lại và nhân với 5000



(Vì bản đồ được vẽ với tỉ lệ $\frac{1}{5000}$)

40. Tính diện tích thực của một hồ nước có sơ đồ là phần gạch sọc trên hình vẽ bên (cạnh của mỗi ô vuông là 1cm, tỉ lệ $\frac{1}{10000}$)



Giải

Ta vẽ hình chữ nhật ABCD chứa bể bơi (phần gạch chéo) có kích thước 6cm và 8cm

$$\text{Khi đó } S_{ABCD} = AB \cdot BC = 6 \cdot 8 = 48 \text{ (cm}^2\text{)}$$

Phần trống còn lại trong hình chữ nhật ABCD có tổng cộng là 12,5 ô vuông.

Vậy diện tích của bể bơi là:


$$48 - 12,5 = 35,5 \text{ (cm}^2\text{)}$$

Vì bể bơi được vẽ theo tỉ lệ

$\frac{1}{10000}$ nên diện tích thực của bể bơi là:

$$\begin{aligned} 35,5 \times 10000 &= 355000 \text{ (cm}^2\text{)} \\ &= 35,5 \text{ (m}^2\text{)} \end{aligned}$$

Đáp số: 35,5 m².



ÔN TẬP CHƯƠNG II

41. Cho hình chữ nhật ABCD. Gọi H, I,

E, K lần lượt là các trung điểm của BC, HC, DC, EC (hình bên). Tính:

- Diện tích tam giác DBE.
- Diện tích tứ giác EHIK.



Giải

a) Diện tích tam giác DBE.

$$\text{Ta có: } S_{DBE} = S_{DBC} - S_{DEC}$$

* Tam giác DBC vuông ở C có hai cạnh góc vuông là:

$$DC = 12 \text{ (cm)}, BC = 6,8 \text{ (cm)}$$

$$\text{Do đó } S_{DBC} = \frac{1}{2} \cdot DC \cdot BC = \frac{1}{2} \cdot 12 \cdot 6,8 = 40,8 \text{ (cm}^2\text{)}$$

* Tam giác CBE vuông tại C có hai cạnh góc vuông là:

$$EC = \frac{DC}{2} = 6 \text{ (cm)}, BC = 6,8 \text{ (cm)}$$

$$\text{Do đó } S_{CBE} = \frac{1}{2} \cdot EC \cdot BC = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 6,8 = 20,4 \text{ (cm}^2\text{)}$$

$$\text{Vậy } S_{DBE} = S_{DBC} - S_{CBE} = 40,8 - 20,4 = 20,4 \text{ (cm}^2\text{)}$$

b) Diện tích tứ giác EHIK:

$$\text{Ta có: } S_{EHIK} = S_{CHE} - S_{CKI}$$

$$* S_{CKI} = \frac{1}{2} \cdot CH \cdot CE = \frac{1}{2} \cdot \frac{6,8}{2} \cdot \frac{12}{2} = 10,2 \text{ (cm}^2\text{)}$$

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \cdot CK \cdot CH = \frac{1}{2} \cdot \frac{a}{2} \cdot \frac{3a}{2} = \frac{3a^2}{8} \quad (2)$$

Vậy $S_{\triangle ABC} = \frac{3}{8}a^2$ (đpcm) (điều này là hiển nhiên)

42. Hình thoi có diện tích $(AC = 40)$ bằng tam giác có diện tích bằng diện tích với nó góc ABCD

Giải



Trong đó một tam giác có thể như sau. Cho tam giác ABC có đường chéo AC. Từ B kẻ $BE \perp AC$ (E nằm trên đường thẳng AC). Nối AF. Tam giác DEF có diện tích bằng diện tích tam giác ABC.

Chứng minh. Thật vậy, vì $AE \perp BF$ nên đường thẳng từ B và F đến AC có bằng nhau, hơn nữa hai tam giác ABE và AFE có cùng cạnh AE. Do đó $S_{\triangle ABE} = S_{\triangle AFE}$. Ta có $S_{\triangle ABC} = S_{\triangle ABE} + S_{\triangle BCE} = S_{\triangle AFE} + S_{\triangle BCE} = S_{\triangle DEF}$.

Vậy ta tìm được DEF có diện tích bằng diện tích tam giác ABC (đpcm).

43. Cho hình vuông ABCD có tâm O. Một góc vuông XOY có hai Ox cắt cạnh AB tại E, Oy cắt cạnh BC tại F (hình vẽ). Tính diện tích tứ giác OEBF.

Giải



Vẽ hai đường chéo AC và BD của hình vuông ABCD cắt nhau tại O. Chứng minh hình vuông ABCD là hai tam giác vuông bằng nhau, suy ra diện tích 4 tam giác đó cũng bằng nhau.

$$\text{Vậy } S_{\triangle OAB} = \frac{1}{4} S_{\square ABCD} = \frac{1}{4} a^2 \quad (1)$$

Xét hai tam giác AOE và BOF, ta có

$$\widehat{OAE} = \widehat{OBF} \text{ (vì } \widehat{AOB} = \widehat{BOA})$$

$$OA = OB \text{ (tính chất đường chéo hình vuông)}$$

$$\text{vì } \left. \begin{array}{l} \widehat{AOE} + \widehat{EOB} = 90^\circ \\ \widehat{FOB} + \widehat{EOB} = 90^\circ \end{array} \right\} \Rightarrow \widehat{AOE} = \widehat{FOB}$$

$$\text{Vậy } \triangle AOE = \triangle BOF \text{ (g-c-g)} \Rightarrow S_{\triangle AOE} = S_{\triangle BOF} \quad (2)$$

$$\text{Ta có: } S_{\triangle AOE} + S_{\triangle BOF} = S_{\triangle AOE} + S_{\triangle BOF} \text{ (theo (2) và (1)) với } S_{\triangle BOF}$$

$$\text{hay } S_{\triangle AOE} = S_{\triangle BOF} \quad (3)$$

$$\text{Từ (1) và (3) ta có: } S_{\triangle OEBF} = \frac{1}{4} S_{\square ABCD} = \frac{1}{4} a^2$$



44. Gọi O là điểm nằm trong hình bình hành ABCD. Chứng minh rằng tổng diện tích của hai tam giác ABO và CDO bằng tổng diện tích của hai tam giác BCO và DAO.

Giải

Qua O vẽ IK vuông góc với AB và DC ($I \in AB, K \in DC$).

$$\begin{aligned} \text{Ta có: } S_{AOD} + S_{BOC} &= \frac{1}{2} AB.OI + \frac{1}{2} CD.OK = \frac{1}{2} AB.OI + \frac{1}{2} AB.OK \\ &= \frac{1}{2} AB(OI + OK) = \frac{1}{2} AB.IK = \frac{1}{2} S_{ABDC} \quad (1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Ta có: } S_{ABDC} &= S_{ABO} + S_{BOC} + S_{COD} + S_{DOA} \\ \Rightarrow S_{BOC} + S_{DOA} &= S_{ABDC} - (S_{ABO} + S_{COD}) \\ &= S_{ABDC} - \frac{1}{2} S_{ABDC} = \frac{1}{2} S_{ABDC} \quad (2) \end{aligned}$$

Từ (1) và (2) ta có:

$$S_{ABO} + S_{DOA} = S_{BOC} + S_{COD} = \frac{1}{2} S_{ABDC} \text{ (đpcm)}$$



45. Hai cạnh của một hình bình hành có độ dài là 6cm và 4cm. Một trong các đường cao có độ dài là 5cm. Tính độ dài đường cao kia.

Giải

Ta có diện tích hình bình hành ABCD là

$$S_{ABDC} = AB.AH = BC.AK \text{ hay } 6.AH = 4.AK$$

Vì một đường cao có độ dài 5cm, thì đó phải là AK và $AK < AB$ ($5 < 6$), không thể là AH vì $AH < 4$.

$$\text{Vậy } 6AH = 4AK = 4.5 = 20 \Rightarrow AH = \frac{20}{6} = \frac{10}{3} \text{ (cm). Vậy AH} = \frac{10}{3} \text{ cm}$$



46. Cho tam giác ABC. Gọi M, N là các trung điểm tương ứng của AC, BC. Chứng minh rằng diện tích hình thang ABNM bằng $\frac{3}{4}$ diện tích của tam giác ABC.

Giải

Vẽ hai trung tuyến AN và BM của $\triangle ABC$. Ta có:

$$S_{ABM} = S_{BMC} = \frac{1}{2} S_{ABC} \quad (1) \text{ (vì có đáy bằng nhau và cùng chiều cao)}$$

$$S_{BAN} = S_{ANC} = \frac{1}{4} S_{ABC} \quad (2) \text{ (vì có đáy bằng nhau và cùng chiều cao)}$$

Cộng (1) và (2) về theo vế, ta có:

$$S_{ABM} + S_{BAN} = \frac{1}{2} S_{ABC} + \frac{1}{4} S_{ABC}$$

$$\text{hay } S_{ABNM} = \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} \right) S_{ABC}$$

$$\text{Vậy } S_{ABNM} = \frac{3}{4} S_{ABC} \text{ (đpcm).}$$



47. Vẽ ba đường trung tuyến của một tam giác (hình trên). Chứng minh sáu tam giác 1, 2, 3, 4, 5, 6 có diện tích bằng nhau.

Giải:



Theo hình vẽ ta gọi ba tam giác là 1, 2, 3, 4, 5 và 6.

Vì đường trung tuyến của tam giác chia cạnh đáy ra làm hai phần bằng nhau nên ta có $S_1 = S_2$ (vì có đáy bằng nhau và cùng chiều cao) (1)

$$S_2 = S_3 \text{ (vì có đáy bằng nhau và cùng chiều cao)} \quad (2)$$

$$S_3 = S_4 \text{ (vì có đáy bằng nhau và cùng chiều cao)} \quad (3)$$

Ta còn có $S_4 + S_5 + S_6 = S_2 + S_3 + S_6$ (vì chung đáy $\frac{1}{2} S_{\Delta ABC}$) (4)

Thay (1), (2) và (3) vào (4) ta suy ra $S_5 = S_6$ (5)

Ta cũng có $S_5 + S_2 + S_6 = S_4 + S_5 + S_6 = \frac{1}{2} S_{\Delta ABC}$ (6)

Thay (1), (2), (3) vào (6) ta suy ra được $S_4 = S_1$ (7)

Kết hợp (1), (2), (3), (5) và (7) ta suy ra được

$$S_1 = S_2 = S_3 = S_4 = S_5 = S_6 \text{ (đpcm)}$$

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG II

- Chọn câu trả lời đúng.
(A) Hình thoi có bốn cạnh bằng nhau gọi là đa thức đều.
(B) Hình bình hành có hai cạnh bên bằng nhau gọi là đa giác đều.
(C) Hình thoi có bốn góc bằng nhau gọi là đa giác đều.
(D) Hình chữ nhật có bốn góc bằng nhau gọi là đa giác đều.
- Chọn câu trả lời đúng. Tổng số đo các góc của hình đa giác bằng 1260° . Số cạnh của đa giác đó là
(A) 7 cạnh (B) 8 cạnh (C) 9 cạnh (D) 10 cạnh.
- Chọn câu trả lời đúng. Hình chữ nhật có chiều dài là a, chiều rộng là b. Nếu chiều dài tăng 4 lần, chiều rộng giảm 2 lần thì diện tích hình chữ nhật là
(A) Tăng 4 lần (B) Giảm 2 lần (C) Tăng 2 lần (D) Giảm 4 lần.
- Chọn câu trả lời đúng. Cho tam giác ABC cân tại A, có $AB = AC = 15\text{cm}$; $BC = 18\text{cm}$. Diện tích tam giác đó là
(A) 66 cm^2 (B) 135 cm^2 (C) 180 cm^2 (D) 108 cm^2 .
- Chọn câu trả lời đúng. Cho hình thang có đáy lớn là 10 cm, chiều cao 8 cm và diện tích 72 cm^2 . Độ dài đáy nhỏ là
(A) 9 cm (B) 8 cm (C) 7,2 cm (D) 7 cm.

6. Chọn câu trả lời đúng. Cho hình thoi $ABDC$ có cạnh bằng 8 dm, $\widehat{ABD} = 30^\circ$. Diện tích hình thoi đó là :
- (A) 23 dm² (B) 16 dm² (C) 32 dm² (D) 64 dm²
7. Chọn câu trả lời đúng. Cho hình thoi $MNPQ$ có $MP = 12$ dm, diện tích bằng 96 dm². Độ dài cạnh hình thoi đó là :
- (A) 10 dm (B) 16 dm (C) 8 dm (D) 18 dm.
8. Tìm câu trả lời sai. Cho hình bên :
- (A) $S_{AMNC} = S_{AMB} + S_{MNC}$;
 (B) $S_{CMND} = S_{AMB} + S_{MDE}$;
 (C) $S_{CFG} = S_{CMND} - S_{MDE}$;
 (D) $S_{AMCDEG} = S_{AMB} + S_{CFG} + S_{MDE}$.



ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG II

1. Chọn câu C.
 2. Áp dụng công thức : $(n - 2)180^\circ = 1260^\circ \Rightarrow n = 9$. Chọn câu C.
 3. Diện tích hình chữ nhật ban đầu : $a.b$ (a : chiều dài, b : chiều rộng)

Sau khi chiều dài tăng 4 lần, chiều rộng giảm 2 lần: $4.a.b. \frac{b}{2} = 2 a.b$

Vậy diện tích hình chữ nhật tăng 2 lần. Chọn câu C.

$$\begin{aligned}
 4. \quad S_{ABC} &= \frac{1}{2} AH.BC \\
 &= \frac{1}{2} \sqrt{AB^2 - BH^2} . BC = \frac{1}{2} \sqrt{15^2 - 9^2} . 18
 \end{aligned}$$

Vậy $S_{ABC} = 108\text{cm}^2$.

Chọn câu D.



$$5. S_{a+b} = \frac{(a+b)h}{2}. \text{ Chọn câu B.}$$

6. Chọn câu A.

$$7. S_{MNQ} = \frac{1}{2} MP.NQ \Rightarrow NQ = \frac{2.S_{MNQ}}{MP} = \frac{2.96}{12} = 16$$

\Rightarrow Cạnh của $MNPQ = \sqrt{8^2 + 6^2} = \sqrt{100} = 10$. Chọn câu A.

$$8. S_{CDEG} = S_{CEG} + S_{CDE}$$

Chọn câu B.



MỤC LỤC

PHẦN ĐẠI SỐ

Chương I. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC

§1 Nhân đơn thức với đa thức	5
§2 Nhân đa thức với đa thức	7
§3-§5 Những hằng đẳng thức đáng nhớ	11
§6 Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung	19
§7 Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức	22
§8 Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử	24
§9 Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp	27
§10 Chia đơn thức cho đơn thức	34
§11 Chia đa thức cho đơn thức	36
§12 Chia đa thức một biến đã sắp xếp	38

Chương II. PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

§1 Phân thức đại số	49
§2 Tính chất cơ bản của phân thức	52
§3 Rút gọn phân thức	54
§4 Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức	58
§5 Phép cộng các phân thức đại số	64
§6 Phép trừ các phân thức đại số	68
§7 Phép nhân các phân thức đại số	74
§8 Phép chia phân thức đại số	77
§9 Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức	80

PHẦN HÌNH HỌC

Chương I. TỨ GIÁC

§1 Tứ giác	96
§2 Hình thang	102
§3 Hình trung tâm	105
§4 Đường trung bình của tam giác. Đường trung bình của hình thang	111
§5 Dụng hình thang (bảng thước và compa)	116
§6 Đối xứng trục	119
§7 Hình bình hành	124
§8 Đối xứng tâm	128
§9 Hình chữ nhật	132
§10 Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước	137
§11 Hình thoi	141
§12 Hình vuông	145

Chương II. ĐA GIÁC - DIỆN TÍCH ĐA GIÁC

§1 Đa giác - Đa giác đều	156
§2 Diện tích hình chữ nhật	159
§3 Diện tích tam giác	164
§4 Diện tích hình thang	170
§5 Diện tích hình thoi	173
§6 Diện tích đa giác	176

NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

16 Hàng Chuối - Hà Nội - Việt Nam

Điện thoại : (04) 3971 4888; (04) 3972 4770 - Fax : (04) 3971 4889

Chịu trách nhiệm xuất bản :

Giám đốc : PHÙNG QUỐC BẢO

Tổng biên tập : PHẠM THỊ TRÂM

Biên tập : Quốc Trung

Sửa bài : Đặng Thị Bình

Trình bày : Diệu Tâm

Đã in : Công ty Sách Hoa Hồng

Đã in lần đầu tiên : Công ty Sách Hoa Hồng

GIẢI BÀI TẬP TOÁN 8 - Tập một

Mã số : 1L-67DH2009

In 5000 cuốn, khổ 16 x 24cm tại Công ty Cổ Phần In Tiên Cường

Số xuất bản : 253-2009/CXB/21-41/DHGGHN ngày 25/03/2009

Quyết định xuất bản số : 87 LK-TN/XB

In xong và nộp lưu chiểu quý II năm 2009